



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์

คู่มือการใช้แบบสัมภาษณ์เรื่อง ความรู้ ทักษะคิด และการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

1. ให้ถามนำเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เช่น
 - 1.1 ท่านเคยได้ยินคำว่า ยาสามัญประจำบ้าน หรือยาตำราหลวงบ้างหรือไม่ ?
 - 1.2 ถ้าเคยท่านคิดว่า ยาประเภทไหนเป็นยาสามัญประจำบ้าน
 - 1.3 จากข้อ 1.1 และ 1.2 ถ้ายังตอบไม่เข้าประเด็น หรือไม่เคยได้ยินคำว่ายาสามัญประจำบ้าน ให้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้อธิบายว่า ยาสามัญประจำบ้าน ส่วนใหญ่จะขายในกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน ในร้านขายของชำก็มีขายบางประเภท แต่ว่าจะผลิตโดยบริษัทเอกชน ต่างกับยาสามัญประจำบ้านของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน และสถานเอนามัย ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม พร้อมทั้งยกตัวอย่างยา
2. แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ให้ถามและตอบตามแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นจะมีทั้งหมด 7 ข้อ
3. แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลด้านความรู้ และการใช้ยาสามัญประจำบ้าน คำถามมีทั้งหมด 5 ข้อ ถามเรียงตามลำดับดังนี้.-
 - 3.1 การถามคำถามข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ให้ถามควบคู่กันไปในกลุ่มอาการเดียวกัน คือ ถ้าถามข้อ 1 ในกลุ่มอาการใดอาการหนึ่งเสร็จแล้ว ให้ถามข้อ 2 ในกลุ่มอาการเดียวกันต่อ
 - 3.2 ถ้าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ตอบชื่อยาในข้อที่ 1 ช้ากับชื่อยาที่จะถามในข้อ 2 สำหรับยาที่ตอบตรงนั้น ให้ถามต่อในหัวข้อผลการรักษาข้อเดียว

- 3.3 ถ้าตอบชื่อยาในข้อที่ 1 ไม่ซ้ำกับชื่อยาในข้อ 2 ให้ถามในข้อ 2 เรียงลำดับดังนี้
 - 3.3.1 รู้จัก หรือไม่รู้จัก
 - 3.3.2 ถ้ารู้จัก เคยใช้หรือไม่ ใช้รักษาอะไร ผลการรักษาเป็นอย่างไร
 - 3.3.3 ถ้ารู้จัก แต่ไม่เคยใช้ ถามสาเหตุที่ไม่เคยใช้ยา
 - 3.3.4 ถ้าไม่รู้จัก ไม่ต้องถามต่อ
- 3.4 ถามคำถามข้อ 3, 4, 5 ต่อ โดยเขียนคำตอบที่ได้รับลงในแบบสอบถาม
4. แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 3 ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละข้อ
5. หลังจากสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ในแต่ละส่วน เรียบร้อยแล้ว แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 2 นำมาพิจารณาให้คะแนนอีกครั้งหนึ่ง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

แบบสัมภาษณ์

เรื่อง

ความรู้ ทักษะ และการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

เลขที่แบบสัมภาษณ์

วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์

บ้านเลขที่ หมู่ที่..... ตำบลขุนทอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ปัจจุบันอายุเท่าไร

 ต่ำกว่า 20 ปี 20-30 ปี 30-40 ปี มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

2. สถานภาพสมรส

 คู่ หม้าย, หย่า, แยก

3. สถานภาพในครอบครัว

 หัวหน้าครอบครัว ภรรยา บุตร หลาน ผู้อาศัย อื่น ๆ (ระบุ)

4. จบการศึกษาชั้นใด

 ไม่ได้เรียน ประถมปีที่ 1 - ประถมปีที่ 4 ประถมปีที่ 5 - ประถมปีที่ 7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตร อุดมศึกษา

5. อาชีพ (อาชีพหลักที่ทำเป็นส่วนใหญ่ในรอบปี)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้ทำงาน | <input type="checkbox"/> ทำนา ทำไร่ ทำสวน |
| <input type="checkbox"/> รับจ้าง (ระบุ)..... | <input type="checkbox"/> ค้าขาย |
| <input type="checkbox"/> รับราชการ | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)..... |

6. รายได้ครอบครัว (ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งหักต้นทุนในมางงานออกแล้ว)

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> ทำนา ได้ข้าว | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> ทำไร่ | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> ทำสวน | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> เลี้ยงสัตว์ | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> ค้าขาย | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> รับราชการ | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> รับจ้าง (อิสระ) | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> เป็นลูกจ้าง (ได้เงินเดือน) | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> หนีตกรรรมในครัวเรือน | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> มีบ้านให้เช่า | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> ค่าเช่านา, สวน | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> บุตรหรือญาติส่งให้ | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ | คิดเป็นเงิน | บาท/ปี |
| รวมเงิน | | บาท/ปี |

7. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้านหรือไม่

- | | |
|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เป็น (ตำแหน่ง | <input type="checkbox"/> ไม่เป็น |
|--|----------------------------------|

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรู้ และการใช้ยาสมุนไพรประจำบ้าน

1. ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคยรักษาอาการดังต่อไปนี้ด้วยยาหรือไม่ ?			2. ท่านรู้จักยาสมุนไพรประจำบ้านตามรายชื่อต่อไปนี้หรือไม่							
อาการ	เคย	ไม่เคย	ยาที่ใช้	ชื่อยา	ไม่รู้จัก	รู้จัก	เคยใช้รักษาอาการอะไร	ผลต่อรักษา	ไม่เคยใช้	สาเหตุไม่ใช้ยา
1. อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ				1. ยาธาตุน้ำแดง 2. ดิงเจอร่มหาพิงก์ 3. ยาเม็ดโซคามีนส์						
2. อาการแน่นท้อง ทิวปวดอึปวก				4. ยาน้ำสังวาทันผาก อะลูมินาแมกนีเซียขององค์การเภสัชกรรม 5. ยาเม็ดอะลูมินาแมกนีเซียที่ต้องเก็บยาก่อนกิน 6. ยาเม็ดโซคามีนส์ (ตามรื้อกับบารามการที่ 3)						
3. อาการปวด อาการไข้				7. ยานารารเซตามอล 8. ยานอกโซไมน						

อาการ	เคย	ไม่ เคย	ยาที่ใช้	ชื่อยา	ไม่ รู้จัก	รู้จัก	เคย ใช้	ใช้รักษาอาการ อะไร	ผลการรักษา	ไม่เคย ใช้	สาเหตุไม่ใช้ยา
4. อาการท้องร่วง				9. ยาน้ำเอนทิโม-เปคติน 10. มงน้ำตาลเกลือแร่ หรือโออาร์เอส							
5. อาการไอ				11. ยาแก้ไอฟ้าคำ							
6. อาการคันจมูก น้ำมูกไหล หรือแพ้				12. ยาเม็ดคอกเฟนิรามีน (ยาเม็ดสีเหลือง เล็ก ๆ)							
7. อาการอักเสบเนื่องจากการ ติดเชื้อ เช่น เจ็บในลำคอ เป็นฝีหนอง				13. ยาซัลฟาไดอาซีน							
8. ถ้ามัวยาล้ำได้				14. ยาถ่ายพยาธิชนิดรวม มี เบนดาโซล							

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

อาการ	เคย	ไม่เคย	ยาที่ใช้	ชื่อยา	ไม่รู้จัก	รู้จัก	เคยใช้	ใช้รักษาอาการอะไร	ผลการรักษา	ไม่เคยใช้	สาเหตุไม่ใช้ยา
9. เป็นแผลสด				16. บานตง 18. ทิงเจอร์ไอโอดีน (ทิน้ำตาล) 17. ทิงเจอร์โทเนอไรชาด (สีส้ม)							

3. จากข้อ 2.8 ถ้าท่านรู้จักยาแอสไพริน ท่านคิดว่าควรกินเวลาใด

.....
.....

4. จากข้อ 2.10 ถ้าท่านรู้จักผงน้ำตาลเกลือแร่ ท่านทราบหรือไม่ว่า ผงน้ำตาลเกลือแร่เมื่อละลายน้ำแล้วเก็บไว้ได้นานกี่ชั่วโมง

.....

5. ท่านทราบหรือไม่ว่า หลังกินยาคนไข้มีอาการแพ้ที่หน้าอกเมื่อไรจะมีอาการขึ้นบ้างจะอย่างไร

.....

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ส่วนที่ 3 แบบวัดทัศนคติต่อยาสามัญประจำบ้าน

คำแนะนำ

พนักงานสัมภาษณ์อธิบายแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนว่า เรื่องที่จะถามต่อไปนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้สึก ต่อยาสามัญประจำบ้าน ให้ตอบตามความคิดเห็นตัวเอง โดยให้คะแนนดังต่อไปนี้

<u>ข้อคำถามด้านบวก</u>	ผู้ตอบ "เห็นด้วย"	ได้คะแนน 3
	ผู้ตอบ "เฉย ๆ หรือ ไม่แน่ใจ"	ได้คะแนน 2
	ผู้ตอบ "ไม่เห็นด้วย"	ได้คะแนน 1
<u>ข้อคำถามด้านลบ</u>	ผู้ตอบ "เห็นด้วย"	ได้คะแนน 3
	ผู้ตอบ "เฉย ๆ หรือ ไม่แน่ใจ"	ได้คะแนน 2
	ผู้ตอบ "ไม่เห็นด้วย"	ได้คะแนน 1

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า	เห็นด้วย	เฉย ๆ หรือ ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1. การส่งเสริมให้ใช้ยาสามัญประจำบ้านเป็นเรื่องที่ดี			
2. ท่านนิยมนานอกรายการยาสามัญประจำบ้านมากกว่ายาสามัญประจำบ้าน			
3. ยาสามัญประจำบ้าน ให้ผลการรักษาไม่ดี			
4. ยาสามัญประจำบ้าน ส่วนใหญ่มีราคาสูง			
5. ยาสามัญประจำบ้าน มีลักษณะไม่น่าใช้ เช่นรูปร่างขวด, กล่อง, ซอง, สี, กลิ่น			
6. ยาสามัญประจำบ้าน ส่วนใหญ่มีอันตรายน้อย			

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า	เห็นด้วย	เฉย ๆ หรือ ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
7. ยาสามัญประจำบ้านที่ใช้รักษาอาการปวดไข้ ได้ผล น้อยกว่ายาแก้ปวดชนิดซอง, ชนิดผง			
8. รู้สึกกลัวจะไม่หายหากต้องรักษาโรคบางโรคด้วยยา สามัญประจำบ้าน			
9. ส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยท่านคิดจะไปหาซื้อยาสามัญ ประจำบ้านก่อน			
10. การใช้ยาสามัญประจำบ้าน เป็นสิ่งล้าสมัยไม่ทัน เหตุการณ์			
11. การหาซื้อยาสามัญประจำบ้าน ไม่สะดวก			

ภาคผนวก ข.

สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาคะแนนเฉลี่ย (Means) โดยใช้สูตร (จรัล จันทลักษณ์, 2523 : 16)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{N}$$

เมื่อ \bar{x} = ค่าคะแนนเฉลี่ย N = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

n
 $\sum_{i=1}^n X_i$ = ผลรวมของคะแนนแต่ละคน i มีค่า = 1, 2, 3, ..., n
 $i=1$

2. หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (จรัล จันทลักษณ์, 2523 : 20)

$$S.D = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

เมื่อ S.D = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

$$\begin{aligned}
 X_i &= \text{คะแนนของแต่ละคน } i = 1, 2, 3, \dots, n \\
 \bar{X} &= \text{ค่าเฉลี่ยของคะแนน} \\
 n & \\
 \sum_{i=1} (X_i - \bar{X})^2 &= \text{ผลรวมกำลังสองของผลต่างคะแนนของแต่ละคนกับค่าเฉลี่ยของคะแนน}
 \end{aligned}$$

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple linear Regression) และทดสอบความมีนัยสำคัญ (จรัล จันทลักษณ์ 2523, 82)

$$r = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{[\sum x^2 - (\sum x)^2] [\sum y^2 - (\sum y)^2]}$$

เมื่อ r = ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม

$\sum x$ = ผลรวมของคะแนนตัวแปรต้น

$\sum y$ = ผลรวมของคะแนนตัวแปรตาม

$\sum xy$ = ผลรวมของผลคูณระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

$\sum x^2$ = ผลรวมกำลังสองของคะแนนตัวแปรต้น

N = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ทดสอบความมีนัยสำคัญโดยใช้สูตร

$$F = \frac{\text{MS Regression}}{\text{MSE}}$$

$$MS_{Regression} = \frac{SS_{Regression}}{d.f} = \frac{SS_{Regression}}{K - 1}$$

$$MSE = \frac{SSE}{d.f} = \frac{SSE}{n - k}$$

$$SS_{Regression} = \frac{[\sum(x_1 - \bar{x})(y_1 - \bar{y})]^2}{\sum(x_1 - \bar{x})^2}$$

$$SSE = \frac{\sum(y_1 - \bar{y})^2 - \frac{[\sum(x_1 - \bar{x})(y_1 - \bar{y})]^2}{\sum(x_1 - \bar{x})^2}}$$


เมื่อ n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
 k = จำนวนของกลุ่มเปรียบเทียบ

$[\sum(x_1 - \bar{x})(y_1 - \bar{y})]^2$ = ค่ากำลังสองของผลรวมของผลคูณระหว่าง

คะแนนที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยของ x (ตัวแปรต้น) กับคะแนนที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยของ y (ตัวแปรตาม)

$\Sigma(x_1 - \bar{x})^2$ = ผลรวมของค่ากำลังสองของคะแนนที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย
ของ x

$\Sigma(y_1 - \bar{y})^2$ = ผลรวมของค่ากำลังสองของคะแนนที่เบี่ยงเบนไปจากค่า
เฉลี่ยของ y



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดของยาสามัญประจำบ้าน

รายการยาในบัญชียาสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน

เป็นรายการยาสามัญประจำบ้านฉบับลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 กระทรวงสาธารณสุข

ยากัดปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

1. ยาราดน้ำแดง (Stomachic Mixture)
2. เหล้าสะระแหน่ (Peppermint Spirit)
3. ยาน้ำชาลอค-เมนทอล (Salol and Menthol Mixture)
4. ยาเม็ดอะลูมินา-แมกนีเซีย (Alumina and Magnesia Oral Suspension)
5. ยาน้ำอะลูมินา-แมกนีเซีย (Alumina and Magnesia Oral Suspension)
6. ยาเม็ดโซดาไมท์ (Sodamint Tablets)
7. ยาขับลม (Compound Cardamom Mixture)
8. ยาขับลมสำหรับเด็ก (Sodium Bicarbonate Mixture, Pediatric)
9. ทิงเจอร์มหาหิงค์ (Tincture Asafetida)

ยากัดท้องเสีย

10. ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร (Camphorated Opium Tincture)
11. ยาน้ำเคลลินเปกติน (Kaolin Mixture with Pectin)
12. พงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) (Oral Rehydration Salts)

ยาระบายยาลำลาย

13. น้ำมันละหุ่งหอมหวาน (Aromatic Castor Oil)
14. ยาระบายพาราฟิน (Liquid Paraffin Emulsion)
15. ยาระบายแมกนีเซีย (Milk of Magnesia or Cream of Magnesia)
16. ดีเกลือ (Magnesium Sulfate)
17. ยาระบายมะขามแขก (Senna Tablets)
18. ยาสวนทวาร (Sodium Chloride Enema)

ยาลำลายพยาธิลำไส้

19. ยาลำลายพยาธิไตรครวม (Mebendazole Tablets)

ยานแก้ปวด ลดไข้

20. ยาเม็ดแอสไพริน (Aspirin Tablets. 300 mg.)
21. ยาเม็ดพาราเซตามอล (Paracetamol Tablets, 500 mg.)
22. ยาลดไข้ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก (Paracetamol Syrup, Pediatric)

ยานแก้ไอ

23. ยานแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก (Ammonium Carbonate and Glycyrrhiza Mixture)
24. ยานแก้ไอน้ำเชื่อม (Cough Syrup)
25. ยานแก้ไอน้ำดำ (Brown Mixture)
26. ยานขับเสมหะ (Compound Ammonium Carbonate Syrup)

ยานแก้หวัด

27. น้ำมันยูคาลิปตัส (Eucalyptus Oil)
28. ยาดมแก้คัดจมูก (Cold Inhalant)
29. ยาหยอดจมูก (Ephedrine Nasal Drops)

ยาแก้แพ้

30. ยาเม็ดแก้แพ้ (Chlopheniramine Maleate Tablets, 2 mg.)

ยาดมแก้วิงเวียน หน้ามืด

31. ยาดมแอมโมเนียหอม (Aromatic Ammonia Inhalant)

32. เหล้าแอมโมเนียหอม (Aromatic Ammonia Spirit)

ยารักษาอาการอักเสบจากการติดเชื้อ

33. ยาเม็ดซัลฟาไดอาซีน (Sulfadiazine Tablets)

34. ยาน้ำซัลฟาไดอาซีนสำหรับเด็ก (Sulfadiazine Suspension Pediatric)

ยาแก้ไข้มาเลเรีย

35. ยาเม็ดคลอโรควิน (Chloroquine Phosphate Tablets)

36. ยาเม็ดควินินซัลเฟต (Quinine Sulfate Tablets)

37. ยาเม็ดซัลฟาดีออกซินพัยริเมตามีน (Sulfadoxine and Pyrimethamine Tablets)

ยากินบำรุงร่างกาย

38. ยาเม็ดบำรุงโลหิต (Compound Ferrous Sulfate Tablets)

39. ยาเม็ดวิตามินรวม (Multivitamin Tablets)

40. ยาแคปซูลวิตามินรวม (Multivitamin Capsules)

41. ยาเม็ดวิตามินบีหนึ่ง (Vitamin B₁ Tablets)

42. ยาเม็ดวิตามินบีรวม (Vitamin B Complex Tablets)

43. ยาเม็ดวิตามินซี (Vitamin C Tablets)

44. ยาแคปซูลน้ำมันตับปลา (Fish Liver Oil Capsules)

ยาสำหรับโรคตา หู และคอ

45. ยากวาดคอ (Mandl's Paint)

46. ยาน้ำเขนเขี่ยนไวโอเล็ต (Gentian Violet Solution)

47. ยานหยอดตา (Sulfacetamide Eye Drops)
48. ยารักษาโรคผิวหนังตา (Tetracycline Eye Ointment)
49. ยานหยอดหู (Nitrofurazone Ear Drops)

ยาสำหรับโรคผิวหนัง

50. ยารักษาหิดเหา (Scabicide Emulsion)
51. ขี้ผึ้งกำมะถัน (sulphur Ointment)
52. ขี้ผึ้งซาลิซิลิกและกำมะถัน (Salicylic Acid and Sulphur Ointment)
53. ครีมซาลิซิลิกและกำมะถัน (Salicylic Acid and Sulphur Cream)
54. ยาทาแก้ผดผื่นคัน (Calamine Lotion)
55. ขี้ผึ้งรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง (Coal Tar Ointment)
56. ยารักษากลากเกลื้อน (Whitfield's Ointment)

ยาใส่แผล ล้างแผล

57. ทิงเจอร์ไอโอดีน (Iodine Tincture)
58. ทิงเจอร์ใส่แผลสด (Thimerosal Tincture)
59. ยาแดง (Merbromin Solution)
60. ยาเหลือง (Acriflavine Solution)
61. ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก (Burns and Scalds Mixture)

ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

62. ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม (Analgesic Balm)

ยาแก้ปวดฟัน

63. ยาแก้ปวดฟัน (Toothache Drops)

1. ยารักษาแน่น้ำแดง (Stomachic Mixture)

ในหนึ่งช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) มี

Sodium Bicarbonate	0.60	g
Compound Tinospora Tincture	0.50	ml
Compound Rhubarb Tincture	1.60	ml
Compound Cardamom Tincture	0.50	ml
Peppermint Spirit	0.30	ml
Purified Water to	15.00	ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และช่วยเจริญอาหาร

วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา

เด็ก 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา

ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

2. เหล้าสะระแหน่ (Peppermint Spirit)

ตามตำรับต่อไปนี้

Peppermint Oil	10.00	ml
Alcohol (90 percent) to	100.00	ml

สรรพคุณ ขับลม บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ จุกเสียด

วิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 15-30 หยด เจือน้ำพอกว

ขนาดรับประทานของเด็กลดลงตามส่วน

ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร

3. ยาน้ำชาลอล-เมนทอล (Salol and Menthol Mixture)

ในหนึ่งช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) มี

Salol	0.30	g
Peppermint Oil	0.06	ml
Anise Oil	0.01	ml
Alcohol (90 percent)	0.30	ml
Glycerin	1.00	ml
Acacia	0.30	g
Tragacanth	0.12	g
Purified water to	15.00	ml

สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

วิธีใช้

เขย่าขวดก่อนใช้ยา

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนโต๊ะ (7.5 -15 มิลลิลิตร)

เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)

ขนาดบรรจุ

180 มิลลิลิตร

4. ยาเม็ดอะลูมินา-แมกนีเซีย (Alumina and Magnesia Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Aluminium Hydroxide	230	mg
Magnesium Hydroxide	85	mg

สรรพคุณ

บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อและปวดท้อง เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

วิธีใช้	เคี้ยวยาก่อนกลืน
	รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมงหรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
	ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
	เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
คำเตือน	ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือไตพิการ
ขนาดบรรจุ	20 เม็ด และ 50 เม็ด

5. ยาน้ำอะลูมินา-แมกนีเซีย (Alumina and Magnesia Oral Suspension)

ในหนึ่งช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) มี

Dried Aluminium Hydroxide Gel	
Equivalent to Aluminium Hydroxide	230.00 mg
Magnesium Hydroxide	85.00 mg
Peppermint Oil	0.015 ml
Sorbitol Solution	4.50 ml
Sodium Benzoate	0.075 mg
Purified Water to	15.00 ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้อง เนื่องจากมีกรดมากใน

กระเพาะอาหาร หรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมงหรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร)

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนโต๊ะ (7.5-15 มิลลิลิตร)

เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)

คำเตือน ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือไตพิการ

ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

6. ยาเม็ดโซดาไมท์ (Sodamint Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Sodium Bicarbonate 300.00 mg

Peppermint Oil 0.003 ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ขับลม ลดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหาร

วิธีใช้ รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-6 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 เม็ด

ขนาดบรรจุ 20 เม็ด และ 50 เม็ด

7. ยาขับลม (Compound Cardamom Mixture)

ในหนึ่งช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) มี

Capsicum Tincture 0.06 ml

Compound Cardamom Tincture 1.80 ml

Strong Ginger Tincture 0.24 ml

Camphor Spirit 0.30 ml

Glycerin 0.30 ml

Purified Water to 15.00 ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะ

วิธีใช้ รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนโต๊ะ (7.5-15 มิลลิลิตร)

ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร

8. ยาขับลมสำหรับเด็ก (Sodium Bicarbonate Mixture, Pediatric)

ในหนึ่งช้อนชา (15 มิลลิลิตร) มี

Sodium Bicarbonate	50.00	mg
Concentrated Dill Water	0.10	ml
Weak Ginger Tincture	0.05	ml
Glycerin	0.50	ml
Sodium Benzoate	7.50	mg
Syrup (85 percent)	2.00	ml
Purified Water to	5.00	ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะ

วิธีใช้ รับประทานวันละ 3 ครั้ง

เด็ก 1-5 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)

เด็กต่ำกว่า 1 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)

ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

9. ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ (Asafetida Tincture)

ตามตำรับต่อไปนี้

Asafetida	20.00	g
Alcohol (95 percent) to	100.0	ml

สรรพคุณ	บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก
วิธีใช้	ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
ขนาดบรรจุ	15 มิลลิลิตร

10. ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร (Camphorated Opium Tincture)

ในหนึ่งช้อนชา (5 มิลลิลิตร) มี

Opium Tincture	0.25 mg
Benzoic Acid	0.025 g
Camphor	0.015 g
Anise Oil	0.015 ml
Alcohol (60 percent) to	5.00 mg

สรรพคุณ	บรรเทาอาการปวดท้อง ท้องเสีย ท้องร่วง
วิธีใช้	ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร) เจือน้ำพอกวาง เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร) เจือน้ำพอกวาง
คำเตือน	ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 3 วัน ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และคนชรา
ขนาดบรรจุ	15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

11. ยาน้ำเคลลินเปกติน (Kaolin Mixture with Pectin)

ในหนึ่งช้อนชา (5 มิลลิลิตร) มี

Steriled Light Kaolin	1.00 g
Pectin	0.05 g

Tragacanth	0.025	g
Saccharin Sodium	0.005	g
Glycerin	0.10	ml
Benzoic Acid	0.01	g
Peppermint Oil	0.0037	ml
Purified Water to	5.00	ml

สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องเสีย ท้องร่วง

วิธีใช้

เขย่าขวดก่อนใช้ยา

รับประทานวันละ 4-6 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)

เด็ก 3-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)

เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)

ขนาดบรรจุ

180 มิลลิลิตร

12. พงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) (Oral Rehydration Salts)

ในหนึ่งซอง (20.925 กรัม) มี

Glucose	15.0	g
Sodium Chloride	2.625	g
Sodium Citrate Dihydrate	2.175	g
Potassium Chloride	1.125	g

สรรพคุณ

ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่มีอาเจียนมาก ๆ หรือ
 เสียเหงื่อมาก ๆ ก็ได้ แก้อาการกระหายน้ำ และป้องกันการช็อค เนื่องจากการ
 ที่ร่วงถ่ายขาดน้ำ

- วิธีใช้ เทพงยาทั้งซอง ละลายในน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว หรือน้ำฝนประมาณ 750 มิลลิลิตร (1 ขวดสุรากลม) ใช้ดื่มมาก ๆ เมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อย ให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วย ให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง
- ขนาดการใช้ เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ ดื่มมาก ๆ ต่างน้ำ วันละ 2-3 ซอง เด็ก 1-6 ปี ดื่มให้หมดขวด ในเวลา 6-8 ชั่วโมง และดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น
- เด็กทารก ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ำเปล่าให้หมดขวด ภายในเวลา 4 ชั่วโมง และดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น
- คำเตือน (1) ผู้เป็นโรคไต หรือโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ (2) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการอาเจียนมาก เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปหรือหมดสติ ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน (3) อย่าละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) ในน้ำร้อน (4) เมื่อละลายน้ำแล้วเกิน 24 ชั่วโมง ยาจะบูดเสียไม่ควรใช้
- ขนาดบรรจุ ซองละ 20.925 กรัม

13. น้ำมันละหุ่งหอมหวาน (Aromatic Castor Oil)

ในหนึ่งช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) มี

Cinnamon Oil	0.045	ml
Clove Oil	0.015	ml
Saccharin	6.66	mg
Alcohol (95 percent)	0.45	ml
Castor Oil to	15.00	ml

สรรพคุณ ยาถ่าย

วิธีใช้	รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า
	ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)
	เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนชา (5-15 มิลลิลิตร)
	เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/4 - 1 ช้อนชา (1-5 มิลลิลิตร)
คำเตือน	ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้อาเจียน
ข้อแนะนำ	ควรรับประทานพร้อมกับนม หรือน้ำผลไม้
ขนาดบรรจุ	30 มิลลิลิตร

14. ยาระบายพาราฟิน (Liquid Paraffin Emulsion)

ในหนึ่งช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) มี

Liquid Paraffin	7.5	ml
Acacia	1.125	g
Tragacanth	0.075	g
Cinnamon Oil	0.003	ml
Lemon Oil	0.003	ml
Myristica Oil	0.015	ml
Benzoic Acid	0.015	g
Saccharin Sodium	0.0015	g
Glycerin	0.75	g
Purified Water to	15.00	ml

สรรพคุณ

ยาระบาย

วิธีใช้

เขย่าขวดก่อนใช้ยา

รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า

ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)

คำเตือน ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้ อาเจียน
 ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

15. ยาระบายแมกนีเซียม (Milk of Magnesia or Cream of Magnesia)

ในหนึ่งช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) มี

Magnesium Hydroxide	1.2	g
Purified Water to	15.0	ml

สรรพคุณ ยาระบาย

วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร)

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)

เด็ก 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนโต๊ะ (5-15 มิลลิลิตร)

คำเตือน ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้ อาเจียน

ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

16. ดีเกลือ (Magnesium Sulfate)

ในหนึ่งซอง (30 กรัม) มี

Magnesium Sulfate	30	g
-------------------	----	---

สรรพคุณ ยาถ่าย

วิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ซอง ละลายด้วยน้ำร้อนพอควร แล้วดื่มน้ำอุ่นตามให้มาก ๆ

คำเตือน ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้ อาเจียน

ขนาดบรรจุ ซอง 30 กรัม

17. ยาระบายมะขามแขก (Senna Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี	ฝักมะขามแขกที่เอาเม็ดออกแล้ว ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg
สรรพคุณ	ยาระบาย
วิธีใช้	รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-4 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
คำเตือน	ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน
ขนาดบรรจุ	10 เม็ด

18. ยาสวนทวาร (Sodium Chloride Enema)

ตามตำรับต่อไปนี้

Sodium Chloride	0.9	g
Purified Water to	100.0	ml

สรรพคุณ ใช้สวนทวารให้ถ่ายอุจจาระ

วิธีใช้ สวนเข้าทางทวารหนัก แล้วกลืนไว้จนทนไม่ไหวจึงเข้าส้วม

ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 150 มิลลิลิตร

เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้งละ 100 มิลลิลิตร

เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้งละ 50 มิลลิลิตร

คำเตือน ยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร, 100 มิลลิลิตร และ 150 มิลลิลิตร

19. ยาถ่ายพยาธิชนิดรวม (Mebendazole Tablets)

ในหนึ่งเม็ดประกอบด้วย

Mebendazole 100 mg

สรรพคุณ

ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม ตัวตืด

วิธีใช้

สำหรับพยาธิเส้นด้าย

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รับประทาน 1 เม็ด หลังอาหารเช้าเพียงครั้งเดียว

สำหรับพยาธิอื่น ๆ

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รับประทาน 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

ติดต่อกัน 3-5 วัน

คำเตือน

ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผู้ป่วยโรคตับ

ขนาดบรรจุ

6 เม็ด

20. ยาเม็ดแอสไพริน (Aspirin Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Aspirin 300 mg

สรรพคุณ

ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

วิธีใช้

รับประทานหลังอาหาร

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด

คำเตือน

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และสตรีมีครรภ์ระยะใกล้คลอดห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ

10 เม็ด

21. ยาเม็ดพาราเซตามอล (Paracetamol Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Paracetamol 500 mg

สรรพคุณ

ลดไข้บรรเทาอาการปวด

วิธีใช้

รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 เม็ด

เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/4 - 1/2 เม็ด

คำเตือน

ห้ามใช้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน เนื่องจากอาจมีพิษต่อตับได้

ขนาดบรรจุ

10 เม็ด

22. ยาลดไข้ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก (Paracetamol Syrup, Pediatric)

ในหนึ่งช้อนชา (5 มิลลิลิตร) มี

Paracetamol 120.00 mg

Alcohol (95 percent) 0.375 ml

Propylene Glycol 0.50 ml

Sorbitol Solution 1.00 ml

Purified Water 0.50 ml

Syrup (85 percent) to 5.00 ml

สรรพคุณ

ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

วิธีใช้

รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง

เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)

เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)

คำเตือน ห้ามใช้ติดต่อกันเกิน 5 วัน เนื่องจากอาจมีพิษต่อตับได้

ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร

23. ยาน้ำไอขับเสมหะสำหรับเด็ก (Ammonium Carbonate and Glycyrrhiza Mixture)

ในหนึ่งช้อนชา (5 มิลลิลิตร) มี

Ammonium Carbonate	0.02	g
Ipecacuanha Tincture	0.05	ml
Glycyrrhiza Fluidextract	0.25	ml
Syrup (85 percent) to	5.00	ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

วิธีใช้ รับประทานวันละ 3 - 4 ครั้ง

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)

เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)

เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)

ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

24. ยาน้ำไอน้ำเชื่อม (Cough Syrup)

ในหนึ่งช้อนชา (5 มิลลิลิตร) มี

Antimony Potassium Tartrate	0.0012	g
Camphorated Opium Tincture	0.60	ml
Terpin Hydrate	0.0004	g
Glycerin	0.80	ml
Sucrose	2.50	g
Glacial Acetic Acid	0.03	ml

	Benzoic Acid	0.005 g
	Purified Water to	5.00 ml
สรรพคุณ	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ	
วิธีใช้	รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง	
	ผู้ใหญ่	รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
	เด็ก 6-12 ปี	รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)
คำเตือน	ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี และคนชรา	
	ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 3 วัน	
ขนาดบรรจุ	60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร	

25. ยาน้ำไอน้ำดำ (Brown Mixture)

ในหนึ่งช้อนชา (5 มิลลิลิตร) มี

	Glycyrrhiza Fluidextract	0.60 ml
	Antimony Potassium Tartrate	1.20 mg
	Camphorated Opium Tincture	0.60 ml
	Alcohol (95 percent)	0.15 ml
	Glycerin	0.60 ml
	Purified Water to	5.00 ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ

วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)

คำเตือน ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี และคนชรา
ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 3 วัน

ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

26. ยาขับเสมหะ (Compound Ammonium Carbonate Syrup)

ในหนึ่งช้อนชา (5 มิลลิลิตร) มี

Ammonium Carbonate	100.00	mg
Glycyrrhiza Fluidextract	0.25	ml
Ipecacuanha Tincture	0.15	ml
Concentrated Camphor Water	0.05	ml
Concentrated Anise Water	0.025	ml
Purified Water to	5.00	ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)

ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

27. น้ำมันยูคาลิปตัส (Eucalyptus Oil)

ตามคำรับต่อไปนี้

Eucalyptus Oil 15 ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก

วิธีใช้ ใช้สูดดม หรือทาบาง ๆ ตามคอและหน้าอก

คำเตือน ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร

28. ยาคมนแก้คัดจมูก (Cold Inhalant)

ตามตำรับต่อไปนี้

Camphor	2.00	g
Eucalyptus Oil	5.00	ml
Menthol	15.00	g
Lavender Oil	6.00	ml
Bornyl Acetate	1.00	g
Alcohol (95 percent) to	100.00	ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก

วิธีใช้ ใช้สูดดม หรือทาบาง ๆ ตามคอและหน้าอก

คำเตือน ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 4 มิลลิลิตร

29. ยาหยอดจมูก (Ephedrine Nasal Drops)

ตามตำรับต่อไปนี้

Ephedrine Hydrochloride	0.50	g
Chlorobutanol	0.50	g
Sodium Chloride	0.50	g
Purified Water to	100.00	ml

สรรพคุณ ลดอาการคัด กังในจมูก

วิธีใช้ ผู้ใหญ่ใช้หยอดจมูกวันละ 2-3 ครั้ง เด็กใช้สำลีพันปลายไม้ชุบยาป้ายในจมูก
วันละ 2-3 ครั้ง

คำเตือน ยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน ถ้าใช้บ่อยเกินไป จะทำให้เยื่อจมูกบวม

ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร

30. ยาเม็ดแก้แพ้ (Chlorpheniramine Maleate Tablets)

ในหนึ่งเม็ดประกอบด้วย

Chlorpheniramine Maleate 2.00 mg

สรรพคุณ บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล

วิธีใช้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

คำเตือน ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน 7-10 วัน ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

ขนาดบรรจุ 20 เม็ด

31. ยาดมแอมโมเนียหอม (Aromatic Ammonia Inhalant)

ตามตำรับต่อไปนี้

Ammonium Carbonate 15.00 g

Strong Ammonia Solution 2.80 ml

Lemon Oil 0.30 ml

Alcohol (95 percent) 0.90 ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืด

วิธีใช้ ใช้สูดดม

คำเตือน ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 12 กรัม

32. เหล้าแอมโมเนียหอม (Aromatic Ammonia Spirit)

ตามตำรับต่อไปนี้

Ammonium Carbonate	3.40	g
Strong Ammonia Solution	3.60	ml
Lemon Oil	1.00	ml
Myristica Oil	0.10	ml
Lavender Oil	0.10	ml
Alcohol (95 percent)	70.00	ml
Purified Water to	100.00	ml

สรรพคุณ ตมบรรเทาอาการวิงเวียน มีดหน้า หรือทาผิวหนังบรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพิษมีพิษ

วิธีใช้ ใช้ขุบสำลีตม หรือใช้ทา

คำเตือน ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร

33. ยาเม็ดซัลฟาไดอะซีน (Sulfadiazine Tablets)

ในหนึ่งเม็ด

Sulfadiazine 500 mg

สรรพคุณ รักษาอาการอักเสบเนื่องจากติดเชื้อ เช่น เจ็บในคอ เป็นฝีหนอง หรือเป็นหนอง

วิธีใช้ รับประทานทุก 6 ชั่วโมง ดังนี้

	ผู้ใหญ่	รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
	เด็ก 6-12 ปี	รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
	เด็ก 3-6 ปี	รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด
คำเตือน	ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี	
	สตรีมีครรภ์หรือคนไข้โรคไตพิการ ไม่ควรรับประทานยานี้	
	ขณะรับประทานยานี้ให้ดื่มน้ำมากๆ	
ขนาดบรรจุ	40 เม็ด	

34. ยาน้ำซัลฟาไดอาซีนสำหรับเด็ก (Sulfadiazine Suspension, Pediatric)

ในหนึ่งช้อนชา (5 มิลลิลิตร) มี

Sulfadiazine	250.00	ml
Pectin	40.00	ml
Sodium Alginate Solution	2.15	ml
Sorbitol Solution	500.00	ml
Methylparaben	9.00	ml
Propylparaben	1.00	ml
Saccharin Sodium	0.005	ml
Alcohol	0.05	ml
Vanillin	5.00	ml
Syrup (85 percent) to	5.00	ml

สรรพคุณ รักษาอาการอักเสบเนื่องจากติดเชื้อ เช่น เจ็บในคอ เป็นฝีหนอง หรือเป็นหนอง

วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานทุก ๆ 6 ชั่วโมง

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)

เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)

คำเตือน	ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี คนไข้โรคไตพิการไม่ควรใช้ยานี้ ขณะรับประทานยานี้ให้ดื่มน้ำมาก ๆ
ขนาดบรรจุ	60 มิลลิกรัม และ 120 มิลลิกรัม

35. ยาเม็ดคลอโรควิน (Chloroquine Phosphate Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี	Chloroquine Phosphate	250	mg
สรรพคุณ	รักษาไข้มาลาเรีย		
วิธีใช้	วันที่ 1	วันที่ 2 และ 3	
ผู้ใหญ่	ครั้งละ 2 เม็ดหลังอาหารเช้า, กลางวันและเย็น	วันละ 2 เม็ด	
เด็ก 9-14 ปี	ครั้งละ 2 เม็ดหลังอาหารเช้า และเย็น	วันละ 1 เม็ด	
เด็ก 4-8 ปี	ครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า กลางวันและเย็น	วันละ 1 เม็ด	
เด็ก 1-3 ปี	ครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า และเย็น	วันละ 1/2 เม็ด	
เด็ก 6-11 เดือน	ครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า	วันละ 1/2 เม็ด	
คำเตือน	ถ้าไม่หายให้ปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่มาลาเรีย		
ขนาดบรรจุ	10 เม็ด		

36. ยาเม็ดควินินซัลเฟต (Quinine Sulfate Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี	Quinine Sulfate Tablets	300	mg
สรรพคุณ	รักษาไข้มาลาเรีย		
วิธีใช้	รับประทานหลังอาหารติดต่อกันนาน 7 วัน		

ผู้ใหญ่	รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
เด็ก 9-14 ปี	รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
เด็ก 4-8 ปี	รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
เด็ก 1-3 ปี	รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี	รับประทานครั้งละ 1/4 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
คำเตือน	สตรีมีครรภ์ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ ห้ามใช้ในคนไข้โรคหัวใจ ถ้ามีอาการหุ้อหรือ ไม่หายให้ปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่มาลาเรีย
ขนาดบรรจุ	20 เม็ด

37. ยาเม็ดซัลฟาดีออกซินและไพริเมธาไมน (Sulfadoxine and Pyrimethamine Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Sulfadoxine	500	mg
Pyrimethamine	25	mg

สรรพคุณ

รักษาไข้มาลาเรีย

วิธีใช้

รับประทานเพียงครั้งเดียว

ผู้ใหญ่	รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด
เด็ก 9-14 ปี	รับประทานครั้งละ 1-1/2 เม็ด
เด็ก 4-8 ปี	รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
เด็ก 1-3 ปี	รับประทานครั้งละ 3/4 เม็ด
เด็ก 6 เดือน - 11 เดือน	รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด

คำเตือน

ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน

ถ้ารับประทานยานี้แล้วไม่หายภายใน 3 วัน ห้ามกินยาซ้ำให้รับปรึกษาแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่มาลาเรีย

ขนาดบรรจุ

4 เม็ด

38. ยาเม็ดบำรุงโลหิต (Compound Ferrous Sulfate Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Dried Ferrous Sulfate Equivalent to	
Ferrous Sulfate	170.00 mg
Copper Sulfate	2.50 mg
Manganese Sulfate	2.50 mg

สรรพคุณ

รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก

วิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร (ถ้ารับประทานควบกับยาเม็ดวิตามินซี จะได้ผลดียิ่งขึ้น)

คำเตือน

ในช่วงรับประทานยาอาจจะจะมีสีดำ

ขนาดบรรจุ

20 เม็ด และ 100 เม็ด

39. ยาเม็ดวิตามินรวม (Multivitamin Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Vitamin A	1.20 mg	(4,000 IU Unit)
Vitamin D	0.01 mg	(400 USP Unit)
Vitamin C	70.00 mg	
Vitamin B ₁	2.00 mg	
Vitamin B ₂	2.00 mg	
Vitamin B ₆	2.00 mg	
Vitamin B ₁₂	0.005 mg	
Calcium Pantothenate	10.00 mg	
Folic Acid	0.10 mg	

	Nicotinamide	20.00	mg
	d- α -Tocopheryl Acetate	11.00	mg
สรรพคุณ	ป้องกันและรักษาโรคขาดวิตามิน		
วิธีใช้	รับประทานวันละ 1 เม็ด		
ขนาดบรรจุ	20 แคปซูล และ 100 เม็ด		

40. ยาแคปซูลวิตามินรวม (Multivitamin Capsules)

ในหนึ่งแคปซูลมี

Vitamin A	1.20	mg	(4,000 IU Unit)
Vitamin D	0.01	mg	(400 USP Unit)
Vitamin C	70.00	mg	
Vitamin B ₁	2.00	mg	
Vitamin B ₂	2.00	mg	
Vitamin B ₆	2.00	mg	
Vitamin B ₁₂	0.005	mg	
Calcium Pantothenate	10.00	mg	
Folic Acid	0.10	mg	
Nicotinamide	20.00	mg	
d- α -Tocopheryl Acetate	11.00	mg	

สรรพคุณ	ป้องกันและรักษาโรคขาดวิตามิน		
วิธีใช้	รับประทานวันละ 1 แคปซูล		
ขนาดบรรจุ	20 แคปซูล และ 100 แคปซูล		

41. ยาเม็ดวิตามินบีหนึ่ง (Vitamin B₁ Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 10.00 mg

สรรพคุณ

ป้องกันและรักษาโรคเหน็บชา หรือปลายประสาทอักเสบ

วิธีใช้

รับประทานวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1/2 เม็ด

ขนาดบรรจุ

20 เม็ด และ 100 เม็ด

42. ยาเม็ดวิตามินบีรวม (Vitamin B Complex Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5.00 mg

Pyridoxine Hydrochloride 2.00 mg

Riboflavine 2.00 mg

Nicotinamide 20.00 mg

สรรพคุณ

ป้องกันและรักษาอาการขาดวิตามินบี ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

เนื่องจากแพ้ท้อง

วิธีใช้

รับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 เม็ด

ขนาดบรรจุ

20 เม็ด และ 100 เม็ด

43. ยาเม็ดวิตามินซี (Vitamin C Tablets)

ในหนึ่งเม็ดมี

Ascorbic Acid 100 mg

สรรพคุณ ป้องกันและรักษาอาการของโรคขาดวิตามินซี เช่น โลหิตออกตามไรฟัน

วิธีใช้ รับประทานวันละ 3 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

คำเตือน ห้ามใช้เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี

ขนาดบรรจุ 20 เม็ด และ 100 เม็ด

44. ยาแคปซูลน้ำมันตับปลา (Fish Liver Oil Capsules)

ในหนึ่งแคปซูลมีวิตามินต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า

Vitamin A 0.3 mg (1,000 I.U.)

Vitamin D 0.0025 mg (100 I.U.)

สรรพคุณ บำรุงร่างกาย รักษาโรคขาดวิตามินเอ และดี

วิธีใช้ รับประทานวันละ 1 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล

ขนาดบรรจุ 20 แคปซูล และ 100 แคปซูล

45. ยากวาดคอ (Mandl's Paint)

ตามตำรับต่อไปนี้

Potassium Iodide 2.50 g

Iodine 1.25 g

	Alcohol (90 percent)	4.00 ml
	Purified Water	2.50 ml
	Peppermint Oil	0.40 ml
	Glycerin to	100.00 ml
สรรพคุณ	บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ	
วิธีใช้	ผู้ใหญ่ใช้กวาดในคอ วันละ 1-2 ครั้ง สำหรับเด็ก ก่อนใช้กวาดในคอให้เติมน้ำสะอาดเท่าตัว	
คำเตือน	ยาใช้เฉพาะที่ สำหรับกวาดในคอเท่านั้น	
ขนาดบรรจุ	15 มิลลิลิตร	

46. ยาน้ำเอนเซ็นไวโอเล็ต (Gentian Violet Solution)

ตามตำรับต่อไปนี้

	Gentian Violet	1.00 g
	Alcohol (90 percent)	10.00 ml
	Purified Water to	100.00 ml
สรรพคุณ	รักษากระพุ้งแก้มและลิ้นเป็นฝ้าขาว	
วิธีใช้	ใช้สำหรับยาทาตามบริเวณที่เป็นวันละ 2-3 ครั้ง	
คำเตือน	ยาใช้เฉพาะที่ สำหรับทาในปากเท่านั้น	
ขนาดบรรจุ	30 มิลลิลิตร	

47. ยาหยอดตา (Sulfacetamide Eye Drops)

ตามตำรับต่อไปนี้

	Sulfacetamide Sodium	10.00 g
	Sodium Metabisulfite	0.10 g

	Sodium Edetate	0.05	g
	Phenylmercuric Acetate or Phenylmercuric Nitrate	2.00	ml
	Sterile Water to	100.00	ml
สรรพคุณ	รักษาอาการตาแดง ตาอักเสบ		
วิธีใช้	ใช้หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง		
คำเตือน	ปิดฝาให้แน่น ระวังอย่าให้ถูกแสงแดด ห้ามใช้เมื่อขาเปลี่ยนสี ขุ่น หรือมีตะกอน ยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน		
ขนาดบรรจุ	10 มิลลิลิตร		

48. ยารักษาโรคสีดวงตา (Tetracycline Eye Ointment)

ตามคำรับต่อไปนี้

	Tetracycline Hydrochloride or Oxytetracycline Hydrochloride	1	g
	Ophthalmic Ointment Base to	100	mg

สรรพคุณ	รักษาโรคโรคสีดวงตา และตาอักเสบ		
วิธีใช้	ใช้ป้ายตาวันละ 2-3 ครั้ง		
คำเตือน	ห้ามใช้ยานี้เมื่อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบปรึกษาแพทย์ ยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน		
ขนาดบรรจุ	3.5 กรัม		

49. ยาหยอดหู (Nitrofurazone Ear Drops)

ตามตำรับต่อไปนี้

	Nitrofurazone	0.20	g
	Polyethylene Glycol 1540	32.50	g
	Polyethylene Glycol 300	32.50	g
	Purified Water to	100.00	ml
สรรพคุณ	รักษาหูเป็นน้ำหนวก หรือช่องหูอักเสบ		
วิธีใช้	ใช้หยอดหู ครั้งละ 2-3 หยด วันละ 3-4 ครั้ง		
คำเตือน	ยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน		
ขนาดบรรจุ	10 มิลลิลิตร		

50. ยารักษาเหา (Scabicide Emulsion)

ตามตำรับต่อไปนี้

	Benzyl Benzoate	25.00	g
	Emulsifying Wax B.P. 1973	2.00	g
	Purified Water to	100.00	ml

สรรพคุณ รักษาเหา โลน

วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา
สำหรับรักษาเหา

อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อน ๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคันแล้วทายาให้ทั่ว
ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาสีใหม่อีกครั้งตามวิธีเดิม

สำหรับรักษาเหาและโลน

ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณที่มีเหาหรือโลน ทิ้งไว้ 1 วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา

2 ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ 7 วัน ให้ตรวจดูอีกครึ่งหนึ่ง
ถ้ายังไม่หายให้ใส่ยาซ้ำตามวิธีเดิม

คำเตือน ระวังอย่าให้เข้าตา
ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร

51. ^{๕๕}ขี้ผึ้งกำมะถัน (Sulphur Ointment)

ตามตำรับต่อไปนี้

Sublimed Sulphur	10.00	g
Ointment Base to	100.00	ml

สรรพคุณ รักษาโรคหิดและโรคผิวหนัง

วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิด วันละ 2-3 ครั้ง

คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 15 กรัม

52. ^{๕๕}ขี้ผึ้งซาลิซิลิกและกำมะถัน (Salicylic Acid and Sulphur Ointment)

ตามตำรับต่อไปนี้

Salicylic Acid	3.00	g
Precipitated Sulphur	3.00	g
Ointment Base to	100.00	g

สรรพคุณ รักษาโรคหิดและโรคผิวหนังผื่นคัน

วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิดหรือผื่นคัน วันละ 2-3 ครั้ง

คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ให้หยุดใช้ยา

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 15 กรัม

53. ครีมซาลิซิลิกและกำมะถัน (Salicylic Acid and Sulphur Cream)

ตามตำรับต่อไปนี้

Salicylic Acid	3.00	g
Precipitated Sulphur	3.00	g
Cream Base to	100.00	g

สรรพคุณ รักษาโรคหิดและโรคผิวหนังคัน

วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิดหรือคัน วันละ 2-3 ครั้ง

คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ให้หยุดใช้ยา ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 15 กรัม

54. ยาทาแก้มคื่นฉัน (Calamine Lotion)

ตามตำรับต่อไปนี้

Calamine	15.00	g
Zinc Oxide	5.0	g
Bentonite	3.0	g
Sodium Citrate	0.5	ml
Liquefied Phenol	0.5	ml
Glycerin	5.0	ml
Purified Water to	100.00	ml

สรรพคุณ บรรเทาอาการคันเนื่องจากเป็นผดผื่นคัน

วิธีใช้ เช้าและก่อนนอน ใช้ยา

ใช้ทาบริเวณที่มีอาการ

คำเตือน ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 60 มิลลิกรัม และ 180 มิลลิกรัม

55. ขี้ผึ้งรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง (Coal Tar Ointment)

ตามตำรับต่อไปนี้

Coal Tar	1.00	g
Polysorbate 80	0.50	g
Zinc Oxide	25.00	g
Starch	25.00	g
Ointment Base to	100.00	g

สรรพคุณ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อนกวาง ผื่นคันเป็นผื่นคัน

วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง

คำเตือน ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 15 กรัม

56. ขี้ผึ้งกลากเกลื้อน (Whitfield's Ointment)

ตามตำรับต่อไปนี้

Benzoic Acid	6.00	g
Salicylic Acid	3.00	g
Ointment Base to	100.00	g

สรรพคุณ	รักษากลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า
วิธีใช้	ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน	ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ให้หยุดใช้ยา ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
ขนาดบรรจุ	15 กรัม

57. ทิงเจอร์ไอโอดีน (Iodine Tincture)

ตามตำรับต่อไปนี้

Iodine	2.5	g
Potassium Iodide	2.5	g
Purified Water	2.5	ml
Alcohol (95 percent) to	100.00	ml

สรรพคุณ	รักษาแผลสด เกลื้อนฝี
วิธีใช้	ใช้ล้างสะอาดขูดขุยทาที่แผล หรือเกลื้อนบริเวณที่เป็นฝี
คำเตือน	หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้นให้หยุดใช้ยา ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
ขนาดบรรจุ	15 มิลลิลิตร

58. ทิงเจอร์ไทเมอร์ซอล (Thimerosal Tincture)

ตามตำรับต่อไปนี้

Thimerosal	0.01	g
Monoethanolamine	0.10	g
Acetone	10.00	ml
Alcohol (95 percent)	50.00	ml

	Merbromin	0.02	g
	Purified Water to	100.00	ml
สรรพคุณ	รักษาแผลสด		
วิธีใช้	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาหรือแตะที่แผล		
คำเตือน	หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน		
ขนาดบรรจุ	15 มิลลิลิตร		

59. ยานแดง (Merbromin Solution)

ตามตำรับต่อไปนี้

	Merbromin	2.00	g
	Purified Water to	100.00	ml

สรรพคุณ	รักษาแผลสด
วิธีใช้	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาหรือแตะที่แผลสด
คำเตือน	การใช้ยานี้เป็นจำนวนมากและนานอาจเกิดอาการเป็นพิษเนื่องจากปรอทได้ หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร

60. ยาเหลือง (Acriflavine Solution)

ตามตำรับต่อไปนี้

	Acriflavine	0.10	g
	Codium Chloride	0.90	g
	Purified Water to	100.00	ml

สรรพคุณ	รักษาแผลเปื่อย
วิธีใช้	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผลหรือใช้ผ้าพันแผลชุบยาปิด
คำเตือน	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
ขนาดบรรจุ	30 มิลลิลิตร

61. ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก (Burns and Scalds Mixture)

ตามตำรับต่อไปนี้

Phenol	1.00	g
Arachis Oil	50.00	ml
Calcium Hydroxide Solution to	100.00	ml

สรรพคุณ	รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
วิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา ใช้สำลีชุบยาทาปิดให้ทั่วบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก เปลี่ยนยาวันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
ขนาดบรรจุ	60 มิลลิลิตร

62. พื้งแก้ปวดตาม (Analgesic Balm)

ตามตำรับต่อไปนี้

Menthol	10.00	g
Methyl Salicylate	50.00	g
Eucalyptus Oil	3.00	g
Water	4.50	g
Wool Fat	10.00	g
White Beeswax to	100.00	g

สรรพคุณ	บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบเนื่องจากแมลงกัดต่อยหรือปวดกล้ามเนื้อ
วิธีใช้	ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ
คำเตือน	ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
ขนาดบรรจุ	4 กรัม และ 15 กรัม

63. ยาแก้ปวดฟัน (Toothache Drops)

ตามตำรับต่อไปนี้

Chlorobutanol	25.00	g
Clove Oil to	100.00	ml

สรรพคุณ	บรรเทาอาการปวดฟัน
วิธีใช้	ใช้ไม้เล็ก ๆ พันสำลีชุบยาอุดฟันตรงที่เป็นรู
คำเตือน	ยาใช้เฉพาะที่ระวังอย่าให้ถูกบริเวณอื่น
ขนาดบรรจุ	8 มิลลิลิตร

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ นางปัทมา อินทวงค์
- วัน เดือน ปี เกิด 9 กุมภาพันธ์ 2508
- ประวัติการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2523
 - สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) จากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปีการศึกษา 2527
- ประสบการณ์ในการทำงาน
- ปี พ.ศ. 2528 ถึง ปัจจุบัน รับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved