

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญตารางภาคผนวก.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	5
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา.....	6
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	7
กลไกในการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย.....	7
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย.....	9
อาการคลื่นไส้ อาเจียนหลังได้รับการระงับความรู้สึก.....	24
อาการข้างเคียงอื่นๆหลังได้รับการระงับความรู้สึก.....	29
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	33
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา.....	42
ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	42
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา.....	43
การหาคุณภาพของเครื่องมือ.....	44
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	45
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	46
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	47

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน.....	48
2 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก คำนวณมวลกาย (BMI) ความดันโลหิตก่อนการระงับความรู้สึก การจัดกลุ่มสภาพร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัด แขนกผู้ป่วย และประเภทผู้ป่วย.....	50
3 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชนิดของการผ่าตัด ประวัติการเมารถหรือเวียนศีรษะ และอาการคลื่นไส้อาเจียน.....	52
4 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการได้รับยาก่อนการผ่าตัด ได้แก่ ยา ก่อนการระงับความรู้สึก ยานำสลบ และยาหย่อนกล้ามเนื้อ.....	53
5 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขนาดของยาระงับความรู้สึกทั้ง 4 ชนิด	54
6 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระยะเวลาได้รับการระงับความรู้สึก ด้วยยาทั้ง 4 ชนิด.....	55
7 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสัญญาณชีพเมื่อแรกรับที่ในห้องพักฟื้น	56
8 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความดันโลหิต ในห้องพักฟื้นที่ เปลี่ยนแปลงไปจากความดันโลหิตก่อนการระงับความรู้สึก และการได้รับยาแก้ปวด	57
9 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการแสดงหลังผ่าตัด ระยะแรกรับใน ห้องพักฟื้นและระยะก่อนย้ายกลับหอผู้ป่วย	58
10 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการข้างเคียงหลังผ่าตัดระยะแรกรับ ในห้องพักฟื้นและระยะก่อนย้ายกลับหอผู้ป่วย ได้แก่อาการหนาวสั่น อาการคลื่นไส้ อาเจียนและความรุนแรงของอาการคลื่นไส้อาเจียน.....	60
11 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการอื่นๆหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วย ได้แก่ อาการเจ็บคอ อาการเสียงแหบ อาการปวดศีรษะ อาการเวียนศีรษะ อาการท้องอืด อาการอ่อนเพลีย อาการอึดอัดหายใจลำบาก และอาการหนาวสั่น.....	62
12 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ การเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	64

สารบัญตาราง(ต่อ)


ตาราง	หน้า
13 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	65
14 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามน้ำหนัก คชนี้มีมวลกาย การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	66
15 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความดันโลหิตก่อนการระงับความรู้สึก การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์...	67
16 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสภาพร่างกายก่อนการผ่าตัด การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	68
17 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามชนิดของการผ่าตัด การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	69
18 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประวัติการเมารถหรือเวียนศีรษะ การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	70
19 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการได้รับและชนิดของยาก่อนการระงับความรู้สึก การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์...	71
20 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขนาดของยาระงับความรู้สึก การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	72
21 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระยะเวลาได้รับการระงับความรู้สึก การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์	74
22 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการท้องอืดหลังผ่าตัด การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	76

สารบัญตารางภาคผนวก

ตาราง	หน้า
1 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการได้รับเลือด/สารน้ำ ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด ในห้องพักฟื้น และในหอผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง.....	133
2 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิห้องผ่าตัด อุณหภูมิห้องพักฟื้นที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ.....	134
3 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประเภทของหอผู้ป่วยที่นอนพัก หลังผ่าตัด การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธด้วย ไค-สแควร์.....	135
4 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด ความวิตกกังวลหลังผ่าตัด.....	136
5 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการได้รับสารน้ำระหว่างผ่าตัด การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธด้วย ไค-สแควร์.....	137
6 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประวัติการได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธด้วย ไค-สแควร์.....	137
7 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการได้รับยาแก้ปวด การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธด้วย ไค-สแควร์.....	138
8 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่บ้าน การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธด้วย ไค-สแควร์.....	138
9 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความวิตกกังวลเกี่ยวกับการหายของแผลผ่าตัด การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธด้วย ไค-สแควร์.....	139
10 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการเจ็บคอหรือเสียงแหบ การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธด้วย ไค-สแควร์.....	139
11 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการเวียนศีรษะหลังได้รับการระงับความรู้สึก การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและทดสอบความสัมพันธด้วย ไค-สแควร์.....	140

สารบัญตารางภาคผนวก(ต่อ)

ตาราง		หน้า
12	จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการอีดีอีคหายใจลำบาก การเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์.....	140



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved