

## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

การศึกษาพาณิชกรรมการคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มในคู่สามีภรรยา ที่อาศัยอยู่ในตำบลตันเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 231 คู่ นำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. พฤติกรรม การคุ้ม และระดับการคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์ของคู่สามีภรรยา
  - 2.1 พฤติกรรมการคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์และการคุ้มในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา
  - 2.2 ระดับการคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์ ( AUDIT )
3. ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

##### ข้อมูลทั่วไปของ คู่สามี ภรรยา

กลุ่มสามี มีอายุเฉลี่ย 47.8 ปี (S.D. = 8.8) ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 45 - 54 ปี (ร้อยละ 39.0) รองลงมา 55 - 60 ปี (ร้อยละ 28.6) จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มากที่สุด (ร้อยละ 58.9) รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้น/ ปวช. (ร้อยละ 19.9) มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด (ร้อยละ 74.5)

ส่วนภรรยา มีอายุเฉลี่ย 45.0 ปี (S.D. = 9.7) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45 - 54 ปี (ร้อยละ 40.7) รองลงมา อายุ ระหว่าง 35 - 44 ปี (ร้อยละ 26.4) จบชั้นประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 68.4) รองลงมา ระดับมัธยมต้น/ ปวช. (ร้อยละ 18.2) ส่วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้าง (ร้อยละ 79.7) ดังแสดงในตารางที่ 1

รายการ	คู่สามี	คู่ภรรยา
จำนวน	231	231
ค่าเฉลี่ย	47.8	45.0
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	8.8	9.7
อายุ ปี	35 - 60	35 - 60
เพศ	ชาย 100% หญิง 0%	ชาย 0% หญิง 100%
民族	ไทย 100% กะเหรี่ยง 0%	ไทย 100% กะเหรี่ยง 0%
ศาสนา	พุทธ 100% คริสต์ 0%	พุทธ 100% คริสต์ 0%
ภูมิลำเนา	เชียงใหม่ 100%	เชียงใหม่ 100%
ระดับการศึกษา	ประถม 58.9% มัธยมต้น 35.2% ปวช. 6.0%	ประถม 68.4% มัธยมต้น 26.4% ปวช. 5.2%
อาชีพ	รับจ้าง 74.5% ประกอบอาชีพ 25.5%	รับจ้าง 79.7% ประกอบอาชีพ 20.3%
รายได้ต่อเดือน	ต่ำกว่า 10,000 บาท 50.0% 10,000 - 20,000 บาท 40.0% มากกว่า 20,000 บาท 10.0%	ต่ำกว่า 10,000 บาท 40.0% 10,000 - 20,000 บาท 50.0% มากกว่า 20,000 บาท 10.0%
สถานะสมรส	สมรส 100%	สมรส 100%
จำนวนบุตร	0 บุตร 50.0% 1 บุตร 40.0% 2 บุตร 10.0% มากกว่า 2 บุตร 10.0%	0 บุตร 40.0% 1 บุตร 50.0% 2 บุตร 10.0%
ความสูง	160 - 180 cm	150 - 180 cm
น้ำหนัก	50 - 80 kg	40 - 80 kg
สีผิว	ขาว 70.0% คล้ำ 30.0%	ขาว 60.0% คล้ำ 40.0%
เพศภายใน	ชาย 100%	หญิง 100%
อายุแม่	35 - 54 ปี	35 - 54 ปี
จำนวนบุตร	0 บุตร 50.0% 1 บุตร 40.0% 2 บุตร 10.0% มากกว่า 2 บุตร 10.0%	0 บุตร 40.0% 1 บุตร 50.0% 2 บุตร 10.0%
ความสูง	160 - 180 cm	150 - 180 cm
น้ำหนัก	50 - 80 kg	40 - 80 kg
สีผิว	ขาว 70.0% คล้ำ 30.0%	ขาว 60.0% คล้ำ 40.0%
เพศภายใน	ชาย 100%	หญิง 100%

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามกลุ่ม สามี/ภรรยา

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน(ร้อยละ)	
	สามี (n = 231)	ภรรยา (n = 231)
อายุ (ปี)		
15 - 24	1 (0.4)	7 (3.0)
25 - 34	22 (9.5)	27 (11.7)
35 - 44	52 (22.5)	61 (26.4)
45 - 54	90 (39.0)	94 (40.7)
55 - 60	66 (28.6)	42 (18.2)
อายุเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเบนมาตรฐาน)	47.8 (8.8)	45.0 (9.7)
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียน	4 (1.7)	3 (1.3)
ประถมศึกษา	136 (58.9)	158 (68.4)
มัธยมต้น/ปวช.	46 (19.9)	42 (18.2)
มัธยมปลาย/ปวส.	29 (12.6)	15 (6.5)
ปริญญาตรี	14 (6.1)	9 (3.9)
ปริญญาโท	2 (0.9)	4 (1.7)
อาชีพ		
รับจ้าง	172(74.5)	184(79.7)
ค้าขาย	35(15.2)	35(15.2)
เกษตรกรรม	13(5.6)	5(2.2)
รับราชการ	8(3.5)	3(1.3)
แม่บ้าน ,ไม่มีงานทำ	3(1.3)	4(1.7)

### ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

จำนวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2 - 4 คน (ร้อยละ 71.4) ประมาณครึ่งหนึ่งของครอบครัวมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ร้อยละ 51.1) รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนละ 10,001 - 20,000 บาทที่สุด (ร้อยละ 43.7) รองลงมาเป็นอยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 (ร้อยละ 38.5) ครอบครัวส่วนใหญ่มีผู้ที่ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพบว่าเป็นสามีมากที่สุด (ร้อยละ 93.1) รองลงมาภรรยา (ร้อยละ 35.5) และลูก (ร้อยละ 13.9) ตั้งแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลครอบครัว	จำนวน (n = 231)	ร้อยละ
<b>จำนวนสมาชิกในครอบครัว</b>		
2 - 4 คน	165	71.4
5 - 7 คน	63	27.3
> 7 คน	3	1.3
<b>จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี</b>		
ไม่มี	113	48.9
มี	118	51.1
<b>รายได้ครอบครัว เฉลี่ย ต่อเดือน</b>		
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000	89	38.5
10,001 - 20,000	101	43.7
20,001 - 30,000	23	10.0
30,000 ขึ้นไป	18	7.8
<b>บุคคลที่ดื่ม/เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว</b>		
สามี	215	93.1
ภรรยา	82	35.5
ลูก	32	13.9

## ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มและระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสามีภรรยา

### พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกของสามีภรรยา

สามีที่ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 215 คน (ร้อยละ 93.1) มีอายุการดื่มครั้งแรกเฉลี่ย 19.8 ปี (S.D 4.0) ส่วนใหญ่ดื่มในช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 69.3)

เหตุการณ์ในการดื่มครั้งแรก มัก ดื่มในงานบุญ/ประเพณี เช่น งานปีใหม่เมือง งานปอย (ร้อยละ 50.7) รองลงมา การสังสรรค์กับ เพื่อน (ร้อยละ 28.8) เหตุผลในการดื่มครั้งแรก คือ เข้าสังคม/งานสังคม (ร้อยละ 69.8) รองลงมาคือ เพื่อนคุณย์น้ำใจ/ซักชวน (ร้อยละ 63.7) และอยากลอง (ร้อยละ 61.8) ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ดื่มครั้งแรก คือ เหล้า ขาว (ร้อยละ 44.2) รองลงมาได้แก่ เหล้าแดงและเบียร์ (ร้อยละ 29.3 และ ร้อยละ 16.7 ตามลำดับ)

กลุ่มภรรยา ที่ดื่ม/เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 82 คน (ร้อยละ 35.5) ดื่มครั้งแรก อายุเฉลี่ย 23.1 ปี (S.D = 6.5) หรือ ระหว่าง 18 - 25 ปี (ร้อยละ 62.2) เหตุการณ์การดื่มครั้งแรก คือ ดื่มในงานบุญ/ประเพณี เช่น งานปีใหม่เมือง งานปอยมากที่สุด (ร้อยละ 45.1) รองลงมา ดื่มนลอง ในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด งานเลี้ยง (ร้อยละ 26.8) โดยให้เหตุผลในการดื่มครั้งแรกคือ เพื่อนคุณย์น้ำใจ/ซักชวน (ร้อยละ 72.0) เข้าสังคม (63.4) และอยากรลอง (ร้อยละ 62.1) ส่วนใหญ่เริ่มดื่นด้วย เบียร์ (ร้อยละ 56.0) รองลงมาได้แก่เหล้าแดง (ร้อยละ 15.9) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งแรก ของคู่สามี ภรรยา

พฤติกรรมการดื่มครั้งแรก	จำนวน(ร้อยละ)	
	สามี (n=215)	ภรรยา (n=82)
อายุที่เริ่มดื่มครั้งแรก (ปี)		
ต่ำกว่า 18	51(23.7)	16(19.5)
18 - 25	149(69.3)	51(62.2)
26 - 34	8(3.7)	10(12.2)
34 ขึ้นไป	7(3.3)	5(6.1)
เฉลี่ยอายุการดื่มครั้งแรก(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)	19.8(4.0)	23.1(6.5)

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งแรกของคู่สามี ภรรยา (ต่อ)

พฤติกรรมการดื่มครั้งแรก	จำนวน(ร้อยละ)	
	สามี ( n=215)	ภรรยา ( n=82)
เหตุการณ์ในการดื่มครั้งแรก		
ดื่มนิงานบุญ/ประเพณี	109(50.7)	37(45.1)
ในงานเลี้ยง/งานฉลองโอกาสพิเศษ	31(14.4)	22(26.8)
ดื่มกับวงเพื่อน	62 (28.8)	17(20.7)
ดื่มเลี้ยงฉลองกันในครอบครัว	4 (1.9)	4(4.9)
ดื่มคนเดียว	9 (4.2)	2(2.4)
เหตุผลในการดื่มครั้งแรก ( ตอบได้หลายข้อ)		
เพื่อ侃侃然/ชักชวน	137 (63.7)	59 (72.0)
อยากลอง	133 (61.9)	51 (62.1)
เข้าสังคม/งานสังคม	150 (69.8)	52 (63.4)
แก้ป่วย/เมื่อย	37 (17.2)	9 (11.0)
เครียด/กลุ่มใจ	16 (7.4)	11 (13.4)
เพื่อสุขภาพ	20 (9.3)	4 (4.9)
ครอบครัวชักชวน	8 (3.7)	1 (1.2)
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มครั้งแรก		
เหล้าขาว	95(44.2)	8(9.8)
เหล้าแดง	63(29.3)	13(15.9)
เหล้าสีรี/ต้มเงิง	5(2.3)	9(11.0)
เบียร์	36(16.7)	46(56.0)
ไวน์	4(1.9)	4(4.9)
สาโท	12(5.6)	2(2.4)

### พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาของคู่สามี ภรรยา

ผลการศึกษา พบว่า ครอบครัวที่สามีภรรยาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งคู่ จำนวน 68 คู่ (ร้อยละ 29.5) ครอบครัวที่สามีดื่มฝ่ายเดียว จำนวน 137 ครอบครัว (ร้อยละ 59.3) และครอบครัวที่ภรรยาดื่มฝ่ายเดียว จำนวน 7 ครอบครัว (ร้อยละ 3.0) และครอบครัวที่ไม่ดื่มทั้งคู่ จำนวน 19 ครอบครัว (ร้อยละ 8.2) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามีภรรยา (รายคู่) ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา

การดื่ม ( ครอบครัว)	จำนวน (n = 231)	ร้อยละ
ดื่มทั้งคู่	68	29.5
สามีดื่มคนเดียว	137	59.3
ภรรยาดื่มคนเดียว	7	3.0
ไม่ดื่มทั้งคู่	19	8.2

### พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาของสามีภรรยา

การดื่มของสามี ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สามีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 88.7 เครื่องดื่มที่ดื่มมากที่สุด คือ เหล้าแಡง (ร้อยละ 81.5) รองลงมา ได้แก่ เบียร์(ร้อยละ 66.3) เหตุผลในการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงปัจจุบัน คือ ดื่มเพื่อเข้าสังคม (ร้อยละ 73.1) รองลงมาคือ ดื่มหลังเสร็จงาน แก้ปวด แก้เมื่อย (ร้อยละ 56.6) และได้เพื่อน พากพ้อง(ร้อยละ 50.2) บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ด้วยมากที่สุด คือ เพื่อน (ร้อยละ 71.2) รองลงมา คือ ภรรยา (ร้อยละ 66.3) ส่วนใหญ่ดื่ม ที่ร้านอาหาร (ร้อยละ 68.9) และบ้านเพื่อน (ร้อยละ 52.7) เวลาที่ใช้ในการดื่มแต่ละครั้ง น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 43.9) รองลงมา 1 - 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 34.1) ความถี่ในการดื่ม ส่วนใหญ่ดื่ม 4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 39.0) รองลงมา ดื่ม 2 - 4 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 24.9) ส่วนการดื่มน้ำอัดลม ( เบียร์ 4 กระป๋องขึ้นไปหรือเหล้าวิสกี้ ½ แบนนิ่งขึ้นไป) ส่วนใหญ่ดื่มสัปดาห์ละครั้งรองลงมา ดื่มทุกวันหรือ ดื่มเกือบทุกวัน (ร้อยละ 29.8 และร้อยละ 24.4 ตามลำดับ)

การดื่มของภรรยา ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ภรรยาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.5 เครื่องดื่มที่ดื่มมากที่สุด คือ เบียร์( ร้อยละ 86.7) รองลงมา ได้แก่ เหล้าแಡง( ร้อยละ 50.6) เหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ดื่มเพื่อเข้าสังคม (ร้อยละ 73.3) รองลงมาคือ ได้เพื่อน (ร้อยละ 50.7) บุคคลดื่มด้วยมากที่สุด คือ เพื่อน (ร้อยละ 62.7) รองลงมา คือ ดื่มกับสามี (ร้อยละ 57.3) ส่วน

ใหญ่ดื่มกันที่บ้านเพื่อน (ร้อยละ 57.3) รองลงมาคือที่ทำงาน (ร้อยละ 40.0) เวลาที่ใช้ในการดื่มแต่ละครั้ง น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 38.7) รองลงมาใช้เวลาระหว่าง 1-2 ชั่วโมง (ร้อยละ 34.7) ความถี่ในการดื่ม ส่วนใหญ่ดื่มเดือนละครั้งหรือน้อยกว่า (ร้อยละ 44.0) รองลงมา ดื่ม 2-4 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 22.7) การดื่มหนัก ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน พบร้อยละ 6.6 ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำแนกตามสามี ภรรยาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี	จำนวน(ร้อยละ)	
	สามี (n=231)	ภรรยา (n=231)
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี	205(88.7) (n= 205)	75(32.5) (n=75)
ชนิดของเครื่องดื่มที่ดื่มน้ำมันบอยที่สุด 4 อันดับ		
สุราขาว	95(46.3)	10(13.3)
เหล้านำ้ำขาว	49(23.9)	17(22.7)
เหล้าแดง	167(81.5)	38(50.7)
เบียร์	136(66.3)	65(86.7)
เหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ตอบได้หลายข้อ)		
เข้าสังคม	150(73.1)	55(73.3)
ดื่มหลังเสร็จงาน แก้ป่วย แก้นมื่อย	116(56.6)	19(25.3)
ได้เพื่อน/เพื่อความเป็นพากพ้อง	103(50.2)	38(50.7)
กินข้าวได้/นอนหลับดี	35(17.1)	6(8.0)
คลายเครียด/แก้กลุ่ม	39(19.0)	15(20.0)
เพื่อความสุข สนุกสนาน	70(34.1)	31(41.3)
ดื่มเพื่อสุขภาพ	15(7.3)	5(6.7)
บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกัน(ตอบได้หลายข้อ)		
ไม่มี(ดื่มคนเดียว)	53(25.9)	6(8.0)
เพื่อน	146(71.2)	47(62.7)
สามี/ภรรยา	136(66.3)	43(57.3)
สมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่ไม่ใช่สามีภรรยา	29(14.1)	21(28.0)
อื่นๆ ญาติพี่น้องที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว	14(6.8)	13(17.3)

**ตารางที่ 5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามี ภรรยา ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ต่อ)**

<b>พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี</b>	<b>จำนวน(ร้อยละ)</b>	
	<b>สามี (n=205)</b>	<b>ภรรยา (n=75)</b>
สถานที่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยที่สุด 3 ลำดับแรก		
บ้านเพื่อน	108(52.7)	43(57.3)
ที่ทำงาน	74(36.0)	30(40.0)
ร้านอาหาร	141(68.8)	22(29.3)
ความถี่ในการดื่ม		
เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า	29 (14.1)	33 (44.0)
2 - 4 ครั้งต่อเดือน	51 (24.9)	17 (22.7)
2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์	45 (22.0)	13 (17.3)
4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์	80 (39.0)	12 (16.0)
ความถี่ของการดื่มอย่างหนัก (เบียร์ 4 กระป๋องขึ้นไปหรือเหล้าวิสกี้ ½ แบนขึ้นไป)		
ไม่เคยเลย	10( 4.9)	42(56.0)
น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง	45(21.9)	12(16.0)
เดือนละครั้ง	39(19.0)	8(10.7)
สัปดาห์ละครั้ง	61(29.8)	8(10.7)
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน	50(24.4)	5(6.6)
ปริมาณการดื่มต่อวัน		
เบียร์ 1 - 1.5 กระป๋อง หรือเหล้า 2-4 ฝาใหญ่	43(21.0)	25(33.3)
เบียร์ 2 - 3 กระป๋อง หรือเหล้า 1/4 แบน	61(29.7)	31(41.4)
เบียร์ 3.5 - 4 กระป๋อง หรือเหล้า 1/2 แบน	45(22.0)	7(9.3)
เบียร์ 4.5 - 7 กระป๋อง หรือเหล้า ¾ แบน	19(9.3)	6(8.0)
เบียร์ 7 กระป๋องขึ้นไป หรือเหล้า 1 แบนขึ้นไป	37(18.0)	6(8.0)
เวลาที่ใช้ในการดื่มแต่ละครั้ง		
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง	90(43.9)	29(38.7)
1 - 2 ชั่วโมง	70(34.1)	26(34.7)
มากกว่า 2 - 4 ชั่วโมง	27(13.2)	10(13.3)
มากกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป	18(8.8)	10(13.3)

### ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามี ภรรยา (AUDIT)

กลุ่มสามีส่วนใหญ่ ดื่มแบบเสี่ยง (ร้อยละ 33.2) รองลงมาดื่มแบบที่มีความเสี่ยงน้อย ดื่มแบบมีปัญหา/อันตราย (ร้อยละ 32.2, 20.0 และ 14.6 ตามลำดับ) และพบว่ามีกลุ่มดื่มแบบติดสูงถึงร้อยละ 20.0

กลุ่มภรรยา พบร่วมกันว่า ส่วนใหญ่ ดื่มแบบมีความเสี่ยง น้อย (ร้อยละ 61.3) รองลงมาดื่มแบบที่มีความเสี่ยง (ร้อยละ 36.0) และมีส่วนน้อยที่มีการดื่มในระดับที่มีปัญหาและดื่มแบบติด (ร้อยละ 1.3) ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามี ภรรยา (AUDIT)

ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สามี (n=205)	ภรรยา (n=75)
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
1. ระดับการดื่มแบบเสี่ยงน้อย (low-risk/ drinking)	66( 32.2)	46 ( 61.3)
2. ระดับการดื่มแบบเสี่ยง(hazardous/risky drinking )	68 ( 33.2)	27 ( 36.0)
3.ระดับการดื่มแบบมีปัญหาหรืออันตราย ( harmful use)	30 ( 14.6)	1 ( 1.3)
4. กลุ่มดื่มแบบติด ( alcohol dependence)	41 ( 20.0)	1(1.3)

### ส่วนที่ 3 ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

#### ปัญหาด้านสุขภาพกาย

ผลการศึกษา พบร่วมกันว่า ในกลุ่มสามี มีโรคประจำตัวที่พบมากที่สุดได้แก่ โรคกระเพาะอาหาร (ร้อยละ 29.7) รองลงมาเป็น โรคความดันโลหิตสูงและ โรคพิษสุราเรื้อรัง (ร้อยละ 29.3, ร้อยละ 10.2) ส่วนภรรยา โรคประจำตัวที่พบมากที่สุดได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 54.7) รองลงมาเป็น โรคกระเพาะอาหาร (ร้อยละ 38.7) ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 โรคประจำตัวในสามี ภรรยาในช่วงสำรวจ

โรคประจำตัว*	ปัญหาด้านร่างกาย		จำนวน( ร้อยละ)	
	สามี (n=205)	ภรรยา(n=75)	จำนวน	ร้อยละ
โรคกระเพาะอาหาร	61	(29.7)	29	(38.7)
โรคความดันโลหิตสูง	60	(29.3)	41	(54.7)
โรคหัวใจ และหลอดเลือด	8	(3.9)	9	(12.0)
โรคตับ	19	(9.3)	5	(6.7)
โรคพิษสุนัขเรื้อรัง	21	(10.2)	1	(1.3)
โรคเบาหวาน	15	(7.3)	6	(8.0)

ตอบได้หลายข้อ\*

**ปัญหาสุขภาพจิต**

สามีที่คุ้มครองคุ้มแอกกอ肖ล์พบว่า ปัญหาคิดมากตัวตายมากที่สุด (ร้อยละ 6.3) รองลงมา มีภาวะซึมเศร้าและขาดความสุขทางเพศในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 4.4) ส่วนภรรยาที่คุ้มครองคุ้ม แอกกอ肖ล์พบว่า มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด (ร้อยละ 6.7) รองลงมาขาดความสุขทางเพศ (ร้อยละ 5.3) และปัญหาคิดมากตัวตาย (ร้อยละ 4.0) ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ปัญหาด้านจิตใจของคู่สามี ภรรยาที่คุ้มครองคุ้มแอกกอ肖ล์

ปัญหาด้านสุขภาพจิต*	จำนวน (ร้อยละ)	
	สามี (n=205)	ภรรยา (n=75)
ซึมเศร้า	9(4.4)	5(6.7)
คิดมากตัวตาย	13(6.3)	3(4.0)
ขาดความสุขทางเพศ	9(4.4)	4(5.3)

\* ตอบได้หลายข้อ

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
คู่สามีและภรรยาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งคู่ พนปัญหาการทะเลาะวิวาทมากที่สุด  
(ร้อยละ 54.4) รองลงมาทำลายข้าวของในบ้าน (ร้อยละ 36.8) และปัญหาการทำร้ายร่างกายระหว่าง  
คู่สามีภรรยา (ร้อยละ 11.8) ส่วนในครอบครัวที่ สามีดื่มฝ่ายเดียว พบร่วม มีปัญหาทะเลาะวิวาทมาก  
ที่สุด เช่นกัน (ร้อยละ 44.5) รองลงมาทำลายข้าวของในบ้าน (ร้อยละ 19.7) และมีการทำร้ายร่างกาย  
ระหว่างคู่สามีภรรยา (ร้อยละ 10.9) ส่วน ภรรยาที่ดื่มฝ่ายเดียว มักมีการทะเลาะวิวาทในสัดส่วนสูง  
(ร้อยละ 57.1)

การที่คู่สามีภรรยาดื่มทั้งคู่พนปัญหาความรุนแรงมากกว่าการที่สามีหรือภรรยาดื่มฝ่ายเดียว  
ดังแสดงในตารางที่ 9

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University  
All rights reserved

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจเกิดขึ้นในครองครัวของสังฆภารणกิจเมืองเชียงใหม่

การตั้งเป้าหมาย	ความพึงพอใจ	การทำนายร่างกาย	การทำความรู้วิชาชีพ	การทำนายร่างกาย	การทำนายมนต์ราษฎร	การทำนายมนต์ราษฎร	การทำนายมนต์ราษฎร
มุ่งเดินทาง	19	0	4(21.1)	0	0	0	3(15.8)
กรายได้มั่นคงเดียว	7	0	4	0	0	0	1
สามารถตนตั้งใจ	137	15(10.9)	61(44.5)	9(6.6)	27(19.7)	5(7.4)	25(36.8)
ตั้งใจ'	68	8(11.8)	37(54.4)	14(6.1)	56(24.2)	14(6.1)	56(24.2)
รวม	231	23(10)	106(45.9)				

### ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องดื่มและก่อช้อปปิ้งในครอบครัว

สามีต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อเครื่องดื่มและก่อช้อปปิ้ง เดือนละ 501 - 1,000 บาทมากที่สุด (ร้อยละ 34.2) รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เดือนละ 501-1000บาท (ร้อยละ 30.7) ส่วนภรรยา ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อเครื่องดื่มและก่อช้อปปิ้ง เดือนละ ไม่เกิน 100 บาทมากที่สุด (ร้อยละ 45.4) รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เดือนละ 101 - 500 บาท (ร้อยละ 32.0) สำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวพบว่าการที่คู่ส伉ลภนปัญหาความรุนแรงทุกด้านมากกว่าการที่สามีหรือภรรยาดื่มฝ้ายเดียว ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มและก่อช้อปปิ้งต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มและก่อช้อปปิ้งต่อเดือน (บาท)	จำนวน(ร้อยละ)	
	สามี (n = 205)	ภรรยา(n = 75)
ต่ำกว่า 100	7(3.4)	34(45.4)
101 - 500	70(34.2)	24(32.0)
501 - 1,000	63(30.7)	10(13.3)
1,001 - 1,500	21(10.2)	1(1.3)
1,501 - 2,000	12(5.8)	3(4.0)
2,001 - 3,000	16(7.8)	3(4.0)
3,000 ขึ้นไป	16(7.8)	0(0)

### ปัญหาด้านการทำงาน

การดื่มเครื่องดื่มและก่อช้อปปิ้ง ของสามี ส่วนใหญ่รับว่า ประสิทธิภาพการทำงาน ของตัวเองลดลง (ร้อยละ 60.0) เนื่องจากสายและหยุดงาน ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 29.7) เป็นสาเหตุของการขาดรายได้สูงถึงร้อยละ 29.7 ส่วนภรรยาที่ดื่ม ส่วนใหญ่พบปัญหา ขาดประสิทธิภาพการทำงาน (ร้อยละ 42.7) รองลงมาเป็นสาเหตุทำให้หยุดงาน ทำงานสาย และขาดรายได้ (ร้อยละ 29.3 ร้อยละ 22.7 และร้อยละ 21.3) ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 11

ตารางที่ 11 ประสิทธิภาพการทำงานหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คู่สามีภรรยา

ประสิทธิภาพการทำงาน *	จำนวน(ร้อยละ)	
	สามี (n=205)	ภรรยา ( n=75)
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง	123(60.0)	32(42.7)
ทำงานสาย	61(29.7)	17(22.7)
หยุดงาน	61(29.7)	22(29.3)
ลูกออกจากการงาน	8(3.9)	1(1.3)
ขาดรายได้	61(29.7)	16(21.3)

\*ตอบได้หลายข้อ

#### ปัญหาอุบัติเหตุหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามี ภรรยา

สามีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 46.3 ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจราจร (ร้อยละ 83.1) รองลงมา เป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน (ร้อยละ 14.7) และ หลอกล้ม (ร้อยละ 2.1) ส่วนภรรยาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยเกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 17.3) ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด เช่นกัน (ร้อยละ 84.6) ดังแสดงในตาราง 14

ตารางที่ 12 การเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสุรา*	จำนวน(ร้อยละ)	
	สามี (n=205)	ภรรยา ( n=75)
เคยเกิดอุบัติเหตุ	95(46.3)	13(17.3)
จราจร	79(83.1)	11(84.6)
หลอกล้ม	2(2.1)	2(15.4)
อุบัติเหตุจากการทำงาน	14(14.7)	0(0.00)

\* ตอบได้หลายข้อ