

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและปัญหาที่เกี่ยวข้อง จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามีภรรยา ตำบลตันเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 231 คู่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยคู่สามีภรรยา จำนวน 231 คู่ อายุระหว่าง 15 - 60 ปี โดยสามีมีอายุเฉลี่ย 47.8 ปี ภรรยามีอายุเฉลี่ย 45.0 ทึ่งคู่มีสัดส่วนอายุ 45 - 54 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55 - 60 ปี จากการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้างและ ทำขาย

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกของคู่สามีภรรยา

สามีที่ดื่ม หรือ เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงถึง ร้อยละ 93.1 โดยส่วนใหญ่ดื่มครั้งแรก เมื่ออายุระหว่าง 18 - 25 ปี หรืออายุเฉลี่ย 19.8 ปี เหตุการณ์ที่ทำให้สามีดื่มครั้งแรก มากที่สุด คือ ดื่มในงานบุญ/ประเพณี เช่น งานปีใหม่เมือง งานปอย และดื่มกับวงเพื่อน โดยให้เหตุผลในการดื่มครั้งแรก ว่า เข้าสังคม/งานสังคม เพื่อนเคยยื้นเคยยื้อ/ซักชวน และอยากลอง ชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ดื่มครั้งแรก คือ เหล้าขาว รองลงมาคือเหล้าแดง

กลุ่มภรรยาที่ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 35.5 และดื่มครั้งแรกอายุ ระหว่าง 18 - 25 ปี หรืออายุเฉลี่ย 23.7 เหตุการณ์ที่ทำให้ดื่มครั้งแรก คือ ดื่มในงานบุญ/ประเพณี เช่น งานปีใหม่เมือง งานปอย ดื่มนลองในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด งานเลี้ยง โดยให้เหตุผลในการดื่มครั้งแรก คือ เพื่อนเคยยื้นเคยยื้อ/ซักชวน ดื่มเพื่อเข้าสังคมและอยากลอง ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่นิยมมากที่สุด คือ เบียร์

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาของคู่สามี ภรรยา

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สามียังคงดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 88.7 เครื่องดื่มที่ดื่มมากที่สุด คือ เหล้าขาว รองลงมา เป็น เบียร์ เหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ เป็น การดื่มเพื่อ เพื่อเข้าสังคม แก้ป่วย แก้มื่อย และเป็นการได้เพื่อนหรือพากพ้อง มักดื่มร่วมกับ เพื่อน รองลงมา คือ ภรรยา โดยดื่มกันที่ร้านอาหาร หรือ บ้านเพื่อน เวลาที่ใช้ในการดื่มแต่ละครั้ง ไม่เกิน 2 ชั่วโมง สามี ดื่มถ้วนมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ถึงร้อยละ 39.0 ในปริมาณที่คิดเป็นเหล้า $\frac{1}{4}$ แบน หรือ เบียร์ 2 - 3 กระป๋อง / วัน เกือบ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 29.7) มีกลุ่มที่ดื่มปริมาณมากเพิ่มเป็น เบียร์ 7 กระป๋องหรือเหล้า 1 แบน/วัน สูงถึงร้อยละ 18 อีกทั้งมีผู้ดื่มนัก (*bring drinking*) (เบียร์ 4 กระป๋องขึ้นไปหรือเหล้า $\frac{1}{2}$ แบนขึ้นไป) โดยดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวันถึงร้อยละ 24.4 และสัปดาห์ละ ครั้งถึงร้อยละ 29.8

ส่วนภรรยา ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ภรรยาบังคับดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.5 เครื่องดื่มที่ดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ รองลงมา คือ เหล้าแดง เหตุผลในการดื่มจน ถึงปัจจุบัน เป็นการ ดื่มเพื่อเข้าสังคม ได้เพื่อน มักดื่มร่วมกับ เพื่อน สามี ส่วนใหญ่ดื่มที่บ้านเพื่อน และที่ทำงาน ใช้เวลา ในการดื่มแต่ละครั้ง ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ภรรยาดื่มไม่ถ้วนมากนัก โดยมีผู้ดื่มเดือนละครั้งหรือน้อยกว่า ร้อยละ 44.0 ในขณะที่มีผู้ดื่ม 4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ ร้อยละ 16 ปริมาณคิดเป็นเบียร์ 2 - 3 กระป๋อง ร้อยละ 41.1 และ 1 - 2 กระป๋อง/วัน ร้อยละ 33.3 และมีผู้ดื่มนัก (*bring drinking*) ทุกวันหรือ เกือบทุกวัน ร้อยละ 6.6

ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามี ภรรยา (AUDIT)

กลุ่มสามี ดื่มแบบติด สูงถึงร้อยละ 20 และดื่มแบบอันตรายร้อยละ 14.6 ในขณะที่การดื่ม แบบเลี้ยงและเลี้ยงตัวในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 33.2 และร้อยละ 32.2) กลุ่มภรรยา พบร่วมกัน ให้ผู้ดื่มในระดับเลี้ยงน้อย ร้อยละ 61.3 และ ร้อยละ 36.0 ดื่มแบบเลี้ยง

ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามีภรรยา

1. ปัญหาด้านสุขภาพกาย

กลุ่มสามี มี โรคประจำตัวที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคกระเพาะอาหาร (ร้อยละ 29.7) รองลงมาเป็น โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 29.2) และ โรคพิษสุราเรื้อรัง (ร้อยละ 10.2) ส่วน ภรรยา โรคประจำตัวที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 54.6) รองลงมาเป็น โรค กระเพาะอาหาร (ร้อยละ 38.6)

2. ปัญหาสุขภาพจิต

ในกลุ่มสามีพบ ปัญหาคิดมากตัวตาย ซึ่งเสร้ายาและขาดความสุขทางเพศ ในสัดส่วนร้อยละ 6.3 และ 4.4 ส่วนภรรยา พบว่า มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด รองลงมาขาดความสุขทางเพศ และปัญหาคิดมากตัวตาย (ร้อยละ 6.7 ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 4.0 ตามลำดับ)

3. ปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัวที่สามีภรรยาคิดมากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งคู่ พบปัญหาความรุนแรงมากกว่าการที่สามีดื่มหรือภรรยาดื่มฝ่ายเดียว โดยพบว่า ครอบครัวที่สามีภรรยาคิดมากทั้งคู่ ภรรยาดื่มฝ่ายเดียว และสามีดื่มฝ่ายเดียว พบปัญหาการทะเลวิวาทในครอบครัว มากที่สุด (ร้อยละ 54.4, ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 44.5 ตามลำดับ) รองลงมาทำลายข้าวของในบ้าน และมีการทำร้ายร่างกายภรรยา สอดคล้องกับผลการศึกษา อดิศวร์ หล่ายชัยไทยและคณะ, 2545 ได้ทำการศึกษาผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จังหวัดลพบุรีพบว่า กลุ่มที่ดื่มประจำเพศชาย เกิดปัญหาทะเลวิวาทเป็นอันดับหนึ่งคือ ร้อยละ 45.6 ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพ และปัญหาอุบัติเหตุร้อยละ 32.9 และ 30.1 ตามลำดับ และพบว่าปัญหาทะเลวิวาทเกิดกับชายที่ดื่มประจำมากกว่าชายที่หยุดดื่ม 6 เท่า ปัญหาสุขภาพของชายที่ดื่มประจำสูงกว่าชายที่หยุดดื่ม 14 เท่า ส่วนเพศหญิงที่ดื่มประจำเกิดทะเลวิวาท ปัญหาสุขภาพและปัญหาอุบัติเหตุ ร้อยละ 33.2 19.7 และ 4.8 ตามลำดับ และยังพบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดอันตรายหรือปัญหากับผู้ดื่มมากขึ้นตามปริมาณการดื่มที่มากขึ้นด้วย และผลการศึกษาของ วิชัย โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา (2545) พบว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทะเลวิวาทและทำร้ายร่างกายกับทั้งคนในบ้าน และคนนอกบ้าน มากกว่าผู้ดื่มเป็นครั้งคราว และปัญหาสามีที่ดื่มประจำทำร้ายร่างกายภรรยา ร้อยละ 5.7 และภรรยาที่ดื่มประจำทำร้ายร่างกายสามี ร้อยละ 6.2

4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

สามี/ ภรรยาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซื้อเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ โดยสามีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เดือนละ 501 - 1,000 บาท (ร้อยละ 30.7) รองลงมาเดือนละ 100 - 500 บาท (ร้อยละ 34.2) ส่วนภรรยา ส่วนใหญ่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่ำกว่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 500 บาท (ร้อยละ 32.0)

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามี/ภรรยาส่วนใหญ่ทำให้ขาดประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาการมาทำงานสายและมีการหยุดงาน เป็นสาเหตุของการขาดรายได้

5. ปัญหาด้านอุบัติเหตุ

สามีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 46.3 ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุ จราจร ส่วนภารยาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยเกิดอุบัติเหตุ น้อยกว่า (ร้อยละ 17.3) ส่วนใหญ่เป็น อุบัติเหตุจราจร เช่น กัน

อภิปรายผลการศึกษา

พฤติกรรมการดื่มและระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามีภรรยา

การดื่มครั้งแรกของคู่สามีภรรยานักดื่มใน โอกาสงานประเพณีต่างๆ เช่น งานปีใหม่เมือง งานปอย สองคล้องกับ การศึกษาของ สิริรัฐ สุกันชา และคณะ (2550) พบว่า ประชาชนทั่วไปใน จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 93.3 นิยมดื่มช่วงประเพณีสงกรานต์ และการศึกษาของ อรุณัย เหมืองหม้อ (2551) พบว่า กลุ่มสตรีในจังหวัดแพร่จะดื่มในงานเทศบาลสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน จากค่านิยมความเชื่อที่ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยสร้างความสนุกสนาน รื่นเริง สองคล้องกับการออกทัวร์ของแอลกอฮอล์ที่เมื่อมีการดื่มจะทำให้ผู้ดื่มนิมิตความหล้า รู้ สึก สนุกสนาน ร่าเริง เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ _2552)

เหตุผลในการดื่มครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อันดับที่ 1 คือเพื่อเข้าสังคม รองลงมา คือเพื่อนช่วน และเหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันยังคงเป็นเหตุผลคล้ายกับการ ดื่มครั้งแรกคือ เพื่อเข้าสังคม บุคคลที่ร่วมดื่มด้วยมากที่สุดคือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษา คล้ายคลึงกับการศึกษาของ ประวัติสร สุวรรณบงกช (2549) ที่ศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน กลุ่มของบุคลากรสาธารณสุข และเภสัตรค์ วิทยบริษัทกุล (2550) ศึกษาในกลุ่มนักศึกษา และสิริรัฐ สุกันชา และคณะ (2550) ศึกษาในประชาชนทั่วไป พบว่าเหตุผลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือเพื่อ เข้าสังคม หรือเพื่อนชักชวน และบุคคลที่ร่วมดื่มด้วยมากที่สุด คือ เพื่อน และจากการศึกษาของ เทพินทร์ พชรานุรักษ์ (2541) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม มือทัชพลด กำหนดการตัดสินใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกลุ่มของสังคมที่สำคัญกลุ่มที่หนึ่ง คือ เพื่อนซึ่งผลการศึกษาพบว่า สาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนส่วนใหญ่มาจากเพื่อน ชวน อยากลอง ตามเพื่อน ทำให้สามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อน ได้ง่ายขึ้น อิทธิพลของเพื่อนจึงมี ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มในกลุ่มที่มีความสนิทสนมกันหรือมี การทำกิจกรรมร่วมกันและมีการประกอบอาชีพเดียวกันทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงทำให้มี การดื่มกับเพื่อนมากกว่าดื่มร่วมกับกลุ่มนักคลื่น

ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อภัยตัวอย่างนิยมดื่มน้ำมากที่สุด ในกลุ่มสามี คือเหล้าแดง เปียร์ รองลงมาคือ เหล้าขาว ในขณะที่กลุ่มหญิง/ภรรยานิยมดื่มน้ำเบียร์ ไกล์คิยงกับการศึกษา ของ ประวัติสสร สุวรรณบงกช (2549) เสกสรรค์ วิทยปรีชาภู (2550) และ จิรวัฒน์ จิตตวัฒนานนท์ (2550) พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มในปัจจุบันมากที่สุดคือ เปียร์ รองลงมาคือเหล้าขาว เนื่องจากความสะดวก ไม่ยุ่งยากในการดื่ม และจากสภาพเศรษฐกิจและรายได้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ ในระดับต่ำทำให้นิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีราคาไม่แพงเกินไป ในปัจจุบันตามนโยบายการค้าเสรีทำให้มี โรงงานผลิตเบียร์มากขึ้น การโฆษณา และมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจมากทำให้สินค้าราคาถูกลง (สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2548) และประกอบกับความเชื่อที่ว่าเบียร์มี ปริมาณแอลกอฮอล์น้อยซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ, 2552)

ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาของคู่สามี ภรรยา

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สามีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 88.7 ส่วนภรรยาเคยดื่มดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.5 สูงกว่าผลการสำรวจ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ของสำนักงานสถิตแห่งชาติปี พ.ศ.2550 พบว่า ผู้ชายดื่มมากกว่าผู้หญิง ร้อยละ 51. 0 และ 8.8 ตามลำดับ เช่นเดียวกับ การศึกษา ของ ประวัติสสร สุวรรณบงกช (2549) เสกสรรค์ วิทยปรีชาภู (2550) จิรวัฒน์ จิตตวัฒนานนท์ (2550) พบว่า เพศชายมีการดื่มน้ำมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากลักษณะสังคมไทยที่มีการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในเพศชายเป็นเรื่องปกติ แต่ในเพศหญิงเป็นสิ่งไม่ดี และเพศชายเป็นผู้ที่ต้องทำงาน หนัก บางคนมีความเชื่อที่ว่าเพื่อทำให้หายเหนื่อยหรือเพื่อผ่อนคลายหลังจากการทำงาน รวมทั้งเชื่อ ว่าช่วยทำให้เจริญอาหารจึงทำให้มีการดื่มน้ำในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และเครื่องดื่มที่สามีดื่มน้ำมากที่สุด คือ สุรากลั่น(เหล้าแดง) รองลงมาคือ เปียร์ ส่วนภรรยาดื่มน้ำเบียร์มากที่สุด จากการศึกษา ของ ประวัติสสร สุวรรณบงกช (2549) เสกสรรค์ วิทยปรีชาภู (2550) และ จิรวัฒน์ จิตตวัฒนานนท์ (2550) พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มในปัจจุบันมากที่สุดคือ เปียร์ รองลงมาคือเหล้าขาว เนื่องจากความสะดวก ไม่ยุ่งยากในการดื่ม และจากสภาพเศรษฐกิจและรายได้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ ในระดับต่ำทำให้นิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีราคาไม่แพงเกินไป เหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึง ปัจจุบัน ของสามีและภรรยา ก็คือ ดื่มเพื่อเข้าสังคม รองลงมาคือ ดื่มหลังเสร็จงาน แก่ป่วย แก้เมื่อย และได้เพื่อน/เพื่อความเป็นพากพ้อง บุคคลที่สามีและภรรยาดื่มด้วยมากที่สุด ก็คือ เพื่อน สองคู่ลี้落 กับการศึกษาของ เทพินทร์ พัชราณรักษ์ (2541) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม มีอิทธิพลกำหนดการตัดสินใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกลุ่มของสังคมที่

สำคัญกลุ่มที่หนึ่ง คือเพื่อนซึ่งผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนส่วนใหญ่มาจากเพื่อนช่วง อายุคล่อง ตามเพื่อน ทำให้สามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อน ได้ง่ายขึ้นอิทธิพลของเพื่อนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื้อในกลุ่มที่มีความสนใจ สนมกันหรือมีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีการประกอบอาชีพเดียวกันทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน และกันจึงทำให้มีการดื้อกันเพื่อนมากกว่าดื้อร่วมกับกลุ่มนักคลื่น

การประเมิน ระดับ การดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ กลุ่ม สามี ส่วนใหญ่ ดื้อเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ในระดับการดื้อแบบมีความเสี่ยงต่ำ (ร้อยละ 39.8) รองลงมาดื้อ แบบที่มีความเสี่ยง (ร้อยละ 29.4) และดื้อแบบติด (ร้อยละ 17.7) กลุ่มภรรยา พบร่วมกันใหญ่ดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ระดับการดื้อแบบมีความเสี่ยงต่ำ เข่นกัน (ร้อยละ 87.4) รองลงมาดื้อ แบบที่มีความเสี่ยง(ร้อยละ 11.7) และมีส่วนน้อยที่มีการดื้อในระดับที่มีปัญหาและดื้อแบบติด สอดคล้องกับการศึกษาของ เสกสรร วิทยาปริชาภุล (2550) พบร่วมกัน ตัวอย่าง มีการดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบความเสี่ยงต่ำ ร้อยละ 68.4 รองลงมา คือ แบบความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย ร้อยละ 16.6 และแบบที่มีความเสี่ยงสูง หรือติดแอลกอฮอล์ ร้อยละ 15.0 จากการศึกษาข้าง พบว่า ระดับการดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเสี่ยงต่ำพบในเพศหญิง ร้อยละ 69.8 แต่ ระดับการดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบความเสี่ยงก่อให้เกิด อันตราย และแบบความเสี่ยงสูงพบในเพศชาย ร้อยละ 78.2 ร้อยละ 86.4 ตามลำดับ และ สอดคล้อง กับการศึกษา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดขอนแก่น(2548)ศึกษาถึงระดับการดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ สามีดื้อ แอลกอฮอล์ของประชากรในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด และ หนองบัวลำภู โดยใช้แบบประเมินการดื้อแอลกอฮอล์(AUDIT) พบร่วม ร้อยละ 56.0 ของผู้ดื้อมีการ ดื้อในระดับเสี่ยงต่ำ ร้อยละ 31.1 มีความเสี่ยง/กำลังมีปัญหาจากการดื้อ ร้อยละ 12.9 มีความเสี่ยงสูง/ เสพติด

ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการดื้อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากการศึกษา ส่วนใหญ่คู่สามีภรรยาเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ กระเพาะอาหาร โรค

ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน สอดคล้องกับการศึกษาของ อดิศวร์ หลาหยชูไทย และคณะ (2544) พบร่วมการดื้อสูราทำให้บั้นทอนสุขภาพ ทำให้สุขภาพทรุดโทรมเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย

ปัญหาด้านสุขภาพจิต พบร่วมกันตัวอย่างมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย และมีภาวะซึมเศร้า และขาดความสุขทางเพศ และปัญหาความรุนแรง ได้แก่ ปัญหาการทะเลาะวิวาท พน มากที่สุด รองลงมาทำลายข้าวของในบ้านและปัญหาการทะเลาะวิวาทกับคนในชุมชน การทำร้ายร่างกาย ภรรยา สอดคล้องกับการศึกษา ของ อดิศวร์ หลาหยชูไทย และคณะ(2545) ได้ทำการศึกษาผลกระทบ ของการดื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จังหวัดพบูรีพบว่า กลุ่มที่ดื้อประจําเพศชาย เกิดปัญหาทะเลาะ

วิชาที่เป็นอันดับหนึ่งคือ ร้อยละ 45.6 ปัญหาเหล่าวิชาที่เกิดกับชายที่ดีมีประจำมากกว่าชายที่หยุด ดีมี 6 เท่า ส่วนเพศหญิงที่ดีมีประจำเกิดทางเพศเหล่าวิชาท ร้อยละ 19.7

ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในครอบครัว สามี ภรรยาที่ดีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นผล ทำให้ขาดประสิทธิภาพการทำงาน ทำงานสาย และหยุดงาน เป็นสาเหตุของการขาดรายได้ ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามี ภรรยา เป็นสาเหตุ การเกิด อุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากร รองลงมา เป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน และอุบัติเหตุอื่น เช่น หลกล้ม สาเหตุมาจากการดื่มมากที่สุด สาดคลื่นกับการศึกษาของ ประจำวัน โลแก้ว (2552) พบว่า กลุ่มอาสาสมัคร ร้อยละ 57.1 เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่าการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทำให้รายจ่ายของครอบครัวเพิ่มขึ้น และคล้ายกับการศึกษาของ ประวัติสรุป สรุปรณ บงกช (2549) พบว่า ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ สิริรัฐ ศุภนิช และ คงะ (2550) กรณี เมืองหม้อ (2551) พบว่า เป็นการสืบเปลี่ยนเงินทองโดยไม่มีประโยชน์ โดย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน พบว่า ร้อยละ 46.6 ไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เจริญอาหาร จากความคิดเห็น ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพเมื่อมีการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ แต่มีบางส่วนยังมีการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะแนวทางในการนำผลการศึกษาไปใช้

1. อัตราการดื่มที่สูงทั้ง สามี และภรรยา ควรที่ผู้เกี่ยวข้อง ความมีการหาแนวทางในการ กระตุ้นให้ชุมชนสร้างค่านิยมใหม่ หรือมาตรการในการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ชุมชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการลด ละ เลิกการดื่มในงานเทศบาล ประเพณีต่างๆ โดยอาจเริ่มต้น ในกิจกรรม งานประเพณีทางศาสนา เพื่อสร้างแรงจูงใจ จัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปลดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

2. ผู้ที่การดื่มในระดับเสี่ยงอันตราย ควรได้รับการช่วยเหลือเป็นกลุ่มเฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องควรเข้าไปดูแล เพื่อให้ลดการดื่มและอันตราย รวมไปถึงการลดความรุนแรงในครอบครัว จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษารูปแบบ วิธีการ ในการส่งเสริมพฤติกรรม ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามีภรรยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. จากผลการศึกษาพบว่าในช่วงเทศกาล งานประเพณีปอยต่างๆ เป็นวาระและโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างคู่สามีภรรยา มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด ดังนั้นควรมีการศึกษา เผิงลีกเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา

จัดทำโดย ศศิธร นันทร์
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved