

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน

ชื่อผู้เขียน

นางดวงเดือน นรสิงห์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาราวรรณ	ตะปิ่นดา	ประธานกรรมการ
อาจารย์ สมบัติ	สกุลพรรณ	กรรมการ
อาจารย์ ดร. ภัทราภรณ์	ทุ่งปิ่นคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพรรณ	กันธวัง	กรรมการ

บทคัดย่อ

ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนจะมีความบกพร่องในการดูแลตนเองและทักษะสังคม ผู้ดูแลจึงต้องให้การดูแลบุคคลเหล่านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ดูแลหลายด้าน ภาวะซึมเศร้าเป็นผลกระทบหนึ่งที่มีมักจะเกิดกับผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน ประชากรตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลที่พาผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนมารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2546 จำนวน 75 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบ็ค แปลเป็นภาษาไทย โดย มุกดา ศรียงค์ (อ้างใน ลัดดา แสนสีหา, 2536) ซึ่งได้รับการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 86.67 ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนมีภาวะซึมเศร้า ตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงระดับรุนแรง โดยมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับรุนแรง ร้อยละ 29.33 และมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 26.67

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้การช่วยเหลือ เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนที่มีภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง และมีภาวะซึมเศร้าระดับมาก ผู้ดูแลเหล่านี้ต้องได้รับการส่งต่อ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Depression Among Caregivers of Persons with Amphetamine
Induced Psychotic Disorders

Author Mrs. Duangduean Norrasing

M.N.S. Mental Health and Psychiatric Nursing

Independent Study Examining Committee:

Asst. Prof. Dr. Darawan	Thapinta	Chairman
Lect. Sombat	Skulphan	Member
Lect. Dr. Patraporn	Tungpunkom	Member
Asst. Prof. Dr. Seepan	Kantawang	Member


Abstract

Persons with amphetamine induced psychotic disorders have deterioration of self-care and social skills. Therefore, caregivers need to take care for them whereby doing these affected to caregivers in several ways. Depression is one of these effects. The descriptive study aimed to examine level of depression among caregivers of persons with amphetamine induced psychotic disorders. The accessible population included 75 family caregivers who brought persons with amphetamine induced psychotic disorders to Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province from February to March 2003.

The study instrument was a questionnaire consisted of 2 parts: 1) Demographic data, and 2) Beck Depression Inventory (BDI), translated to Thai by Mookda Sriyong (as cited in Ladda Sanseecha, 1993). This instrument was tested for its reliability by using Cronbach's alpha coefficient that was 0.92. Data were analyzed by descriptive statistics.

The results revealed that 86.67 percent of caregivers of persons with amphetamine induced psychotic disorders had depression from minimal level to severe level. Within this group, it was found severe depression 29.33 percent and moderate-severe depression 26.67 percent.

The findings of this study could be applicable as preliminary data to plan for intervention to decrease depression among caregivers of persons with amphetamine induced psychotic disorders, especially the caregivers who were at severe and moderate-severe level. These specific groups need referral to receive appropriate treatment.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved