

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ภาวะซึมเศร้าของผู้เสพติดสุราในคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาล
เครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน นางอุบล ก่องแก้ว

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร.คาราวรรณ ต๊ะปันตา ประธานกรรมการ
อาจารย์ สมบัติ สกกุลพรรณ กรรมการ

บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ผู้เสพติดสุราส่วนใหญ่จะมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย ดังนั้นการประเมินและคัดกรองภาวะซึมเศร้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดูแลรักษาผู้เสพติดสุราเป็นไปอย่างครอบคลุม

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าของผู้เสพติดสุราในคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดลำพูน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2547 จำนวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของ เบ็ค แปลเป็นภาษาไทยโดยมุกดา ศรีรงค์ (2522) ซึ่งได้รับการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 66.67 ของผู้เสพติดสุราในคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดลำพูน มีภาวะซึมเศร้าตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงระดับรุนแรง โดยมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 18.75 ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 12.50 ภาวะซึมเศร้าระดับมาก ร้อยละ 27.08 และมีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ร้อยละ 8.34

ผลการศึกษานี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้การช่วยเหลือ เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้เสพติดสุราในคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง และมีภาวะซึมเศร้าระดับมาก ซึ่งจะต้องได้รับการส่งต่อ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Depression Among Persons with Alcohol Dependence at Mental Health Clinic, Mental Health and Psychiatric Network Hospital, Lamphun Province

Author Mrs. Ubol Kongkeaw

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr. Darawan	Thapinta	Chairperson
Lecturer Sombat	Skulphan	Member


ABSTRACT

Depression is the important problem that effect physical, mental health, society and economic. Most of persons with alcohol dependence have depression as a comorbidity. Thus assessment and screening for depression should be enhance the comprehensive care for the persons with alcohol dependence.

This descriptive study aimed to examine level of depression among 96 persons with alcohol dependence at Mental Health Clinic, Mental Health and Psychiatric Network Hospital, Lamphun Province, from February to March, 2004. The study instrument was a questionnaire consisted of 2 parts: 1) Demographic Data, and 2) Beck Depression Inventory (BDI-IA) (Beck, 1967) translated to Thai by Mookda Sriyong (1979). The reliability of this instrument obtained by Cronbach' alpha coefficient was 0.84. Data were analyzed by using descriptive statistics.

The results revealed that 66.67 percent of persons with alcohol dependence at Mental Health Clinic, Mental Health and Psychiatric Network Hospital, Lamphun Province, had depression from minimal level to severe level. Within this group, it was found 18.75 percent were at minimal depression, 12.50 percent were at mild-moderate depression, 27.08 percent were at moderate- severe depression and 8.34 percent were at severe depression.

The findings of this study could be applicable as preliminary data to plan for intervention to decrease depression among persons with alcohol dependence at Mental Health Clinic, Mental Health and Psychiatric Network Hospital, Lamphun Province, especially these who reported of the severe and moderate- severe level of depression. These groups need referral for further appropriate treatment.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved