

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของผู้ดูแล  
ในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน นางสาว ปัทสรา คำมงคล

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิภู บุญช่วง ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล กรรมการ

#### บทคัดย่อ

ภาวะไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล การดูแลของผู้ดูแลที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลของผู้ดูแลต้องการการสนับสนุนจากบุคลากรสุขภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของผู้ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รับการรักษาในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 91 ราย รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังประกอบด้วย กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาเท่ากับ .98 ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

1. การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการต่อหลอดเลือดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X}=83.62$ , S.D.=30.73) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง( $\bar{X}=44.67$ , S.D.=16.9;  $\bar{X}=19.33$ , S.D.=8.40;  $\bar{X}=10.09$ , S.D.=3.95;  $\bar{X}=9.80$ , S.D.=7.88 ตามลำดับ)

2. การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ไม่ได้รับการต่อหลอดเลือดโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X}=78.24$ , S.D.=28.23) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลด้านร่างกาย และด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X}=33.72$ , S.D. =14.42;  $\bar{X}=11.86$ , S.D.=8.38 ตามลำดับ) ส่วนการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลด้านจิตใจและด้านสังคมอยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มาก ( $\bar{X}=21.82$ , S.D.=7.13;  $\bar{X}=10.82$ , S.D.=4.14 ตามลำดับ)

ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพยาบาล ในการส่งเสริมกิจกรรมการดูแล เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม

**Independent Study Title** Care Activities for Chronic Renal Failure Patients Among  
Caregivers in Nakornping Hospital, Chiang Mai Province

**Author** Miss Papussara Commongkon

**Degree** Master of Nursing Science (Adult Nursing)

**Independent Study Advisory Committee**

Associate Professor Dr. Pikul Boonchuang Chairperson

Assistant Professor Dr. Tipaporn Wonghongkul Member

#### Abstract


Chronic renal failure was a complex health problem that affects both patients and their caregivers. Effective care from caregiver is necessary for improve patients quality of life. As such, caregivers need support from the health care team. The purpose of this study was to describe care activities for chronic renal failure patients among caregivers in Nakornping Hospital Chiang Mai Province. Using purposive sampling, 91 caregivers were recruited. Data collection was conducted during May to June 2005. Research instruments included a Personal Data Recording Form, a Care Activities for Chronic Renal Failure Questionnaire, which included care activities in physical, psychological, social, and financial care. Content validity was confirmed by panel of experts and found to be .98. Reliability was tested using Cronbach's alpha coefficient was .83. Data were analyzed by descriptive statistics.

The results of study revealed that:

1. The total score of care activities for chronic renal failure patients with arteriovenous fistula was at a moderate level. ( $\bar{X}=83.62$ , S.D.=30.73). Considering each aspect, care activities for chronic renal failure patients in physical, psychological, social and financial care were at moderate level. ( $\bar{X}=44.67$ , S.D.=16.9;  $\bar{X}=19.33$ , S.D.=8.40;  $\bar{X}=10.09$ , S.D.=3.95;  $\bar{X}=9.80$ , S.D.=7.88, respectively).

2. The total score of care activities for chronic renal failure patients without arteriovenous was at a moderate level( $\bar{X}$ =78.24, S.D.=28.23). Considering each aspect, care activities for chronic renal failure patients in physical and financial care were a moderate level( $\bar{X}$ =33.72, S.D.=14.42,  $\bar{X}$ =11.86, S.D.=8.38, respectively). Whereas, psychological and social care were at high level of care activities. ( $\bar{X}$ =21.82, S.D.=7.13,  $\bar{X}$ =10.82, S.D.=4.14, respectively).

The findings of this study can be used as basic data for nurses to enhance caring activity among caregivers in order to provide suitable care.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved