ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน

นางประมวล ตรียกุล

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ คร.คาราวรรณ ต๊ะปืนตา ประธานกรรมการ อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ กรรมการ

บทคัดย่อ

การใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ระบบบริการ ในการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายของโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายจัดทำขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และการระดม ความกิดของทีมผู้ดูแลของโรงพยาบาลฝาง มีการทดลองใช้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ของข้อกำหนดและการประเมินกระบวนการ

การศึกษาข้อมูลย้อนหลังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการใช้ ข้อกำหนดและศึกษาความคิดเห็นของการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายใน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ ทีมพยาบาลที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 20 รายและแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 102 แฟ้ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้ แนวคิดของซิปโมเดล ประกอบด้วยแบบสำรวจผลลัพธ์ของการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่ พยายามฆ่าตัวตาย และแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการใช้ข้อกำหนด ที่ผู้ศึกษา สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

- 1. ผลลัพธ์ของการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายพบว่า
 - 1.1 พบโรคทางจิตเวช ร้อยละ 31.37
 - 1.2 การได้รับการรักษาอาการทางจิตและโรคทางจิตเวช ร้อยละ 100
 - 1.3 ไม่มีการพยายามฆ่าตัวตายซ้ำขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล ร้อยละ 100
 - 1.4 การมาตรวจตามนัคหลังจำหน่าย ร้อยละ 76.50
 - 1.5 ไม่มีการพยายามฆ่าตัวตายซ้ำหลังจำหน่ายภายใน 3 เดือน ร้อยละ 99.90
 - 1.6 จำนวนวันนอนโรงพยาบาล เฉลี่ยเท่ากับ 2.18 วัน
- 2. ความคิดเห็นของทีมพยาบาลต่อกระบวนการการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่ พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า
- 2.1 ทีมพยาบาลร้อยละ 90.00 มีความเห็นด้วยว่ามีความพึงพอใจในการใช้ ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
- 2.2 ทีมพยาบาลร้อยละ 80.00 เห็นค้วยว่าข้อกำหนคมีความง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ มีประโยชน์ต่อทีมพยาบาล และครอบคลุมการคูแลด้านกาย จิต สังคม
 - 2.3 ทีมพยาบาลสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ร้อยละ 70.00

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดสามารถนำมาใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ และผล การศึกษายังสามารถนำไปปรับปรุงข้อกำหนด และปรับปรุงวิธีการนำข้อกำหนดมาใช้อย่าง เหมาะสมต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University -All rights reserved

Independent Study Title Evaluation of Implementing Caring for Suicidal Attempted Patients

Protocol in Fang Hospital, Chiang Mai Province

Author

Mrs. Pramual Threeyakul

Degree

Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr. Darawan

Thapinta

Chairperson

Lecturer Siriluck

Vadtanapong

Member

ABSTRACT

Implementing caring for suicidal attempted patients protocol is part of the system development for caring suicidal attempted patients in Fang Hospital, Chiang Mai Province. The protocol was developed from reviewed literature and brainstorming among the care giver team at Fang hospital. This protocol has been tested since October 2003. However, there has still been no evaluation of implementing caring for suicidal attempted patients protocol and the process evaluation.

This retrospective study evaluated the outcomes of implementing caring for suicidal attempted patients and examined the opinions about using of the protocol in Fang hospital, Chiang Mai province during October 2005 to September 2006. The subjects were a team of 20 nurses who cared for suicide attempted patients and 102 files of suicide attempted patients. The instruments used in this study based on CIPP model were outcome survey form of using the protocol for suicide attempted patients and the opinion survey form about process of using the protocol that was constructed from reviewed literature. Descriptive statistics were used for data analysis.

Findings were as follows:

- 1. Outcomes of implementing caring for suicidal attempted patients protocol showed that:
- 1.1 Thirty one point three seven percent of subjects had psychiatric disorders.
 - 1.2 One hundred percent of subjects were treated with psychotherapy.
- 1.3 One hundred percent of subjects never attempted suicide during admittance in the hospital.
- 1.4 Seventy six point five percent of subjects followed up at the hospital after discharge.
- 1.5 Ninety nine point nine percent of subjects never attempted suicide 3 months after discharge.
 - 1.6 The average duration that they stayed in the hospital was 2.18 days.
- 2. The opinions of the nurse team about using of the caring protocol for suicidal attempted patients in Fang hospital, Chiang Mai province found that:
- 2.1 Ninety percent of the nurse team who used the caring for suicidal attempted patients protocol in Fang hospital, Chiang Mai province were satisfied with using the protocol.
- 2.2 Eighty percent of the nurse team agreed that the protocol was easy to use and useful to the nurse team, in addition it also covered the physical, psychological, and social aspects.
 - 2.3 Seventy percent of the nurse team can use the protocol.

The study results showed that most of the activities in the protocol were practical and the results can also be used as data for improving protocol and the means for implementing the protocol in effective ways.