ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ความเครียดของพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางประสาท

ศัลยกรรม ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน นางสาวจันทร์จิรา ลิ้มถาวร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ชัยนาถ นาคบุปผา ประธานกรรมการ

อาจารย์สามารถ ศรีจ้ำนงค์ กรรมการ

ดร.วันทนีย์ จันทร์เอี๋ยม กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด ของพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาทางประสาทศัลยกรรมในโรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรจำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความเครียด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลส่วนใหญ่รายงานว่า ความเครียดที่เกิดจากการดูแล ผู้ป่วย อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย ด้านระบบและลักษณะงานที่ปฏิบัติกับผู้ป่วย ได้แก่ การจัดอัตรากำลังให้เหมาะสม และการ ประชุมปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย และญาติ ตลอดจนการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สัมพันธภาพระหว่างบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน ขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และด้านผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพ อาการเจ็บป่วย และแผนการรักษาของผู้ป่วยและญาติ

Independent Study Title Tension of Nurses in Providing Nursing Care of

Neurosurgery Patients in Chiangmai Neurological

Hospital

Author Miss Chanchira Limthavon

M. Ed. Educational Psychology and Guidance

Examining Committee Assoc. Prof. Chainart Nakbubpha Chairman

Lect. Samart Srijumnong Member

Dr. Wantanee Jun-Eam Member

Abstract

This study was to investigate the tension, as well as its related factors, of the nurses who provided care for the patients taking neurosurgery at Chiangmai Neurological Hospital. Population of 60 nurses was used. The instrument used was a rating scale questionnaire measuring the nurses' tension with 0.90 reliability coefficient. The statistics used included frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. It was found that the nurses' tension was at moderate level.

It was found that most of the nurses reportedly had tension from providing care for the neurosurgery patients at moderate level. The factors perceived related to the nurses' tension were the system and characteristics of the nursing care which was broken down to appropriate staffing, having meeting to mutually find the solutions, providing information to the patients' relatives, as well as improving knowledge base of the personnel. Regarding the social environment, and interpersonal relationship, the factors were the relationship among the colleagues, morale, and motivation in engaging in the work. In regard to the patients and their families, the factors included knowledge and understanding about health, illness, and the patients and their relatives' treatment plan.