ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

กวามสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของผู้ป่วยความคันโลหิตสูง

ชื่อผู้เขียน

นางสาวนัยนา เมธา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. พัชราภรณ์ อารีย์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ คร. บุญส่ง นิลแก้ว กรรมการ

อาจารย์ คร. วันชัย นุ้งตุ้ย

กรรมการ

## บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ค้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยความคันโลหิตสูง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจงซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งเพศชายและหญิงไม่จำกัดอายุที่มารับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความคัน โลหิตสูงมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบค้วย 3 ส่วน ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบวัดความเชื่อด้านสุขภาพและ แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยความคันโลหิตสูง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน

## ผลการศึกษาพบว่า

- 1. ระดับของความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม ด้านการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรกและภาวะแทรกซ้อน ด้านการรับรู้ถึงความรุนแรงของการเป็นโรค ด้านการรับรู้ถึง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนในเรื่องของการป้องกันและรักษาโรค ด้านการรับรู้ถึงอุปสรรคใน การปฏิบัติตนและด้านปัจจัยร่วมต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง
- 2. ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อ พิจารณาตามหมวดอาหาร พบว่าในหมวดผักผลไม้และเครื่องดื่มของกลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนน พฤติกรรมการบริโภคอยู่ในระดับสูง ส่วนหมวดแป้ง เนื้อสัตว์ ใขมันและเครื่องปรุงรสของกลุ่ม ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง

3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่าความเชื่อค้านสุขภาพโดยรวมกับพฤติกรรม การบริโภคอาหารของผู้ป่วยความคัน โลหิตสูงไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่เมื่อแยกวิเคราะห์ความ เชื่อค้านสุขภาพออกเป็นรายค้าน พบว่าการรับรู้ถึงความรุนแรงของการเป็นโรคมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระคับ .05 นอกจากนี้เมื่อทำ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยจำแนกพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหมวดอาหารและความเชื่อค้าน สุขภาพออกเป็นรายค้าน พบว่าการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนมีความ สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหมวดแป้ง และการรับรู้ถึงความรุนแรงของการ เป็นโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหมวดเครื่องปรุงรสอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระคับ .05

Independent Study Title

Relationship between Health Belief and Food

Consumption Behavior of Hypertensive Patients

Author

Miss Naiyana Metha

M.S.

Nutrition Education

**Examining Committee** 

Assist. Prof. Dr. Patcharaporn Aree

Chairman

Assoc. Prof. Dr. Boonsong Nilkeaw

Member

Lect. Dr. Wanchai Moongtui

Member

## ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the relationship between health belief and food consumption behavior of hypertensive patients. Purposive sampling were selected 50 patients who attended Mccormick Hospital at least six months. A questionnaire composed of 3 parts was used for data collection: demorgraphic data, health belief, and food consumption. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson's product moment correlation coefficient.

The results of the study showed that:

- 1. The overall health beliefs, the perceived susceptibility, the perceived severity, the perceived benefits, the perceived barrier and modifying factors were at a high level in the sample group.
- 2. Food consumption behavior in the sample group was at moderate level. When the food consumption behavior was classified by type, the results showed that fruit-vegetable and beverage were at a high level but carbohydate, protien, fat and salted sauce were at a moderate level.
- 3. There was no statistically significant relationship between health belief and food consumption behavior. When analysed separately, the results showed a positive relationship between the perceived severity and food consumption behavior at a statistical significant level at .05. Moreover, when analysed food behavior by food type and health belief separately, the results showed a negative relationship between the

perceived susceptibility and carbohydrate, and a positive relationship between the perceived severity and salted sauce at a statistical significant level at .05.

