ชื่อวิทยานิพนธ์

ความต้องการด้านช้อมูลของผู้ป่วยชาวจีนและคู่สมรส

ก่อนผ่าตัดเต้านม

ชื่อผู้เชียน

นางลิจิน

พยาบาลสาสตรมหาบ**ัณฑ**ิต

สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์นั้นทา	เล็กสวัสคิ์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรรยาท	ณ นคร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ	เอียมจ้อย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตร	กรรมการ	
ศาสตราจารย์ ซู วูจูน		กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัย เปรียบ เทียบเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสึกษาความต้องการข้อมูล ก่อนผ่าตัด เต้านมของผู้ป่วยและคู่สมรส และ เปรียบ เทียบความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดระหว่าง ผู้ป่วยและคู่สมรส ระหว่างเดือนธันวาคม 2539 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2540 ในรงพยาบาลที่มีการ เรียนการสอนทางการแพทย์ 3 แห่ง ในเมืองชีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้ป่วยก่อน ผ่าตัด เต้านมจำนวน 40 คน และคู่สมรสที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 2 เข้าร่วมในการ วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบบันทึก ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความต้องการข้อมูลของผู้ป่วย และแบบประเมินความต้องการข้อมูล ของคู่สมรส ซึ่งคัดแปลงใดยผู้วิจัย นำเครื่องมือไปหาความตรงด้าน เนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความต้องการข้อมูล ของผู้ป่วย และแบบประเมินความต้องการข้อมูลของคู่สมรส เท่ากับ .96 และ .95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลจดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า

- 1. ความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เต้านม อยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง โดยมีความต้องการข้อมูล เกี่ยวกับ เรคและการรักษา เป็นอันดับแรก และมีความสำคัญระดับปาน กลาง ความต้องการข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญรองลงมา คือ ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพร่างกาย ความ ผาสุกทางด้านจิตใจของผู้ป่วย ความผาสุกด้านครอบครัวและสังคม ความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยที่ ให้ความสำคัญอันดับแรก คือ ต้องการรู้ว่าผู้ป่วยจะต้องทำอะไรบ้างหลังผ่าตัด เพื่อป้องกันผล เสียที่ จะ เกิดขึ้นจากการผ่าตัด ส่วนข้อมูลที่มีความต้องการน้อยที่สุด คือ ต้องการรู้ว่าโรคและการผ่าตัด มีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ป่วยอย่างไรบ้างในการทำกิจวัตรในสังคมตามปกติ
- 2. ความต้องการข้อมูลของคู่สมรสอยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง โดยคู่สมรสมีความ ต้องการข้อมูล เกี่ยวกับโรคและการรักษา เป็นอันดับแรก และให้ความสำคัญมากที่สุด ความต้องการ ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญรองลงมา คือ ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพร่างกาย ความผาสุกทางด้านจิตใจ ความผาสุกทางด้านครอบครัวและสังคม ต้องการข้อมูล เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค เป็นอันดับแรก ส่วน ข้อมูลที่มีความต้องการน้อยที่สุด คือ ข้อมูล เกี่ยวกับโรคและการผ่าตัด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ สามารถของผู้ป่วยในการทำกิจวัตรในสังคมตามปกติ
- 3. ความต้องการข้อมูลทั้งหมดของผู้ป่วย และคู่สมรสก่อนผ่าตัดไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับความต้องการข้อมูล เกี่ยวกับรรคและการรักษาของผู้ป่วยและคู่สมรส มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคู่สมรสมีความต้องการข้อมูล เกี่ยวกับการพิเคราะห์โรค ผลการพิเคราะห์โรค และสภาพของผู้ป่วยสูงกว่าผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ยังมีความต้องการข้อมูล เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค สา เหตุของอาการและอาการแสดง และภาวะ แทรกช้อนที่อาจ เกิดขึ้นจากการทำผ่าตัดสูงกว่าผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลของการวิจัยอาจนำไปใช้ในด้านการปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการศึกษาพยาบาล เพื่อช่วยให้พยาบาล ผู้บริหารการพยาบาล และนักศึกษาพยาบาลตระหนัก ถึงความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยและคู่สมรสก่อนผ่าตัดเต้านม และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัย ต่อไป และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้ต่อไป

VIII

Thesis Title

Informational Needs of Chinese

Premastectomy Patients and Spouses

Author

Li Jin

M.N.S.

Medical and Surgical Nursing

Examining Committee:

Associate	Professor	Nunta Leksawasdi	Chairman
Assistant	Professor	Marayart Na nakorn	Member
Assistant	Professor	Wanpen Eamjoy	Member
Assistant	Professor	Dr. Sujitra Tiansawad	Member
Professor		Xue Wujun	Member

Abstract

This comparative descriptive designed study was to investigate the informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses. The objectives of this study were to describe the informational needs of premastectomy patients and their spouses, and to compare the informational needs between patients and spouses. The study was conducted from December, 1996 to February, 1997 in three clinical medical colleges in Xi'an, Shaanxi, P.R. China. Forty premastectomy patients and their spouses participated in the study at the second admitted đay. The instrument used for data collection was questionnaire which was composed of two parts: Demographic

Data Form, Patients Informational Need Assessment Scale (PINAS) and Spouses Informational Need Assessment Scale (SINAS) which were developed by the researcher. The content validity of PINAS and SINAS were tested by the experts in the relevant fields. The reliability of PINAS and SINAS were .96 and .95, respectively. Descriptive statistics and t-test were used to analyze data.

The results of this study revealed that:

- 1. The informational needs perceived by the Chinese premastectomy patients was moderate important. Information about the disease and treatment was the priority informational needs and as the moderate important. Other informational needs, in order of descending degree of importance, included information about the physical condition, psychological well-being, family well-being, and social well-being. The first rated informational needs was need of knowing what patients should do after surgery to prevent negative consequences of the surgery. The least rated informational needs was need of knowing how disease and surgery may affect patients's ability to carry on usual social activities.
- 2. The informational needs perceived by spouses was moderate important. Information about the disease and treatment was the priority informational needs and as the most important. Other informational needs, in order of

descending degree of importance, included information about the physical condition, psychological well-being, family well-being, and social well-being. To know the diagnosis was the first priority of all the informational needs. The least rated informational needs was need of knowing how disease and surgery may affect patients' ability to carry on usual social activities.

3. There was no difference on total informational needs between the premastectomy patients and their spouses, but there was significant difference on information about disease and treatment between the patients and their spouses at the level of .05. Spouses rated information about the diagnostic tests/results and the patients' condition significantly higher than the patients at the level of .01, and rated information about the diagnosis, the causes of signs/ symptoms, and possible complications of surgery significantly higher than patients at the level of .05.

The findings of the study may be implicated to nursing practice, nursing administration, and nursing education in helping nurses, nursing administrators, and nursing educators to be much aware of the informational needs of premastectomy patients and spouses. They may also be implicated to nursing research by providing baseline data for further research and inspiring other people to further explore in this area.