

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า

1. มารดาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56) มีพฤติกรรมการดูแลบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ในระดับสูง
2. มารดาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีพฤติกรรมการดูแลบุตรที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในด้านการดูแลที่จำเป็นโดยทั่วไป การดูแลตามระยะพัฒนาการในระดับปานกลาง และการดูแลที่จำเป็นเมื่อมีปัญหาสุขภาพอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 58, 58, และ 64 ตามลำดับ)

ผลการวิจัยครั้งนี้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้พยาบาลเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กป่วยโรคมะเร็ง และใช้เป็นแนวทางในการประเมินและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งของมารดา และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยหาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กป่วยโรคมะเร็ง และการวิจัยนี้ควรจะทำซ้ำในกลุ่มตัวอย่างของมารดาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และในมารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ

Thesis Title: The Dependent-care Agent Performance of Mothers for Children with Cancer

Author: Mrs. Zhao Xiufang

M.N.S. Maternal and Child Nursing

Examining Committee:

Assistant Professor Wimon Tanasuwan	Chairman
Assistant Professor Dr. Ratanawadee Chontawan	Member
Assistant Professor Dr. Khanokporn Sucamvang	Member
Associate Professor Chaweewan Thongchai	Member
Professor Su Zuyou	Member

Abstract

The descriptive study was conducted to identify the level of dependent-care agent performance of mothers for their children with cancer. A purposive sample of 50 mothers of children with cancer was selected from three wards of the First and Second University Hospital of West China University of Medical Sciences in Chengdu, China. Mothers' performance of dependent-care was assessed with the Dependent-care Agent Performance Questionnaire (DCAPQ)

modified from Moore and Mosher (1997). Panel of experts tested the validity of the instrument and Content Validity Index was .81. The reliability of the instrument was tested from which the cronbach Alpha was .89. Data were analyzed using descriptive statistics : range, mean, SD, frequency, and percentage.

Result of this study indicated that :

1. More than half of the subjects (56%) performed dependent-care at a high level.

2. More than half of the subjects had moderate level of dependent-care performance in a universal and developmental dimensions and had high level in health deviation dependent-care performance. (58%, 58% and 64% respectively)

The finding of this study provide information for nurses to understand mothers' dependent-care performance for their cancer children. The finding also provide nurses with guidances to assess and to promote dependent-care preformance of mothers for their cancer children. A replication of this study in a larger sample is recommended. A study of dependent-care performance on a specific type of cancer and comparative study of different dependent-care agents are also recommended.