

ผ่องศรี ศรีมรดก (2536) 3) แบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว ใช้แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวจุฬาลงกรณ์ ที่อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540) สร้างจากแนวคิดแมคมาสเตอร์ 4) แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก แนวคิดของเจฟฟี่ (1998) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และนำไปหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .88 และ 5) แบบสอบถามการปรับทางจิตสังคม ใช้แบบประเมินการปรับทางจิตสังคมต่อความเจ็บป่วยที่สร้างและพัฒนาขึ้นโดยเดอโรเกติส (1986) แปลเป็นภาษาไทยและดัดแปลงโดย มุกดา คุณาวุฒินันท์ (2535) นำแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และแบบสอบถามการปรับทางจิตสังคม เท่ากับ .80, .89, .75, และ .82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นชายที่ได้รับการบำบัดรักษาการคิดสารเสพติดมีคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเอง การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และการปรับทางจิตสังคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเพียงปัจจัยด้านการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวที่สามารถทำนายความผันแปรของการปรับทางจิตสังคมของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 86.9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($R^2 = .869, p < .05$)

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการปรับทางจิตสังคมของวัยรุ่นชายที่ได้รับการรักษาการคิดสารเสพติด ดังนั้นพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีบทบาทในการช่วยให้ครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวที่สามารถส่งเสริมการปรับทางจิตสังคมของวัยรุ่นชายได้

Thesis Title Factors Related to Psychosocial Adjustment in Male Adolescents with Substance Abuse During Therapy

Author Mrs. Aranya Phajuy

M.N.S. Mental Health and Psychiatric Nursing

Examining Committee :

Assistant Professor Dr.Dara wan	Thapinta	Chairman
Lecturer Dr. Ngamwong	Jarusuraisin	Member
Assistant Professor Dr.Seepan	Kantawang	Member
Assistant Professor Puntawee	Chuekao	Member
Assistant Professor Dr.Kharokporn	Sucamvang	Member

Abstract

Substance abuse is common in male adolescents. Previous data concerning substance abuse therapy revealed that after therapy, these adolescents tend to return to substance abuse because of inappropriate psychosocial adjustment.

The purpose of this descriptive correlational research was to describe the level of self-esteem, family functioning, peer influence, and psychosocial adjustment and to determine predictive abilities of self-esteem, family functioning, and peer influence on psychosocial adjustment in male adolescents with substance abuse during therapy. A systematic sampling was used to select a sample of 150 male substance abusers who were 15-19 years old. These adolescents were in therapy at the out-patient department of the Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center. They abused either amphetamine, opium, heroin, or inhalants. The research instrument was a questionnaire which consisted of 5 parts 1) the Personal Data Recording Form, 2) the Self-esteem questionnaire of Rosenberg (1965) which was translated into Thai and modified by Pongsri Srimoragot (1993), 3) the Chulalongkorn Family Inventory (CFI),

developed by Umaporn Trangkasombut (1997) basing on the McMaster Model of Family Functioning (MMFF), 4) the Peer Influence Questionnaire developed by the researcher from both Jaffy Model (1998) and related literature. This questionnaire was confirmed by a panel of experts, and its content validity index was .88, 5) The Psychosocial Adjustment to Illness Inventory of Derogatis (1986) which was translated into Thai and modified by Mukda Kunawat (1992). The reliability of the instrument was tested and result in values for Cronbach's alpha coefficients for the self-esteem Questionnaire, the Chulalongkorn Family Inventory, the Peer Influence Questionnaire, and the Psychosocial Adjustment to Illness Inventory were .80, .89, .75, and .82, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, and stepwise multiple regression.

The major results of the study indicated that male adolescents with substance abuse during therapy had moderate self-esteem, family functioning, peer influence, and psychosocial adjustment. Only family functioning was found to be a significant predictor and this accounted for 86.9 percent of the variability of psychosocial adjustment. ($R^2 = .869$, $p < .05$)

This study suggested that family functioning is a substantial factor influencing on psychosocial adjustment among male adolescents with substance abuse during therapy. Thus, nurses and other involved personnel should stimulate the families to recognize the significant of family functioning in promoting psychosocial adjustment among male adolescents.