

ชื่อเรื่องการศึกษาความเครียดแบบอิสระ ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อผู้เขียน นางปราณี มหาศักดิ์พันธ์

สาขาวิชาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ	ชนะกอก	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี	โอภาส	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณิ	ทนายะติ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์	ลิมตระกูล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์	พงษ์สินทิ	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบความรู้ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่องของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงจำนวน 217 ราย คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และศึกษาแนวปฏิบัติการรักษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไคสแควร์ และ ค่าที่แบบอิสระ

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง มาเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพียงร้อยละ 26.3 มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับ อายุ ระยะเวลาที่ได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วย สถานบริการที่ไปรับการรักษา ระยะทางระหว่างที่พักอาศัยกับสถานบริการ และ วิธีการเดินทางมารับรักษาต่อการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และความพึงพอใจในบริการที่ได้รับระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงทั้งสองกลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Factors Affecting Regular Treatment of Hypertensive Elderly Mae Sot District Tak Province

Author Mrs. Pranee Mahasakphun

Master of Public Health Public Health

Examining Committee

Asst. Prof. Ampai	Chanakok	Chairman
Asst. Prof. Ratre	Opasa	Member
Lecturer Darunee	Tayati	Member
Asst. Prof. Prayong	Limtragool	Member
Asst. Prof. Kannikar	Pongsanit	Member

Abstract

The purposes of this study were to determine factors affecting regular treatment of hypertension and to compare knowledge, practice concerning hypertension, and service satisfaction between regular and irregular treated hypertensive elderly. A sample of 217 hypertensive elderly patients who lived outside the municipality of Mae Sot were systematic randomly selected. Data were collected by using interview, physical examination, and medical records. Data were analyzed by using descriptive statistics and hypotheses tested out by Chi-square test and independent t-test.

The results showed that only 26.3 percent of hypertensive elderly patients received continuous treatment. There were statistical significant relationships between factors including age, duration of care during sickness, type of the health care center and distance from home to the health care center and the regularity of treatment ($p < .05$).

The different levels of knowledge about hypertension and satisfaction of service from the health care centers when compare between regular and irregular treated groups were not found. However, the hypertensive elderly who performed better practice of treatment of hypertension were more likely to receiving regular treatment than the other significantly ($p < .05$).