

### ผลการศึกษา

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มน้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 400 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 342 ฉบับ คัดออก 12 ฉบับ เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ คงเหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 330 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.5 ของแบบสอบถามทั้งหมด

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มน้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 3 ระดับการดื่มน้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการดื่มน้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 4 ปัญหาจากการดื่มน้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

### ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.6) มีอายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปี (ร้อยละ 74.8) อายุเฉลี่ย 41.1 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 73.9) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท (เฉลี่ย 20,517.7 บาท) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 65.2)

กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการมากที่สุด (ร้อยละ 37.6) รองลงมาได้แก่ งานบริหารงานสาธารณสุข งานบริการชุมชน และงานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ คิดเป็นร้อยละ 27.3, 24.5 และ 10.6 ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะทั่วไป	จำนวน (n=330)	ร้อยละ
<b>เพศ</b>		
ชาย	210	63.6
หญิง	120	36.4
<b>อายุ (ปี)</b>		
20-30	42	12.7
31-40	99	30.0
41-50	148	44.8
51-60	41	12.5
อายุเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)	41.1 (8.7)	อายุต่ำสุด 20 ปี อายุสูงสุด 59 ปี
<b>สถานภาพสมรส</b>		
คู่	244	73.9
โสด	62	18.8
หย่า/หม้าย	24	7.3
<b>ระดับการศึกษา</b>		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	64	19.4
ปริญญาตรี	215	65.2
ปริญญาโท / เอก	51	15.4

ตาราง 1 (ต่อ)

ลักษณะทั่วไป	จำนวน (n=330)	ร้อยละ
<b>รายได้ (บาท/เดือน)</b>		
< 15,000	62	18.8
15,000-30,000	244	73.9
30,001-45,000	13	3.9
> 45,000	11	3.4
รายได้เฉลี่ย(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 20,517.7 (7,843.6) รายได้ต่ำสุด 7,830 รายได้สูงสุด 53,000		
<b>สายการปฏิบัติงาน</b>		
บริการวิชาการ	124	37.6
บริหารงานสาธารณสุข	90	27.3
บริการชุมชน	81	24.5
บริหารงานทั่วไป/ธุรการ	35	10.6

## ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่าง

### 2.1 อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 1 ปี และ 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผลการศึกษาถึงอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และช่วงเวลาที่ผ่านมา ก่อนการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวม เท่ากับ ร้อยละ 67.0 โดยเพศชายมีอัตราการดื่ม เท่ากับ ร้อยละ 85.2 และเพศหญิงมีอัตราการดื่ม เท่ากับ ร้อยละ 35.0 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุแล้วพบว่า กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีอัตราการดื่มสูงสุด (ร้อยละ 81.0) โดยอัตราการดื่มจะลดลงในกลุ่มอายุที่มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพคู่ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี และกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด (ร้อยละ 72.2 ร้อยละ 70.2 และร้อยละ 83.9) ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 2

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่า อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรวม เท่ากับ ร้อยละ 55.8 โดยเพศชายมีอัตราการดื่ม ร้อยละ 75.7 และเพศหญิงมีอัตราการดื่ม ร้อยละ 20.8 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20-30 ปี และกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท มีอัตราการดื่มมากที่สุด (ร้อยละ 73.8 และ 75.8) ดังแสดงในตาราง 2

กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานบริหารงานสาธารณสุข มีอัตราการดื่มสูงกว่าสายงานอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาได้แก่กลุ่มที่ปฏิบัติงานในสายงานบริการวิชาการ และสายงานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ คิดเป็นร้อยละ 56.1 และ 51.4 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านสายงานบริการชุมชน มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.6 ดังแสดงในตาราง 2

**ตาราง 2** อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามช่วงเวลาและลักษณะประชากร

ลักษณะประชากร	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (n= 330)	อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
		ช่วง 1 ปี จำนวน (ร้อยละ)	ช่วง 1 เดือน จำนวน (ร้อยละ)
<b>เพศ</b>			
ชาย	210	179 (85.2)	159 (75.7)
หญิง	120	42 (35.0)	25 (20.8)
<b>อายุ (ปี)</b>			
20-30	42	34 (81.0)	31 (73.8)
31-40	99	72 (72.7)	62 (62.6)
41-50	148	91 (61.5)	74 (50.0)
51-60	41	24 (58.5)	17 (41.5)
<b>สถานภาพสมรส</b>			
คู่	62	46 (74.2)	41 (66.1)
โสด	245	163 (66.5)	137 (55.9)
หย่า/หม้าย	23	12 (52.2)	6 (26.1)

ตาราง 2 (ต่อ)

ลักษณะประชากร	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (n= 330)	อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
		ช่วง 1 ปี จำนวน (ร้อยละ)	ช่วง 1 เดือน จำนวน (ร้อยละ)
<b>ระดับการศึกษา</b>			
ต่ำกว่าปริญญาตรี	64	41 (64.1)	32 (50.0)
ปริญญาตรี	215	151 (70.2)	132 (61.4)
ปริญญาโท / เอก	51	29 (56.9)	20 (39.2)
<b>รายได้ (บาท/เดือน)</b>			
< 15,000	62	52 (83.9)	47 (75.8)
15,000-30,000	244	153 (62.7)	125 (51.2)
>30,000	24	16 (66.7)	12 (50.0)
<b>สายการปฏิบัติงาน</b>			
บริหารงานสาธารณสุข	90	72 (80.0)	61 (67.8)
บริการวิชาการ	124	80 (64.5)	64 (51.6)
บริหารงานทั่วไป/ ธุรการ	35	22 (62.9)	18 (51.4)
บริการชุมชน	81	47 (58.0)	41 (50.6)

## 2.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคลากรสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

### 2.2.1 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งแรก

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 80.0 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเพศชายเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 95.2 และเพศหญิงเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 53.3 อายุเฉลี่ยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกคือ 19.5 ปี (อายุต่ำสุดคือ 8 ปี สูงสุด คือ 30 ปี) เพศชาย ดื่มครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ยเท่ากับ 18.9 ปี ในขณะที่เพศหญิงดื่มครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 21.2 ปี

ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า เพศชายดื่มเครื่องดื่มประเภทเหล้ามากที่สุด (ร้อยละ 67.2) ในขณะที่เพศหญิง ดื่มเครื่องดื่มประเภทไวน์/ไวน์คูลเลอร์/น้ำผลไม้ มากที่สุด

(ร้อยละ 39.0) กลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงให้เหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกคือ อยากรอง/เพื่อนชวนดื่มมากที่สุด (ร้อยละ 51.5) รองลงมาคือเพื่อเข้าสังคม/ฉลองในการทำงาน (ร้อยละ 36.0) มีเพียง ร้อยละ 1.1 เท่านั้น ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกจากคนในครอบครัว ชวนดื่ม ส่วนบุคคลที่ดื่มด้วยครั้งแรก ได้แก่เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 91.1 รองลงมาได้แก่ การดื่มกับญาติ/ลูกพี่ลูกน้อง และดื่มคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 5.1 และ 1.9 ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 3

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ

พฤติกรรมการดื่มครั้งแรก	ชาย	หญิง	รวม
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
<b>การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b>			
เคยดื่ม	200 (95.2)	64 (53.3)	264 (80.0)
ไม่เคยดื่ม	10 (4.8)	56 (46.7)	66 (20.0)
รวม	210 (100.0)	120 (100.0)	330 (100.0)
<b>อายุ ที่ดื่มครั้งแรก</b>			
< 18	54 (28.1)	3 (5.0)	57 (22.6)
≥ 18	138 (71.9)	57 (95.0)	115 (77.4)
รวม	196 (100.0)	60 (100.0)	252 (100.0)
ต่ำสุด-สูงสุด	8-30	12-30	8-30
อายุเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)	18.9 (3.7)	21.2 (3.7)	19.5 (3.8)
<b>ชนิดของเครื่องดื่มที่ดื่มครั้งแรก</b>			
เหล้า/วิสกี้/บรันดี	133 (67.2)	20 (31.3)	153 (58.4)
เบียร์	30 (15.2)	17 (26.6)	47 (17.9)
ไวน์ / ไวน์คูเลอร์/น้ำผลไม้	9 (4.5)	25 (39.0)	34 (13.0)
เหล้าขาว/เซียงซุน	26 (13.1)	2 (3.1)	28 (10.7)
รวม	198 (100.0)	64 (100.0)	262 (100.0)

ตาราง 3 (ต่อ)

พฤติกรรมการณ์ครั้งแรก	ชาย	หญิง	รวม
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
<b>เหตุผลในการดื่มครั้งแรก (ต่อ)</b>			
อยากลอง/เพื่อนชวนดื่ม	108 (54.0)	28 (43.7)	136 (51.5)
เข้าสังคม/ทดลองในการทำงาน	69 (34.5)	26 (40.6)	95 (36.0)
ให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้	9 (4.5)	6 (9.4)	15 (5.7)
คนในครอบครัวชวนดื่ม	2 (1.0)	1 (1.6)	3 (1.1)
อื่นๆ ได้แก่ โก้เก๋ สนุกสนาน ออกหัก	12 (6.0)	3 (4.7)	15 (5.7)
รับน้องใหม่			
รวม	200 (100.0)	64 (100.0)	264 (100.0)
<b>บุคคลที่ดื่มด้วยในครั้งแรก</b>			
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา	179 (91.8)	57 (89.1)	236 (91.1)
ญาติ/ลูกพี่ลูกน้อง	9 (4.6)	4 (6.1)	13 (5.1)
ดื่มคนเดียว	4 (2.1)	1 (1.6)	5 (1.9)
พ่อ/แม่	3 (1.5)	1 (1.6)	4 (1.5)
คนรัก/แฟน	0 (0.0)	1 (1.6)	1 (0.4)
รวม	195 (100.0)	64 (100.0)	259 (100.0)

### 2.2.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาพบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มมากที่สุดคือ เบียร์ และเหล้า (ร้อยละ 76.0 และ 67.8) รองลงมาได้แก่ไวน์/ไวน์คูเลอร์ และเซียงซุน (ร้อยละ 12.7 และ 2.7) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชายนิยมดื่มเบียร์ ร้อยละ 81.0 รองลงมาได้แก่เหล้า/วิสกี้/บรันดี ไวน์/ไวน์ คูเลอร์ และเซียงซุน คิดเป็นร้อยละ 73.2 , 8.4 และ 3.4 ตามลำดับ ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 54.8 และร้อยละ 50.0 นิยมดื่มเบียร์ และเหล้า/วิสกี้/บรันดี ส่วนปริมาณการดื่ม เพศชายดื่มเบียร์ในปริมาณ 3-6 กระป๋อง ร้อยละ 33.5 ในขณะที่เพศหญิงส่วนใหญ่ ดื่มเบียร์ 1-2 กระป๋อง ร้อยละ 71.4 เพศชาย ร้อยละ 12.8 มักจะดื่ม



4 ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกว่า ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 81.1 มักจะดื่มเดือนละ 1 ครั้งหรือน้อยกว่า ทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.8 และ 83.3) จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน/รับประทานอาหารเย็น โดยระยะเวลาที่ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้อยกว่า 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 59.3 และดื่มมากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป ร้อยละ 40.7 และมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน มากที่สุด ร้อยละ 70.1 มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.2 ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ทำงาน และร้อยละ 4.1 ดื่มในขณะที่จับชี่ยนพาหนะ

กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชาย และเพศหญิง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อน/เพื่อนร่วมงานมากที่สุด ร้อยละ 94.1 โดยเพศหญิงดื่มกับคนในครอบครัวมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 45.8 และ 25.1) ในขณะที่เพศชายดื่มคนเดียวมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 10.6 และ 9.5) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน โอกาสพิเศษ วันหยุด งานเทศกาล และประเพณีต่างๆ รองลงมาคือ การดื่มเมื่อไปท่องเที่ยวพักผ่อน/ไปเที่ยวสถานบันเทิง (ร้อยละ 61.5) มีร้อยละ 13.6 ที่ดื่มระหว่างมื้ออาหาร

กลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.3) ให้เหตุผลว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเข้าสังคม/เพื่อนชวน/สนุกสนาน โดยเพศชายให้เหตุผลว่า ดื่มเพื่อคลายเครียด ร้อยละ 38.5 ในขณะที่เพศหญิงดื่มเพื่อคลายเครียด ร้อยละ 23.8 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อครั้ง ประมาณ 100-500 บาท มีร้อยละ 9.0 และร้อยละ 6.4 เท่านั้นที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 100 บาท หรือสูงกว่า 500-1,000 บาท และไม่พบผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีปัญหาครอบครัว หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน หรือเพราะติดสุรา ดังแสดงในตาราง 4



ตาราง 4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ

พฤติกรรมการดื่ม	ชาย	หญิง	รวม
	จำนวน (ร้อยละ) (n= 179)	จำนวน (ร้อยละ) (n= 42)	จำนวน (ร้อยละ) (n= 221)
<b>ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มักจะดื่มบ่อยๆ*</b>			
เบียร์	145 (81.0)	23 (54.8)	168 (76.0)
เหล้า/วิสกี้/บรันดี/เหล้าขาว/เหล้าเสรี	131 (73.2)	21 (50.0)	152 (67.8)
ไวน์/ไวน์คูเลอร์	15 (8.4)	13 (30.9)	28 (12.7)
เซียงซุน	6 (3.4)	0 (0.0)	6 (2.7)
<b>ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อครั้ง)</b>			
เบียร์ 1-2 กระป๋อง หรือเหล้าน้อยกว่า 1 เป๊ก	43 (24.1)	30 (71.4)	73 (33.0)
เบียร์ 2-3 กระป๋อง หรือเหล้า 1-2 เป๊ก	45 (25.1)	6 (14.3)	51 (23.1)
เบียร์ 3-4 กระป๋อง หรือเหล้า 2-3 เป๊ก	31 (17.3)	2 (4.8)	33 (14.9)
เบียร์ 4-6 กระป๋อง หรือเหล้า 3-4 เป๊ก	60 (33.5)	4 (9.5)	64 (29.0)
<b>ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b>			
เดือนละ 1 ครั้งหรือน้อยกว่า	60 (33.5)	37 (88.1)	97 (44.0)
2-4 ครั้ง/เดือน	60 (33.5)	3 (7.1)	63 (28.4)
2-3 ครั้ง/สัปดาห์	36 (20.2)	1 (2.4)	37 (16.7)
4 ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่า	23 (12.8)	1 (2.4)	24 (10.9)
<b>ช่วงเวลาที่ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*</b>			
ช่วงก่อน/เวลาทำงาน	8 (4.5)	3 (7.1)	11 (5.0)
ช่วงเย็นหลังเลิกงาน/รับประทานอาหารเย็น	141 (78.8)	20 (83.3)	161 (73.9)
ช่วงกลางคืน หลัง 19.00 น.	57 (31.8)	19 (45.2)	76 (34.4)
<b>ระยะเวลาที่ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b>			
< 1-2 ชั่วโมง	107 (59.8)	24 (57.1)	131 (59.3)
> 2 ชั่วโมงขึ้นไป	72 (40.2)	18 (42.9)	90 (40.7)

หมายเหตุ: \* ตอบได้หลายข้อ

ตาราง 4 (ต่อ)

พฤติกรรมการดื่ม	ชาย	หญิง	รวม
	จำนวน (ร้อยละ) (n= 179)	จำนวน (ร้อยละ) (n= 42)	จำนวน (ร้อยละ) (n= 221)
<b>สถานที่ที่ดื่มบ่อยครั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*</b>			
ในบ้าน	81 (45.3)	21 (50.0)	102 (46.2)
นอกบ้าน	125 (69.8)	30 (71.4)	155 (70.1)
สถานที่ทำงาน	24 (13.4)	3 (7.1)	27 (12.2)
ขณะขับขี่ยานพาหนะ	8 (4.5)	1 (2.4)	9 (4.1)
<b>บุคคลที่ดื่มด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*</b>			
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใต้บังคับบัญชา	170 (95.0)	38 (90.5)	208 (94.1)
คนในครอบครัว/คนรัก/ แฟน	45 (25.1)	11 (45.8)	56 (25.3)
ดื่มคนเดียว	19 (10.6)	4 (9.5)	23 (10.4)
<b>โอกาสในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*</b>			
วาระพิเศษ/เทศกาล/ประเพณี/วันหยุด	163 (91.1)	38 (90.5)	201 (91.0)
ท่องเที่ยว/พักผ่อน/เที่ยวสถานบันเทิง	112 (62.6)	24 (57.1)	136 (61.5)
ดื่มระหว่างมื้ออาหาร	25 (14.0)	5 (20.8)	30 (13.6)
<b>เหตุผลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*</b>			
เข้าสังคม/เพื่อนชักชวน/สนุกสนาน/ จิตใจในรสชาติ	164 (91.6)	40 (95.2)	204 (92.3)
คลายเครียด	69 (38.5)	10 (23.8)	79 (35.7)
ครอบครัวชักชวน	72 (40.2)	6 (14.3)	78 (35.3)
<b>ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (บาท/ครั้ง)</b>			
< 100	12 (6.7)	8 (19.0)	20 (9.0)
100-500	156 (87.2)	31 (73.8)	187 (84.6)
500-1,000	11 (6.1)	3 (7.2)	14 (6.4)

หมายเหตุ: \* ตอบได้หลายข้อ

**ส่วนที่ 3 ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่าง**

**3.1 ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง**

ผลการศึกษาถึงระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้แบบคัดกรอง AUDIT พบว่า เพศชาย ร้อยละ 50.5 มีอัตราการดื่มแบบเสี่ยง/อันตราย ในขณะที่เพศหญิงดื่มแบบเสี่ยง/อันตรายเพียงร้อยละ 4.2 โดยทุกช่วงอายุมีอัตราการดื่มแบบเสี่ยง/อันตรายใกล้เคียงกัน มีอัตราการดื่มอยู่ประมาณร้อยละ 29-35

ผู้ที่มีสถานภาพ โสด ดื่มแบบเสี่ยง/อันตรายมากที่สุด (ร้อยละ 35.1) ผู้ที่มีสถานภาพ สมรส หย่า/หม้าย ดื่มแบบเสี่ยง/อันตรายน้อยที่สุด (ร้อยละ 17.4) เมื่อพิจารณาระดับการดื่ม ตามการศึกษา และรายได้แล้ว พบว่า มีการดื่มแบบเสี่ยง/อันตราย อยู่ระหว่าง ร้อยละ 29-39

กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในสายงานบริหารงานสาธารณสุข มีอัตราการดื่มแบบเสี่ยง/อันตรายสูงที่สุด รองลงมาได้แก่สายงานบริการชุมชน สายงานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ และสายงานบริการวิชาการมีอัตราการดื่มแบบเสี่ยง/อันตรายน้อยที่สุด โดยมีอัตราการดื่มเท่ากับ ร้อยละ 47.8, 33.1, 27.2 และ 14.3 ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 5

**3.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่าง**

ปัจจัย ด้านเพศ และสายการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) โดยพบว่า ผู้ที่ดื่มแบบเสี่ยง/อันตราย เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง 23.4 เท่า (95%CI= 9.2-59.7) และ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารสาธารณสุข ดื่มแบบเสี่ยง/อันตราย มากกว่า งานบริการชุมชน บริหารงานทั่วไป/ธุรการ และบริการวิชาการ อยู่ 5.5, 3.0 และ 2.2 เท่า (95%CI = 2.0-15.4, 1.1-8.2 และ 0.8-6.5) ส่วนปัจจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพสมรส ไม่มีความ สัมพันธ์กับระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังแสดงในตาราง 5

ตาราง 5 ระดับการดื่ม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะทางประชากร	ระดับการดื่ม		OR (95%CI)	p-value
	ไม่ดื่ม/เสี่ยงต่ำ จำนวน (ร้อยละ) (n= 219)	เสี่ยง/อันตราย จำนวน (ร้อยละ) (n= 111)		
<b>เพศ</b>				
ชาย	104 (49.5)	106 (50.5)	23.4 (9.2-59.7)	0.001*
หญิง	115 (95.8)	5 (4.2)	1	
<b>อายุ (ปี)</b>				
20-30	28 (66.7)	14 (33.3)	1.2 (0.5-3.1)	0.68
31-40	66 (66.7)	33 (33.3)	1.2 (0.5-2.7)	0.63
41-50	96 (64.9)	25 (35.1)	1.3 (0.6-2.8)	0.48
51-60	29 (70.7)	12 (29.3)	1	
<b>สถานภาพสมรส</b>				
คู่	159 (64.9)	86 (35.1)	2.6 (0.9-7.8)	0.08
โสด	41 (66.1)	21 (33.9)	2.4 (0.7-8.1)	0.13
หย่า/หม้าย	19 (82.6)	4 (17.4)	1	
<b>ระดับการศึกษา</b>				
ต่ำกว่าปริญญาตรี	41 (64.1)	23 (35.9)	1.0 (0.5-2.2)	0.94
ปริญญาตรี	145 (67.4)	70 (32.6)	0.9 (0.5-1.7)	0.70
ปริญญาโท / เอก	33 (64.7)	18 (35.3)	1	
<b>รายได้ (บาท/เดือน)</b>				
< 15,000	38 (61.3)	24 (38.7)	1.5 (0.6-4.2)	0.40
15,000-30,000	164 (67.2)	80 (32.8)	1.2 (0.5-3.0)	0.71
>30,000	17 (70.8)	7 (29.2)	1	

ตาราง 5 (ต่อ)

ลักษณะทางประชากร	ระดับการดื่ม		OR (95%CI)	p-value
	ไม่ดื่ม/เสี่ยงต่ำ	เสี่ยง/อันตราย		
	จำนวน (ร้อยละ) (n= 219)	จำนวน (ร้อยละ) (n= 111)		
<b>สายการปฏิบัติงาน</b>				
บริหารงานสาธารณสุข	47 (52.2)	43 (47.8)	5.5 (2.0-15.4)	0.001*
บริการชุมชน	83 (66.9)	41 (33.1)	3.0 (1.1-8.2)	0.03*
บริหารงานทั่วไป/ธุรการ	59 (72.8)	22 (27.2)	2.2 (0.8-6.5)	0.13
บริการวิชาการ	30 (85.7)	5 (14.3)	1	

#### ส่วนที่ 4 ปัญหา และผลกระทบ ที่ได้รับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

##### 4.1 ปัญหาด้านสุขภาพ

กลุ่มตัวอย่าง 2 ใน 3 (ร้อยละ 73.8) รายงานว่ามีอาการเกิดขึ้นภายหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีอาการเมามากที่สุด ร้อยละ 53.4 รองลงมาได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน อาการหลงลืม อาการมือสั่น และอารมณ์หงุดหงิดง่าย (ร้อยละ 22.2, 12.2, 6.3 และ 3.6 ตามลำดับ) โดยเพศชายจะพบทุกอาการ ในขณะที่เพศหญิงรายงานว่ามีอาการไม่สบายหลังการดื่มเพียง 2 อาการ คือเมามาก และคลื่นไส้ อาเจียน ร้อยละ 52.4 และ 11.9 ตามลำดับ โรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า เป็นโรคกระเพาะอาหารมากที่สุด ร้อยละ 19.5 รองลงมาได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง และโรคเบาหวาน/โรคหัวใจ (ร้อยละ 8.6, 1.4 และ 0.9 ตามลำดับ) โดยโรคตับแข็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ พบเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายเท่านั้น ไม่มีผู้รายงานที่เกิดโรคมะเร็ง โรคพิษสุราเรื้อรังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 1.8 มีอาการซึมเศร้า และร้อยละ 4.5 เคยได้รับบาดเจ็บจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังแสดงในตาราง 6

##### 4.2 ปัญหาการทำงาน ปัญหาครอบครัว และค่าใช้จ่าย

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.1 รายงานว่ามีปัญหาการทำงาน โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วนของผู้มีปัญหาการทำงาน เพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 3.8: 1 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการไปทำงานสายหรือขาดงาน ทำงานได้แย่ง และถูกตำหนิจากผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 18.6,

11.3 และ 1.8 ตามลำดับ) ส่วนปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนบ้าน พบในเฉพาะในเพศชาย ร้อยละ 1.7 และ 1.1 ตามลำดับ แต่ไม่มีรายงานว่าเคยถูก ภาคทัศน์ หรือต้องโทษทางวินัยจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือเคยถูกจับขณะเมาสุรา

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.3 รายงานว่ามีปัญหาครอบครัว ปัญหาที่พบในเพศชายคือ การโต้เถียงทะเลาะวิวาท หวาดระแวงหึงหวง และทำร้ายร่างกาย (ร้อยละ 18.4, 2.8 และ 0.6 ตามลำดับ) ส่วนเพศหญิงพบเฉพาะการโต้เถียงทะเลาะวิวาท ไม่พบปัญหาการหย่าร้างที่เกิดจากการ ดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายพบว่า ร้อยละ 61.1 รายงานว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย โดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 57.0 มีค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.9 มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดจากการดื่มเพิ่มขึ้น และร้อยละ 10.0 มี หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเพศชายมีค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น มากกว่าเพศหญิง ดังแสดงในตาราง 6

#### 4.3 ผลกระทบที่ได้รับจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับผลกระทบที่เกิดจากผู้ดื่ม แอลกอฮอล์ โดยผลกระทบที่ได้รับมากที่สุดคือเกิดความรำคาญ ร้อยละ 75.8 การมีคนเมาชวน ทะเลาะ ร้อยละ 40.9 มีปัญหาขัดแย้งกับผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 39.4 และร้อยละ 7.6 เคยถูก ทำร้ายร่างกายจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับ ผลกระทบที่เกิดจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์ คือ เกิดความรำคาญมากที่สุด ร้อยละ 64.0 การมีคนเมาชวน ทะเลาะ ร้อยละ 25.6 ส่วนร้อยละ 4.2 เคยถูกทำร้ายร่างกายจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่มให้ข้อมูลการได้รับผลกระทบจากผู้ดื่ม มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดื่มในทุกเรื่อง ดังแสดงในตาราง 7



ตาราง 6 ปัญหาที่พบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ

ปัญหา	ชาย	หญิง	รวม
	จำนวน (ร้อยละ) (n=179)	จำนวน (ร้อยละ) (n=42)	จำนวน (ร้อยละ) (n=221)
<b>อาการไม่สบาย</b>			
ไม่มี	40 (22.3)	18 (42.9)	58 (26.2)
มี*	139 (77.7)	24 (57.1)	163 (73.8)
- อาการเมาค้าง	96 (53.6)	22 (52.4)	118 (53.4)
- อาการคลื่นไส้ อาเจียน	44 (24.6)	5 (11.9)	49 (22.2)
- อาการหลงลืม	27 (15.1)	0 (0.0)	27 (12.2)
- อาการมือสั่น	14 (7.8)	0 (0.0)	14 (6.3)
- อารมณ์หงุดหงิดง่าย	8 (4.5)	0 (0.0)	8 (3.6)
<b>โรค/ปัญหาสุขภาพ</b>			
ไม่มี	106 (59.2)	28 (66.7)	134 (60.6)
มี*	73 (40.8)	14 (33.3)	87 (39.4)
- โรคกระเพาะอาหาร	34 (19.0)	9 (21.4)	43 (19.5)
- ความดันโลหิตสูง	16 (8.9)	3 (7.1)	19 (8.6)
- โรคตับแข็ง	3 (1.7)	0 (0.0)	3 (1.4)
- เบาหวาน/โรคหัวใจ	2 (1.1)	0 (0.0)	2 (0.9)
- มีอาการซึมเศร้า/เคยคิดทำร้ายตนเอง	3 (1.7)	1 (2.4)	4 (1.8)
- ได้รับบาดเจ็บจากการดื่มแอลกอฮอล์	9 (5.0)	1 (2.4)	10 (4.5)

หมายเหตุ \* ตอบได้หลายข้อ



ตาราง 6 (ต่อ)

ปัญหา	ชาย	หญิง	รวม
	จำนวน (ร้อยละ) (n=179)	จำนวน (ร้อยละ) (n=42)	จำนวน (ร้อยละ) (n=221)
<b>ปัญหาด้านการทำงาน</b>			
ไม่มี	131 (73.2)	39 (92.9)	170 (76.9)
มี *	48 (26.8)	3 (7.1)	51 (23.1)
- ไปทำงานสาย หรือขาดงาน	38 (21.2)	3 (7.1)	41 (18.6)
- การทำงานแย่ง	23 (12.8)	2 (4.8)	25 (11.3)
- ถูกตำหนิจากผู้บังคับบัญชา	3 (1.7)	1 (2.4)	4 (1.8)
- มีการทะเลาะวิวาท	3 (1.7)	0 (0.0)	3 (1.4)
- มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนบ้าน	2 (1.1)	0 (0.0)	2 (0.9)
<b>ปัญหาครอบครัว</b>			
ไม่มี	144 (80.4)	41 (97.6)	185 (83.7)
มี *	35 (19.6)	1 (2.4)	36 (16.3)
- มีการโต้เถียง	33 (18.4)	1 (2.4)	34 (15.4)
- เกิดการหวาดระแวงหึงหวง	5 (2.8)	0 (0.0)	5 (2.3)
- มีการทำร้ายร่างกาย	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.5)
<b>ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย</b>			
ไม่มี	58 (32.4)	28 (66.7)	86 (38.9)
มี *	121 (67.6)	14 (33.3)	135 (61.1)
- มีค่าใช้จ่ายจากการซื้อ เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น	112 (62.6)	14 (33.3)	126 (57.0)
- มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิด จากการดื่มเพิ่มขึ้น	28 (15.6)	5 (11.9)	33 (14.9)
- มีหนี้สินที่เกิดจากการดื่ม	21 (11.7)	1 (2.4)	22 (10.0)

หมายเหตุ \* ตอบได้หลายข้อ

ตาราง 7 ผลกระทบที่ได้รับจากผู้ที่ใช้เครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์ จำแนกตามกลุ่มที่ดื่มและไม่ดื่ม

ผลกระทบที่ได้รับ*	ผู้ดื่ม	ผู้ที่ไม่ดื่ม	รวม
	จำนวน (ร้อยละ) (n= 264)	จำนวน (ร้อยละ) (n= 66)	จำนวน (ร้อยละ) (n= 330)
ก่อนความรำคาญ	169 (64.0)	50 (75.8)	219 (66.4)
มีคนเมาชนทะเลาะ	58 (22.0)	27 (40.9)	85 (25.6)
มีปัญหาขัดแย้งกับผู้ดื่มเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์	51 (19.3)	26 (39.4)	77 (23.3)
มีปัญหาขัดแย้งกับคู่สมรสที่ดื่มเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์	43 (16.3)	23 (34.8)	66 (20.0)
เคยได้รับอุบัติเหตุจากผู้ดื่มเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์	44 (16.7)	14 (21.2)	58 (17.6)
มีปัญหาหนี้สินที่เกิดจากคนในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์	33 (12.5)	18 (27.3)	51 (15.5)
เคยถูกทำร้ายร่างกายจากคนเมา	9 (3.4)	5 (7.6)	14 (4.2)
อื่นๆ ได้แก่ เสียงดังรบกวน มีเวลาให้ครอบครัวน้อย	4 (1.5)	1 (1.5)	5 (1.5)

\* ตอบได้หลายข้อ

## ส่วนที่ 5 ความเห็นต่อประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์

### 5.1 ความเห็นต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้ โดยเห็นด้วยมากที่สุดคือ การห้ามจำหน่าย และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์ ทุกชนิดในสถานที่ราชการ การควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประกาศฯ และการบำบัดรักษาผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ด้วยความสมัครใจ ส่วนการให้สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ที่ติดเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์ในหน่วยงานนั้น มีผู้ไม่เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 32.0 ดังแสดงในตาราง 8

ในผู้ที่เห็นด้วยกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข บางส่วนให้ความเห็นว่า มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ดี เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร เพราะบุคลากรสาธารณสุขควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน และเห็นว่า มาตรการไม่ให้มีการจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์ในหน่วยงาน ควรควรมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประกาศของกระทรวงฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า มาตรการดังกล่าวอาจเป็นการลดทอนสิทธิ เพราะการดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์เป็นสิทธิส่วนบุคคล มีบางส่วนเห็นว่าการห้ามดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะรัฐบาลยังส่งเสริมให้มีการจำหน่ายเครื่องดัดแอลกอฮอล์ อีกทั้งมาตรการทางกฎหมายยังมีผลบังคับใช้ได้ไม่เต็มที่

กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่า การดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์เป็นการเข้าสังคม สร้างบรรยากาศที่ดีในงานสังสรรค์ต่าง ๆ ทำให้เกิดความสุขสนาน และการดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์ในปริมาณพอสมควร ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อใครก็น่าจะดัดได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่า การดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้ากับชาวบ้านและหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้ดี และการดัดสุราเป็นวิถีของชุมชน

**ตาราง 8** ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดัดแอลกอฮอล์

ข้อความ	ความคิดเห็น (n=328)	
	เห็นด้วย จำนวน (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย จำนวน (ร้อยละ)
1. การห้ามจำหน่ายเครื่องดัดแอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	320 (97.6)	8 (2.4)
2. การห้ามมิให้มีผู้ใดดัดเครื่องดัดแอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	301 (91.8)	27 (8.2)
3. การให้สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ในหน่วยงาน	223 (68.0)	105 (32.0)
4. การให้หน่วยงานดำเนินการบำบัดรักษาผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ของหน่วยงานด้วยความสมัครใจ	296 (90.2)	32 (9.8)
5. หัวหน้าของหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุมกำกับให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศฯ	301 (91.8)	27 (8.2)

## 5.2 ความเป็นไปได้ต่อการนำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไปปฏิบัติ

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ของการนำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไปปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานที่ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และการควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประกาศฯ นั้น มีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติมาก ส่วนการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ และการให้หน่วยงานสำรวจขึ้นทะเบียน และดำเนินการบำบัดรักษาผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ด้วยความสมัครใจนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นไปได้น้อยจนถึงเป็นไปไม่ได้ ดังแสดงในตาราง 9

ในผู้ที่เห็นว่าการนำประกาศกระทรวงฯ ไปปฏิบัติได้ มีความเป็นไปได้น้อยนั้น ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หน่วยงานยังขาดมาตรการการบังคับใช้ และขาดกลไกในการตรวจสอบ ความเอาใจจริงเอาใจของผู้บริหารหน่วยงานที่จะบังคับใช้ต่อมาตรการดังกล่าวยังมีน้อย

ตาราง 9 ความเป็นไปได้ในการนำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติใช้

ข้อความ	ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ (n=310)		
	มาก จำนวน (ร้อยละ)	น้อย จำนวน (ร้อยละ)	เป็นไปไม่ได้ จำนวน (ร้อยละ)
1. การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	249 (80.3)	54 (17.4)	7 (2.3)
2. การห้ามมิให้มีผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	145 (46.8)	141 (45.5)	24 (7.7)
3. การให้สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ในหน่วยงาน	109 (35.1)	136 (43.9)	65 (21.0)
4. การให้หน่วยงานดำเนินการบำบัดรักษาผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ของหน่วยงานด้วยความสมัครใจ	112 (36.1)	168 (54.2)	30 (9.7)
5. หัวหน้าของหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุมกำกับให้บุคลากรในส่วนราชการปฏิบัติตามประกาศฯ	157 (50.6)	124 (40.0)	29 (9.4)