

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการ
การพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน นางอัญชนิ ศิริ

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มุ่งด้อย ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพพาพร ตั้งอำนาจ กรรมการ

บทคัดย่อ

การผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน เป็นการผ่าตัดที่พบบ่อยในโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ฉุกเฉิน โดยที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า การศึกษาเชิงพรรณานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ได้แก่ การผ่าตัดไส้ติ่ง ณ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึง เดือนเมษายน 2549 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป และแบบสัมภาษณ์ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ซึ่งสร้างโดยผู้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.92 และได้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉินโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ($\bar{X} = 3.53, S.D. = 0.71$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการการพยาบาลด้านร่างกายอยู่ในระดับสูงมาก ($\bar{X} = 3.65, S.D. = 0.61$) ส่วนความต้องการการพยาบาลด้านจิตสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง ($\bar{X} = 3.46, 3.47; S.D. = 0.78, 0.74$, ตามลำดับ)

2. การตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉินโดยรวมอยู่ในระดับสูง ($\bar{X} = 3.29, S.D. = 0.74$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า การตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ($\bar{X} = 3.34, 3.28$ และ $3.26; S.D. = 0.71, 0.72$ และ 0.78 ตามลำดับ)

ผลการศึกษานี้ บุคลากรพยาบาลควรตระหนักถึงความต้องการการพยาบาลที่อยู่ในระดับสูงหรือสูงมากด้วย เพื่อจะได้ให้การพยาบาลตามระดับความต้องการ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ตามระดับความต้องการการพยาบาล

Independent Study Title Nursing Care Needs and Responses of Postoperative Emergency
Abdominal Patients, Maetang Hospital, Chiang Mai Province

Author Mrs. Anchanee Siri

Degree Master of Nursing Science (Adult Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Assistant Professor Dr. Wanchai Moongtui Chairperson

Assistant Professor Thiphaphorn Tungamnuay Member

ABSTRACT

Emergency abdominal surgery is one of the most common operations in Maetang Hospital, Chiang Mai Province. During an emergency situation, patients have no time to prepare for surgery. This descriptive study aimed to investigate the nursing care needs and responses of postoperative emergency abdominal patients. Sample consisted of 30 postoperative emergency appendectomy patients who were admitted at Maetang Hospital, Chiang Mai Province during October 2005 to April 2006. Research instrument was an Interview Form, which was composed of two parts: general data form and nursing care needs and responses of postoperative emergency abdominal patients form, developed by the researcher based on a review of literature. The instrument was validated by a panel of experts and the content validity index was 0.92. The reliability was tested using Cronbach's alpha coefficient of nursing care needs questionnaires and responses of postoperative emergency abdominal patients questionnaires were 0.90 and 0.92, respectively. The data was analyzed using descriptive statistics.

The study results were:

1. The overall nursing care needs were at the highest level ($\bar{X} = 3.53$, S.D. = 0.71); When analyzed separately for each aspect, subjects had physiological needs at the highest level ($\bar{X} = 3.65$, S.D. = 0.61) and socio-psychological needs and environmental needs were at a high level ($\bar{X} = 3.46, 3.47$; S.D. = 0.78, 0.74, respectively).

2. The overall responses was at a high level ($\bar{X} = 3.29$, S.D. = 0.74); When analyzed separately for each aspect, subjects had physiological needs, socio-psychological needs and environmental needs were are at a high level ($\bar{X} = 3.34, 3.28, 3.26$; S.D. = 0.71, 0.72, 0.78, respectively).

The findings of the study would raise awareness of nursing care needs and response of postoperative emergency abdominal patients to plan and enhance nursing care.