

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรม การดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน นางดวงเดือน เนตรกระจ่าง

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

อาจารย์ ดร.หรรษา

เศรษฐบุปผา ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรภรณ์

อารีย์

กรรมการ

บทคัดย่อ

โรคจิตจากสุราเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมและ ผู้ป่วยโรคจิตจากสุราจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในการจัดการกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ การเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มเป็นการบำบัดที่อาจช่วยในการจัดการกับพฤติกรรมการดื่ม แอลกอฮอล์ได้

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคจิตจากสุราจำนวน 15 ราย เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มสำหรับ ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ที่สร้างขึ้นโดย เพ็ญนภา สุตาคำ และหรรษา เศรษฐบุปผา (2550) 2) แบบประเมิน พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Use Disorders Identification Test) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบแบบฟริดแมน (Friedman Test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. คะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุราของกลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มภายหลังสิ้นสุดโปรแกรม 2 สัปดาห์ ต่ำกว่าก่อน เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. คะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุราของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มภายหลังสิ้นสุดโปรแกรม 4 สัปดาห์ ต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราในการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มและเป็นการแสดงถึงทางเลือกในการบำบัดที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราต่อไป

Independent Study Title Effect of the Group Empowerment Program on Alcohol Drinking Behaviors Among Persons with Alcohol Induced Psychotic Disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province

Author Mrs. Duangduean Netkrachang

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Lecturer Dr. Hunsu	Sethabouppha	Chairperson
Associate Professor Dr. Patcharaporn	Aree	Member

ABSTRACT

Alcohol induced psychotic disorder is an important problem that can have an effect on the person, family and society. People with alcohol induced psychotic disorders need help in managing their drinking behaviors. The Group Empowerment Program may be an effective therapy to manage their drinking behaviors.


The purpose of this research was to study the effect of the Group Empowerment Program on alcohol drinking behaviors among persons with alcohol induced psychotic disorders at Suanprung Psychiatric hospital, Chiang Mai province. Fifteen subjects were purposively selected following the study criteria from persons with alcohol induced psychotic disorders. The instruments used in this study were; 1) the Group Empowerment Program developed by Pennapa Sutakum and Hunsu Sethabouppha (2007) and 2) Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Descriptive statistics and Freidman Test were used for data analysis.

Results showed that:

1. After two-weeks of participating in the Group Empowerment Program, the scores of subjects' drinking behaviors were significantly lower than before participating in the program ($p < .05$).

2. Four-weeks after participating in the Group Empowerment Program, the scores of subjects' drinking behaviors were significantly lower than before participating in the program ($p < .05$).

The results of this study indicate that the Group Empowerment Program is effective in reducing alcohol drinking behaviors of persons with alcohol induced psychotic disorders. Enhancing the group empowerment capacity of nursing staff who care for persons with alcohol induced psychotic disorders would be extremely beneficial. Enhancing this capacity of nursing staff will contribute to appropriate effective alternative treatment for this group of people.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved