

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์มะเร็งลำปาง

ผู้เขียน

นางยุพา วงษ์มุล

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

อาจารย์ ดร. ทรรษา

เศรษฐบุผา

ประธานกรรมการ

อาจารย์ ขวัญพนมพร

ธรรมไทย

กรรมการ

บทคัดย่อ

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งผลกระทบจากการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ มีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาทางจิตใจที่สำคัญและพบบ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์มะเร็งลำปาง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2551 จำนวน 218 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบ็ค (BDI-1A) และ 3) แบบประเมินความคิดฆ่าตัวตายของเบ็คและคณะ (SSI) ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.83 และ 0.81 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติไค-สแควร์ (chi-square test)

ผลการศึกษาพบว่า

1) ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง (11.94%) ระดับมาก (28.35%) ระดับปานกลาง (17.91%) และระดับเล็กน้อย (41.80%) ทั้งนี้ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยแต่ละระยะโรคและในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่ละวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

2) ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในระดับสูง (0.92%) ระดับปานกลาง (2.75%) และระดับต่ำ (96.33%) ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละระยะโรคและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่ละวิธี มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้การช่วยเหลือ เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อไป



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved

**Independent Study Title** Depression and Suicidal Risk in Patients with Cervical Cancer at Lampang Cancer Center

**Author** Mrs. Yupa Wongmun

**Degree** Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

**Independent Study Advisory Committee**

Lecturer Dr. Hunsana	Sethabuppha	Chairperson
Lecturer Kwauphanomporn	Thummathai	Member

**ABSTRACT**

Cervical cancer remains a crucial health problem in Thailand. The effects of this cancer affect the patients physically, mentally and socially. Depression is a significant problem that these patients encounter and if the cases are not diagnosed or treated properly, this may lead to suicidal attempts. This descriptive study aimed to examine the degree of depression and suicidal ideation in cervical cancer patients. The population consisted of 218 cases of cervical cancer at Lampang cancer center from March to June, 2008. The study instrument was a questionnaire, which consisted of 3 parts: 1) Demographics data, 2) Beck Depression Inventory IA (BDI-IA), and 3) Scale of Suicide ideation of Beck (SSI). The reliability of instruments were obtained by Cronbach's alpha coefficient and were 0.83, 0.81 respectively. The data were analyzed by using descriptive statistics. These included frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square test.

The results revealed that:

1) The degrees of depression ranged from very severe depression (11.94%), severe depression (28.35%), moderate depression (17.91%), to mild depression (41.80%). The degrees of depression were statistically significantly related to clinical staging ( $p < .05$ ) and treatment methods ( $p < .05$ ).

2) The degrees of suicidal risk ranged from high (0.92%), moderate (2.75%), to mild (96.33%). The suicidal risk was not related to clinical staging and treatment methods.

The findings can be used as basic information for nurses to plan appropriate care and prevention programs for depression and suicide in cervical cancer patients.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved