

ชื่อเรื่อง **การค้นคว้าแบบอิสระ ประสิทธิภาพของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับ**

การป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก

โรงพยาบาลพังงา

ผู้เขียน **นางสาวธนกร กฤษณาพันธ์**

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. ยูพิน เพ็ชรมงคล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวี เบาทรวง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การตกเลือดหลังคลอดระยะแรก เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและการตายของมารดา ดังนั้นการดูแลมารดาที่สำคัญคือ การป้องกัน ไม่ให้เกิดการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกขึ้น การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบชนิดศึกษา ไปข้างหน้าแบบไม่ควบคุมก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาอายุครรภ์ครบกำหนดที่เข้ารับบริการคลอดทางช่องคลอด โรงพยาบาลพังงา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย มารดาที่ได้รับการดูแลตามปกติ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 จำนวน 98 คน และกลุ่มมารดาที่ได้รับการดูแล โดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 จำนวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการศึกษา คือ แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ของชญาฉวี กุณา พ.ศ. 2552 การดำเนินการศึกษาใช้กรอบแนวคิดการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้และการประเมินผลของสภาวะด้านการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (1999) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมผลลัพธ์ คือ แบบบันทึกการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก แบบบันทึกภาวะช็อคหลังคลอด และแบบบันทึกการได้รับเลือดทดแทนจากการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบฟิชเชอร์

ผลการศึกษาพบว่ามารดาหลังคลอดที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกมี
สัดส่วนการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก สัดส่วนภาวะซีดหลังคลอด และสัดส่วนการได้รับเลือด
ทดแทนหลังคลอดไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับมารดาหลังคลอดที่ได้รับการดูแลตามปกติ
ผลการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาซ้ำ โดยเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
และระยะเวลาในการศึกษาให้มากขึ้น



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines for Prevention of Early Postpartum Hemorrhage at Phang Nga Hospital

Author Miss Thanaporn Kritsanhaphan

Degree Master of Nursing Science (Advanced Midwifery)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr. Yupin Phianmongkhol Advisor


Associate Professor Dr. Chavee Baosoung Co-advisor

ABSTRACT

Early postpartum hemorrhage (PPH) is an important cause of morbidity and mortality among postpartum mothers. Therefore, prevention of early PPH is an important maternal care. This comparative, prospective, uncontrolled before and after intervention study was conducted to determine the effectiveness of implementing clinical practice guidelines (CPGs) for prevention of early PPH among term mother who gave births in the labor room at Phang Nga hospital. The study samples consisted of 98 mothers who received usual nursing care between February to March 2010 and 105 mothers who received care with implementing CPGs between April to May 2010. The instrument was the CPGs for prevention of early PPH by Chayanit Kuna (2009). A guide to the implementation and evaluation of the CPGs of Australian National Health and Medical Research Council (1999) was applied as a framework for this study. Data collection tools consisted of the early PPH record form, the postpartum anemia record form and the postpartum blood transfusion record form. Data were analyzed by using descriptive statistics and Fisher's exact probability test.

The results of this study revealed that the postpartum mothers in the CPGs implementing group had no significant differences in proportion of early PPH, postpartum anemia, and postpartum blood transfusion when compared with the postpartum mothers who received usual nursing care.

The results of this study indicate that the further research should be replicated in a larger sample size will longer duration.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved