

**ข้อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ**

ผู้เขียน

ปริญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

การพัฒนากล่องเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็น

โรคจิตเภท โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

นางน้ำตาล แย้มทอง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

รองศาสตราจารย์ ดร. กัதราภรณ์ ทุ่งปันคำ

**บทคัดย่อ**

การส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิตเภทมีความร่วมมือในการรักษาด้วยยา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการลดอัตราการกลับเป็นซ้ำ การศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากล่องเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็น โรคจิตเภทตามแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ซึ่งมีทั้งหมด 10 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่เป็น โรคจิตเภทจำนวน 5 ราย และกลุ่มผู้คุ้ดแลผู้ที่เป็น โรคจิตเภท จำนวน 5 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ 2) แบบบันทึกการรับประทานยา สำหรับผู้คุ้ดแลผู้ที่เป็น โรคจิตเภท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า กล่องเตือนการรับประทานยา มีลักษณะเป็นกล่องบรรจุยาที่มีเสียง เตือนเมื่อถึงเวลา.rับประทานยา ข้อมูลการรับประทานยาถูกบันทึกไว้และนำมาประมวลผลโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในแต่ละเดือน ภายหลังการใช้กล่องเตือนการรับประทานยา ค่าเฉลี่ยร้อยละ ของ การรับประทานยาตรงเวลาของผู้ที่เป็น โรคจิตเภทเท่ากับร้อยละ 87.09 ของการรับประทานยา ในหนึ่งเดือน และความพึงพอใจในการใช้กล่องเตือนการรับประทานยาอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากล่องเตือนการรับประทานยา สามารถใช้เตือน การรับประทานยาของผู้ที่เป็น โรคจิตเภทให้ตรงเวลาได้ ซึ่งพยาบาลสามารถนำกล่องเตือน การรับประทานยาไปใช้ในการส่งเสริมการรับประทานยาให้ตรงเวลาของผู้ที่เป็น โรคจิตเภทต่อไป

<b>Independent Study Title</b>	Development of a Medication-Reminder Box Among Persons with Schizophrenia, Thapkhlo Hospital, Phichit Province
<b>Author</b>	Mrs. Nataya Yeamthong
<b>Degree</b>	Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)
<b>Independent Study Advisor</b>	Associate Professor Dr. Patraporn Tungpunkom

### ABSTRACT

Enhancing medication adherence for patients with schizophrenia is vital in decreasing the relapse rate. This developmental research aimed to develop medication-reminder box for the persons with schizophrenia based on the innovation development process of the Thai Red Cross College of Nursing. These processes included 10 steps. The sample included two groups: five patients with schizophrenia and five caregivers. The research instruments consisted of 1) personal data form and 2) medication recording form. Data were analyzed by descriptive statistics.

The results revealed that the components of medication-reminder box consisted of medicine box with reminder sound that alarmed at medicine-taking times. In addition, the medicine-taking data were recorded and processed by computer software in each month. After using the medication-reminder box one month, the average percentage of taking medication on time among persons with schizophrenia was 87.09 and satisfaction of using medication-reminder box was at high level.

The results of this study indicate that the medication-reminder box to is able to remind persons with schizophrenia to take medicine right time. Nurses can use this medication-reminder box to promote the on time medication taking among persons with schizophrenia.