

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา
โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก

ผู้เขียน นางบุษยา พิพัฒน์ศาสตร์

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
อาจารย์ ดร. ھرรษา เศรษฐบุปผา

บทคัดย่อ

การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราในโรงพยาบาลบ้านตากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และกลับไปเสพยาซ้ำสูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลบ้านตาก ตามแนวคิดของโดนาบีเดียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ โครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ ของการดูแล กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ที่เป็นโรคติดสุรา 10 คน 2) ญาติหรือผู้ดูแล 10 คน 3) แคนนำชุมชน 10 คน และ 4) บุคลากรทีมสุขภาพ 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมิน ปัญหาจากการใช้สุรา 3) แบบสอบถามการรับรู้การดูแล และ 4) แนวคำถามในการสัมภาษณ์รายบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2553 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำมาจัดหมวดหมู่

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

ด้านโครงสร้างพบว่า 1) มีนโยบายและแผนงานการดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา ภายใต้นโยบายรวมด้านการดูแลรักษาผู้ติดสารเสพติด 2) งบประมาณไม่เพียงพอ 3) อัตรากำลังไม่เพียงพอ 4) มีแนวปฏิบัติการดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา 5) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์เพียงพอ และ 6) สถานที่ให้การปรึกษายังไม่เหมาะสม

ด้านกระบวนการ

การดูแลของทีมสุขภาพพบว่า 1) มีการค้นหาคัดกรองแต่ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยทุกราย 2) มีการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ 3) มีการบำบัดฟื้นฟูสภาพ และ 4) มีกระบวนการส่งต่อและติดตาม แต่ยังไม่ครอบคลุมผู้ที่เป็โรคติดเชื้อทุกคน

การดูแลของญาติหรือผู้ดูแลพบว่า 1) มีการดูแลด้านร่างกายเหมาะสม 2) มีการดูแลด้านจิตใจน้อย และ 3) มีการให้คำแนะนำที่เหมาะสม

การดูแลของแกนนำชุมชนพบว่า 1) ให้การดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำน้อย และ 2) ไม่ตระหนักว่าโรคติดเชื้อเป็นปัญหาของชุมชน

ด้านผลลัพธ์หลังเข้ารับบริการพบว่า 1) ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเป็นโรคติดเชื้อ 2) ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุราเพียงเล็กน้อย 3) ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อมีการรับรู้การดูแลอยู่ในระดับดีมาก และ 4) ญาติหรือผู้ดูแลมีการรับรู้การดูแลอยู่ในระดับดี

ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการดูแลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Independent Study Title Situational Analysis of Caring for Persons with Alcohol Dependence,
Bantak Hospital, Tak Province

Author Mrs. Butsaya Pipatsart

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisor
Lecturer Dr. Hunsra Sethabouppha

ABSTRACT

Care for persons with alcohol dependence (PAD) receiving service at Bantak hospital has been implemented continuously; however, the number in this group and incidences of repeated drinking have increased. This study aimed to analyze the situation of caring for PAD in Bantak hospital, Tak province. The analysis was based on Donabedian's concept, which is comprised of 3 components: structure, process and outcome. The samples were purposively selected and consisted of 4 groups: 1) ten PAD, 2) ten relatives or caregivers, 3) ten community leaders, and 4) ten health care personnel. The instruments used for data collection were: 1) a demographic data questionnaire, 2) the Alcohol Use Disorders Identification Test, 3) Perception of Care Scale, and 4) individual interview guidelines. Data were obtained between July and August, 2010 and were analyzed using descriptive statistics. Data from interviews were categorized.

Results of the study are as follows:

For structural aspect: The study found that the hospital had: 1) policy and plan in caring for PAD under those for persons with drug addiction, 2) insufficient budgets, 3) insufficient health care personnel, 4) practice guidelines for PAD, 5) sufficient equipment, medical material and medical supplies, and 6) inappropriate place for counselling.

For process aspect: The study found that the caring process of health care personnel included: 1) having screening for PAD but never covered all patients, 2) having multidisciplinary team caring, 3) having rehabilitation process, and 4) having referral and monitoring process but not full coverage for all PAD.

The caring process of relatives and caregivers included: 1) providing proper physical care, 2) providing little mental support, and 3) giving proper advice.

The caring process of community leaders included: 1) providing little support and advice, and 2) not being aware that alcohol dependence is a community problem.

For outcome aspect: The study found that after receiving care: 1) the PAD did not change their knowledge about causes of alcohol dependence, 2) the PAD slightly changed their behaviors towards alcohol drinking, 3) the PAD perceived that they received care at a very good level, and 4) the caregivers perceived care at a good level.

The results of this study could be used as basic information for the development of effective and appropriate quality of care for persons with alcohol dependence regarding structure, process and outcome.