

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ประสิทธิภาพของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา
 โรงพยาบาลอุดรดิตต์

ผู้เขียน นางสาวณัฐพร ใจคุ้ม

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
 อาจารย์ ดร.हरรรษา เศรษฐบุปผา
 บทคัดย่อ

การดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลอาจช่วยให้ผู้ป่วยโรคติดสุรามีทักษะในการจัดการกับ พฤติกรรมการดื่มและลดการกลับมารักษาซ้ำภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลได้ วัตถุประสงค์ของ การศึกษาในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาล อุดรดิตต์ ผู้เข้าร่วมการศึกษาประกอบด้วย ผู้ป่วย โรคติดสุราที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอุดรดิตต์ จำนวน 30 คน ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคติดสุรา จำนวน 30 คน และบุคลากร ทีมสหวิชาชีพ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย โรคติดสุรา ญาติผู้ดูแล และบุคลากรทีมสหวิชาชีพ 2) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วย โรคติดสุรา ญาติผู้ดูแล และบุคลากรทีมสหวิชาชีพต่อแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา 3) แบบบันทึก ข้อมูลการกลับมารักษาซ้ำ 4) แบบประเมินอาการถอนพิษสุรา (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised Version [CIWA-Ar]) 5) แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Identification Test [AUDIT]) และ 6) แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุราที่พัฒนาโดย พิมพวิภา เจนกจิจาไพบุลย์ (2553) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษา มีดังต่อไปนี้

1. หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน ร้อยละ 97 ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ได้รับ การดูแลโดยใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีพฤติกรรมลดการสัมผัสสาธารณะ
2. ร้อยละ 3 ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ได้รับการดูแลโดยใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีการกลับมารับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน
3. ร้อยละ 73 ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามีความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลตามแผน จำหน่ายผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระดับปานกลาง
4. ร้อยละ 73 ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามีความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลตาม แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในระดับปานกลาง
5. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทีมสหวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในระดับมาก

ผลการศึกษาครั้งนี้ยืนยันถึงประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน โรงพยาบาล อุดรดิตถ์ ดังนั้นควรมีการนำแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปใช้ต่อไปในการดูแล ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงพยาบาล

Independent Study Title	Effectiveness of Implementing a Discharge Plan for Patients with Alcohol Dependence, Uttaradit Hospital
Author	Miss Nanatthaporn Jaikhom
Degree	Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)
Independent Study Advisor	Lecturer Dr. Hunsra Sethabouppha

ABSTRACT

Caring appropriately for patients with alcohol dependence (PAD) from their admission to discharge could enable the patients to be skillful in managing their drinking behaviors and reduce readmission rates. The purpose of this operational was to study the effectiveness of implementing a discharge plan for PAD, Uttaradit Hospital. The samples were 30 PAD, 30 PAD's family caregivers, and 10 multidisciplinary team personnel. The instruments used were 1) the demographic data from for PAD, the PAD's family caregivers, and care team personnel, 2) the satisfaction questionnaire toward discharge plan for PAD, the PAD's family caregivers, and care team personnel, 3) the re-admission recording form, 4) The Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised Version (CIWA-Ar), 5) The Alcohol Use Disorder Identification Test form (AUDIT), and 6) the discharge plan developed by Jenkitjaphiboon (2010). Data were analyzed using descriptive statistics.

The results demonstrated that:

1. Ninety seven percent of the PAD who received services based on a discharge plan had decreased their drinking behaviors after 1 month of discharge from hospital.
2. Three percent of the PAD who received services based on a discharge plan were readmitted within 28 days.
3. Seventy three percent of the PAD were satisfied with received services based on the discharge plan at a moderate level.
4. Seventy three percent of PAD's family caregivers were satisfied with received services based on the discharge plan at a moderate level.
5. All (100%) of multidisciplinary team personnel were satisfied with use of discharge plan at a high level.

The findings of this study confirmed the effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol dependence, Uttaradit Hospital. This discharge plan should be used for patients with alcohol dependence in hospital.