ชื่อเรื่องการค้นคว**้า**แบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ การเครียมแป้งเสริมรูป

**ชื่อนี้เลียท** 

นายประสิทธิ์ ทองเพียรพงษ์

วิทยาศาสทรมหาบัณฑิต สาขาการสอน เคมี

กณะกรรมการทรวจสอบการค้นควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

ผส.คร.ครง พุธศุกร์ ประชานกรรมการ
 รศ.คร.ไพโรจน์ พจนการุณ กรรมการ
 อ.คร.คำรัส ทรัพย์เย็น กรรมการ

## บหลักยอ

ไก้เครียมแป้งเสริมรูปจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียวแล้วศึกษาหา
ความหนีคของสารละลายของแป้งเสริมรูปทั้งสองเปรียบเทียบกับแป้งขรรมชาติ พบว่า
ความหนีคของสารละลายแป้งเสริมรูปมันสาปะหลังจะคงหนฅ่อความร้อน และความเป็น
กรก-เบส ได้ดีกวาแป้งมันสำปะหลังตามชรรมชาติมาก ส่วนสารละลายแป้งเสริมรูป
ข้าวเหนียว ชบบิคของความหนีคเป็นพังก์ชันของอุพหภูมิจะไม่แคกค่างจากสารละลาย
แป้งข้าวเหนียวตามชรรมชาติมากนัก และความหนีคของสารละลายแป้งเสริมรูปข้าว
เหนียวจะคงหนฅอความเป็นกรก-เบส ได้เบื้อยโดยเฉพาะที่ ph 2, ph 10 และ ph 11

nt<sup>©</sup> by Chiang Mai Universi

rights reser

Research Title Preparation of Cross-linked Starches

Author

Mr.Prasit Tongpienpong

M.S.

Teaching Chemistry

Examining Committee Assist.Prof.Dr.Duang

Buddhasukh Chairman

Assoc.Prof.Dr.Pairoje

Pojanagaroon Mem

Member

Lecturer Dr. Damrat

Supyen

Member

## Abstract

Crosslinked starches were prepared from tapioca and waxy rice starch and the viscosities of both crosslinked starch solutions were studied in comparison with corresponding natural starch solutions. It was found that the viscosities of the tapioca crosslinked starch solutions had considerably more thermal and acid-base stabilities than those of the natural tapioca starch solutions. As for the crosslinked waxy starch, the viscosity property of its solution as a function of temperature was not distinctly different from that of its natural analog, and the viscosity of the crosslinked waxy rice starch solution had less acid-base stabilities especially at pH 2, 10 and 11.