



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ภาคผนวก ก

ตารางแสดงลักษณะข้อมูลโดยทั่วไปของประชากรที่ศึกษา

ตาราง 1 ก เพศผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	เพศชาย				เพศหญิง		รวม	
	จำนวน		ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยสูบบุหรี่	85	14.17	239	39.83	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	31	5.17	1	0.17	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	118	19.67	-	-	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	33	5.50	-	-	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	39	6.50	3	0.50	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	26	4.33	1	0.17	27	4.50		
รวม	356	59.33	244	40.67	600	100.00		

หมายเหตุ : สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย หากได้ชักทำ "pack-years" โดยค่า "pack-years" หากได้โดยนำจำนวนปีที่ผู้ป่วยเคยสูบบุหรี่ คูณด้วยจำนวนบุหรี่ (ซอง, โดย 1 ซอง = 20 มวน) ที่ผู้ป่วยสูบเฉลี่ยต่อวัน

ถ้าค่า pack-years มากกว่าหรือเท่ากับ 15 แสดงว่า ผู้ป่วยสูบบุหรี่จัด แต่ถ้าค่า pack-years น้อยกว่า 15 แสดงว่า ผู้ป่วยสูบบุหรี่ไม่จัด ส่วนกรณีที่ไม่ได้จัด ส่วนกรณีที่ไม่ได้จัดคือผู้ที่ไม่ได้จัด

ถ้าเลิกสูบบุหรี่มากกว่าหรือ เท่ากับ 15 ปี แสดงว่า เลิกสูบบุหรี่มาแล้ว แต่ยังไม่เลิกสูบบุหรี่แล้ว แต่เลิกสูบบุหรี่น้อยกว่า 15 ปี แสดงว่า เพิ่งเลิกสูบบุหรี่

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 2 ก อายุผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	อายุผู้ป่วย										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีช่องทาง	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	324	54.00	324	54.00	18	95	61	59.88	0.76	13.67	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	32	5.33	32	5.33	24	82	64	61.41	2.53	14.29	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	24	4.00	25	72	47	50.33	2.67	13.06	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	118	19.67	118	19.67	30	88	64	62.89	1.08	11.77	
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	33	5.50	33	5.50	32	85	69	67.76	2.14	12.31	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	42	7.00	42	7.00	22	76	61	54.55	2.13	13.83	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	27	4.50	27	4.50	46	95	67	68.52	2.34	12.17	
รวม	600	100.00	600	100.00	18	95	62	60.62	0.56	13.65	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 3 ก อายุผู้ป่วยที่จัดเป็น 3 กลุ่มแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	กลุ่มอายุผู้ป่วย						รวม	
	อายุ 18-34 ปี		อายุ 35-64 ปี		อายุ 65 ปีขึ้นไป		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญพันธุ์	16	2.67	180	30.00	128	21.33	324	54.00
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	2	0.33	14	2.33	16	2.67	32	5.33
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	2	0.33	20	3.33	2	0.33	24	4.00
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	3	0.50	62	10.33	53	8.83	118	19.67
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	1	0.17	10	1.67	22	3.67	33	5.50
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	4	0.67	26	4.33	12	2.00	42	7.00
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	-	-	9	1.50	18	3.00	27	4.50
รวม	28	4.67	321	53.50	251	41.83	600	100.00

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 4 ก อชีพของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	อชีพผู้ป่วย											
	คำขยหรือขอร้องถึงส่วนตัว		พนักงานบริษัทเอกชน		ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร		เกษียณอายุ		ว่างงาน, กำลังหางาน			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูบบุหรี่	12	5.50	1	0.46	1	0.46	7	3.21	3	1.38		
สูบบุหรี่จัด ในปัจจุบัน	-	-	2	0.92	-	-	4	1.83	-	-		
สูบบุหรี่ไม่จัด ในปัจจุบัน	1	0.46	-	-	1	0.46	1	0.46	1	0.46		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	4	1.83	1	0.46	3	1.38	5	2.29	2	0.92		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	2	0.92	-	-	-	-	6	2.75	2	0.92		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	2	0.92	-	-	-	-	1	0.46	1	0.46		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	2	0.92	-	-	-	-	2	0.92	2	0.92		
รวม	23	10.55	4	1.83	5	2.29	26	11.93	11	5.05		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 4 ก (ต่อ) อชีพของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	อชีพผู้ป่วย												รวม	
	ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ		เกษตรกร, ไร่ข้าง		แม่บ้าน		พระสงฆ์		อาสาสมัคร		จำนวน	ร้อยละ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	5	2.29	54	24.77	21	9.63	-	-	1	0.46	105	48.17		
สูบบุหรี่จัด ในปัจจุบัน	-	-	8	3.67	-	-	2	0.92	-	-	16	7.34		
สูบบุหรี่ไม่จัด ในปัจจุบัน	-	-	9	4.13	-	-	1	0.46	-	-	14	6.42		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	5	2.29	15	6.88	-	-	7	3.21	-	-	42	19.27		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	1	0.46	2	0.92	-	-	-	-	-	-	13	5.96		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	-	-	11	5.05	1	0.46	3	1.38	-	-	19	8.72		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	-	-	3	1.38	-	-	-	-	-	-	9	4.13		
รวม	11	5.05	102	46.79	22	10.09	13	5.96	1	0.46	218	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 5 ก ระดับการศึกษาของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ระดับการศึกษาผู้ป่วย									
	ไม่ได้เรียนหนังสือ		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		อาชีวศึกษา			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยสูญพันธุ์	37	6.17	233	38.83	43	7.17	1	0.17		
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	4	0.67	22	3.67	4	0.67	-	-		
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	-	-	17	2.83	3	0.50	3	0.50		
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	9	1.50	83	13.83	16	2.67	5	0.83		
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	2	0.33	23	3.83	3	0.50	-	-		
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	2	0.33	34	5.67	5	0.83	1	0.17		
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	3	0.50	20	3.33	3	0.50	-	-		
รวม	57	9.50	432	72.00	77	12.83	10	1.67		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 5 ก (ต่อ) ระดับการศึกษาของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ระดับการศึกษาผู้ป่วย										รวม	
	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า		ปริญญาโทหรือสูงกว่า		วิชาชีพอื่นๆ		ปริญญารวม				ร้อยละ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน			
ไม่เคยสูญพันธุ์	4	0.67	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-	324	54.00
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17			32	5.33
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	1	0.17	-	-	-	-	-	-			24	4.00
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33			118	19.67
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17			33	5.50
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	-	-	-	-	-	-	-	-			42	7.00
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	-	-	1	0.17	-	-	-	-			27	4.50
รวม	13	2.17	4	0.67	3	0.50	4	0.67			600	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 6 ก ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูญพันธุ์

สภาวะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ผู้ป่วย										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	76	51.70	324	54.00	8	84	49	46.61	1.49	12.98	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	9	6.12	32	5.33	35	84	49	53.67	5.83	17.50	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	11	7.48	24	4.00	28	70	56	50.00	3.91	12.95	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	27	18.37	118	19.67	28	70	48	47.89	1.99	10.33	
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	5	3.40	33	5.50	40	70	50	54.40	6.58	14.72	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	14	9.52	42	7.00	21	70	42	45.79	4.14	15.47	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	5	3.40	27	4.50	28	70	42	43.20	7.76	17.36	
รวม	147	100.00	600	100.00	8	84	48	47.60	1.09	13.24	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 7 ก ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของผู้ป่วยที่จัดเป็น 6 กลุ่มแยกตามสภาวะการสูญพันธุ์

สภาวะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	กลุ่มชั่วโมงทำงานเฉลี่ยผู้ป่วย												รวม	
	ไม่ได้ทำงาน		น้อยกว่า 20 ชั่วโมง		21-40 ชั่วโมง		41-60 ชั่วโมง		61-80 ชั่วโมง		81 ชั่วโมงขึ้นไป		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญพันธุ์	248	41.33	1	0.17	24	4.00	40	6.67	10	1.67	1	0.17	324	54.00
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	23	3.83	-	-	2	0.33	4	0.67	2	0.33	1	0.17	32	5.33
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	13	2.17	-	-	2	0.33	7	1.17	2	0.33	-	-	24	4.00
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	91	15.17	-	-	8	1.33	17	2.83	2	0.33	-	-	118	19.67
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	28	4.67	-	-	1	0.17	2	0.33	2	0.33	-	-	33	5.50
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	28	4.67	-	-	5	0.83	6	1.00	3	0.50	-	-	42	7.00
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	22	3.67	-	-	2	0.33	2	0.33	1	0.17	-	-	27	4.50
รวม	453	75.50	1	0.17	44	7.33	78	13.00	22	3.67	2	0.33	600	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 8 ก รายได้ในปัจจุบันของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	รายได้ในปัจจุบันของผู้ป่วยต่อเดือน										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	52	52.00	324	54.00	200	30,000	5,000	7,274.35	932.12	6,721.59	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	5	5.00	32	5.33	3,000	6,600	5,000	4,736.40	754.43	1,686.96	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	6	6.00	24	4.00	833	15,000	6,000	6,638.83	2,091.64	5,123.46	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพ็งเล็ก	20	20.00	118	19.67	833	25,000	4,500	7,401.00	1,488.72	6,657.77	
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	6	6.00	33	5.50	3,000	30,000	15,000	16,083.33	4,247.38	10,403.93	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพ็งเล็ก	6	6.00	42	7.00	3,000	9,000	4,750	5,616.67	1,113.68	2,727.94	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	5	5.00	27	4.50	800	120,000	6,000	28,374.80	22,966.96	51,355.69	
รวม	100	100.00	600	100.00	200	120,000	5,000	8,618.75	1,309.62	13,096.17	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 9 ก รายได้ในปัจจุบันของผู้ป่วยที่จัดเป็น 8 กลุ่มแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	กลุ่มรายได้ในปัจจุบันผู้ป่วย									
	ไม่มีรายได้		น้อยกว่า 5,000 บาท		5,001-10,000 บาท		10,001-15,000 บาท			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยสูญพันธุ์	272	45.33	28	4.67	12	2.00	6	1.00		
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	27	4.50	3	0.50	2	0.33	-	-		
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	18	3.00	3	0.50	2	0.33	1	0.17		
เคยสูญพันธุ์จัดและเพ็งเล็ก	98	16.33	12	2.00	3	0.50	1	0.17		
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	27	4.50	1	0.17	1	0.17	1	0.17		
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพ็งเล็ก	36	6.00	4	0.67	2	0.33	-	-		
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	22	3.67	2	0.33	1	0.17	1	0.17		
รวม	500	83.33	53	8.83	23	3.83	10	1.67		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 9 ก (ต่อ) รายได้ในปัจจุบันของผู้จัดเป็น 8 กลุ่มแยกตามสภาวะการสูญบุหรื

สภาวะการสูญบุหรืของผู้ป่วย	กลุ่มรายได้ปัจจุบันผู้ป่วย												รวม	
	15,001-20,000 บาท			20,001-25,000 บาท			25,001-30,000 บาท			30,001 บาทขึ้นไป			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูญบุหรื	4	0.67	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	324	54.00	
สูญบุหรืจัดในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	5.33	
สูญบุหรืไม่จัดในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.00	
เคยสูญบุหรืจัดและเพิ่งเลิก	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	118	19.67	
เคยสูญบุหรืจัดและเลิกมานาน	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	33	5.50	
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	7.00	
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.17	27	4.50	
รวม	8	1.33	1	0.17	4	0.67	1	0.17	1	0.17	600	100.00		

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 10 ก รายได้ในปัจจุบันของครัวเรือนผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูญบุหรื

สภาวะการสูญบุหรืของผู้ป่วย	รายได้ในปัจจุบันของครัวเรือนผู้ป่วยต่อเดือน											
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	รวม	
											จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยสูญบุหรื	323	55.40	324	54.00	200	100,000	6,000	8,927.32	548.57	9,858.93	จำนวน	ร้อยละ
สูญบุหรืจัดในปัจจุบัน	29	4.97	32	5.33	300	40,000	10,000	1,1237.31	1,792.94	9,655.30	จำนวน	ร้อยละ
สูญบุหรืไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.12	24	4.00	833	40,000	7,500	10,604.17	2,077.18	10,176.09	จำนวน	ร้อยละ
เคยสูญบุหรืจัดและเพิ่งเลิก	110	18.87	118	19.67	833	120,000	8,000	9,668.65	1,172.69	12,299.31	จำนวน	ร้อยละ
เคยสูญบุหรืจัดและเลิกมานาน	32	5.49	33	5.50	1,667	50,000	10,000	14,739.59	2,072.43	11,723.42	จำนวน	ร้อยละ
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเพิ่งเลิก	38	6.52	42	7.00	1,000	30,000	5,000	7,625.89	1,129.27	6,961.28	จำนวน	ร้อยละ
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.63	27	4.50	1,800	25,000	6,000	8,738.52	1,299.57	6,752.76	จำนวน	ร้อยละ
รวม	583	100.00	600	100.00	200	120,000	7,000	9,476.58	424.94	10,260.44	จำนวน	ร้อยละ

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 11 ก รายได้ในปัจจุบันของครัวเรือนผู้สูงอายุที่จัดเป็น 8 กลุ่มแยกตามสถานะการอุปการะ

สถานะการอุปการะของผู้สูงอายุ	กลุ่มรายได้ครัวเรือนผู้สูงอายุ									
	ไม่มีรายได้		น้อยกว่า 5,000 บาท		5,001-10,000 บาท		10,001-15,000 บาท			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคຍอุปการะ	1	0.17	150	25.00	96	16.00	32	5.33		
อุปการะจัดในปัจจุบัน	3	0.50	9	1.50	12	2.00	1	0.17		
อุปการะไม่จัดในปัจจุบัน	-	-	9	1.50	8	1.33	2	0.33		
เคຍอุปการะจัดและเพิ่งเลิก	8	1.33	38	6.33	43	7.17	16	2.67		
เคຍอุปการะจัดและเลิกมานาน	1	0.17	6	1.00	11	1.83	4	0.67		
เคຍอุปการะไม่จัดและเพิ่งเลิก	4	0.67	20	3.33	11	1.83	2	0.33		
เคຍอุปการะไม่จัดและเลิกมานาน	-	-	13	2.17	6	1.00	3	0.50		
รวม	17	2.83	245	40.83	187	31.17	60	10.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 11 ก (ต่อ) รายได้ในปัจจุบันของครัวเรือนผู้สูงอายุที่จัดเป็น 8 กลุ่มแยกตามสถานะการอุปการะ

สถานะการอุปการะของผู้สูงอายุ	กลุ่มรายได้ครัวเรือนผู้สูงอายุ										รวม	
	15,001-20,000 บาท		20,001-25,000 บาท		25,001-30,000 บาท		30,001 บาทขึ้นไป				จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคຍอุปการะ	22	3.67	-	-	17	2.83	6	1.00	324	54.00		
อุปการะจัดในปัจจุบัน	4	0.67	-	-	2	0.33	1	0.17	32	5.33		
อุปการะไม่จัดในปัจจุบัน	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	24	4.00		
เคຍอุปการะจัดและเพิ่งเลิก	7	1.17	2	0.33	3	0.50	1	0.17	118	19.67		
เคຍอุปการะจัดและเลิกมานาน	4	0.67	1	0.17	4	0.67	2	0.33	33	5.50		
เคຍอุปการะไม่จัดและเพิ่งเลิก	3	0.50	1	0.17	1	0.17	-	-	42	7.00		
เคຍอุปการะไม่จัดและเลิกมานาน	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	27	4.50		
รวม	47	7.83	5	.83	27	4.50	12	2.00	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 12 ก สถานภาพสมรสของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	สถานภาพสมรสผู้ป่วย												รวม	
	โสด		หย่า		เป็นหม้าย		แต่งงานแล้ว		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ						
ไม่เคยสูบบุหรี่	16	2.67	1	0.17	3	0.50	304	50.67	324	54.00				
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	2	0.33	-	-	-	-	30	5.00	32	5.33				
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	1	0.17	-	-	-	-	23	3.83	24	4.00				
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	3	0.50	-	-	-	-	115	19.17	118	19.67				
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	1	0.17	-	-	-	-	32	5.33	33	5.50				
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	4	0.67	-	-	-	-	38	6.33	42	7.00				
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	1	0.17	-	-	-	-	26	4.33	27	4.50				
รวม	28	4.67	1	0.17	3	0.50	568	94.67	600	100.00				

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 13 ก จำนวนบุตรริดาของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนบุตรริดาผู้ป่วย											
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยสูบบุหรี่	303	53.53	324	54.00	1	12	4	4.08	0.12	2.09		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	31	5.48	32	5.33	2	11	4	4.61	0.41	2.30		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	23	4.06	24	4.00	1	8	3	3.30	0.39	1.89		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	114	20.14	118	19.67	1	11	4	4.31	0.22	2.32		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	31	5.48	33	5.50	1	8	4	4.35	0.35	1.98		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	37	6.54	42	7.00	1	7	3	3.54	0.29	1.74		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.77	27	4.50	1	9	4	4.93	0.43	2.23		
รวม	566	100.00	600	100.00	1	12	4	4.14	0.09	2.14		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 14 ก จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูญบุหรื

สถานะการสูญบุหรืของผู้ป่วย	จำนวนสมาชิกในครัวเรือนผู้ป่วย									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีฐานะ	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เคยสูญบุหรื	324	54.00	324	54.00	1	20	4	4.46	0.11	1.97
สูญบุหรืจัดในปัจจุบัน	32	5.33	32	5.33	1	9	5	4.69	0.40	2.26
สูญบุหรืไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	24	4.00	2	6	4	4.54	0.26	1.28
เคยสูญบุหรืจัดและเพิ่งเลิก	118	19.67	118	19.67	2	9	5	4.51	0.15	1.58
เคยสูญบุหรืจัดและเลิกมานาน	33	5.50	33	5.50	2	8	5	5.06	0.32	1.84
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเพิ่งเลิก	42	7.00	42	7.00	2	9	4	4.21	0.24	1.59
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	27	4.50	1	8	4	4.11	0.33	1.72
รวม	600	100.00	600	100.00	1	20	4	4.48	0.08	1.85

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 15 ก การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูญบุหรื

สถานะการสูญบุหรืของผู้ป่วย	การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยผู้ป่วย						รวม	
	ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง			มีบ้านเป็นของตัวเอง			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญบุหรื	61	10.17	263	43.83	324	54.00		
สูญบุหรืจัดในปัจจุบัน	6	1.00	26	4.33	32	5.33		
สูญบุหรืไม่จัดในปัจจุบัน	5	0.83	19	3.17	24	4.00		
เคยสูญบุหรืจัดและเพิ่งเลิก	17	2.83	101	16.83	118	19.67		
เคยสูญบุหรืจัดและเลิกมานาน	4	0.67	29	4.83	33	5.50		
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเพิ่งเลิก	13	2.17	29	4.83	42	7.00		
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเลิกมานาน	1	0.17	26	4.33	27	4.50		
รวม	107	17.83	493	82.17	600	100.00		

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 16 ก เขตชุมชนที่ผู้ป่วยอยู่แยกตามสภาวะการสูญพันธุ์

สภาวะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	เขตชุมชนที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย						รวม	
	อยู่นอกเขตเทศบาล		อยู่ในเขตเทศบาล		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูญพันธุ์	255	42.50	69	11.50	324	54.00		
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	22	3.67	10	1.67	32	5.33		
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	16	2.67	8	1.33	24	4.00		
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	92	15.33	26	4.33	118	19.67		
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	18	3.00	15	2.50	33	5.50		
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	34	5.67	8	1.33	42	7.00		
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	22	3.67	5	0.83	27	4.50		
รวม	459	76.50	141	23.50	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 17 ก ศาสนาที่ผู้ป่วยนับถือแยกตามสภาวะการสูญพันธุ์

สภาวะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ศาสนาที่ผู้ป่วยนับถือ				รวม	
	พุทธ		อิสลาม		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ผู้ป่วยไม่เคยสูญพันธุ์	324	54.00	-	-	324	54.00
ผู้ป่วยสูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	32	5.33
ผู้ป่วยสูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00
ผู้ป่วยเคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	117	19.50	1	0.17	118	19.67
ผู้ป่วยเคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	33	5.50	-	-	33	5.50
ผู้ป่วยเคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	42	7.00	-	-	42	7.00
ผู้ป่วยเคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	-	-	27	4.50
รวม	599	99.83	1	0.17	600	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 18 ก จำนวนปีที่ผู้ช่วยเคยสอบผู้บริหารสถานศึกษา

สถานะการสอบของผู้ช่วย	จำนวนปีที่ผู้ช่วยสอบผู้บริหาร										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยมศึกษา	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
สอบหรือจัดในปีปัจจุบัน	32	11.59	32	5.33	15	65	49	44.66	2.59	14.67	
สอบหรือจัดในปีก่อน	24	8.70	24	4.00	7	50	32	32.92	2.76	13.54	
เคยสอบหรือจัดแต่เพียงเด็ก	118	42.75	118	19.67	15	67	42	41.33	1.08	11.69	
เคยสอบหรือจัดแต่เด็กมานาน	33	11.96	33	5.50	12	50	30	30.58	1.71	9.80	
เคยสอบหรือจัดแต่เพียงเด็ก	42	15.22	42	7.00	5	60	30	30.36	2.05	13.29	
เคยสอบหรือจัดแต่เด็กมานาน	27	9.78	27	4.50	7	60	30	30.30	2.55	13.24	
รวม	276	100.00	600	100.00	5	67	40	36.95	0.82	13.58	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 19 ก จำนวนปีที่ผู้ช่วยได้เคยสอบผู้บริหารสถานศึกษา

สถานะการสอบของผู้ช่วย	จำนวนปีที่ผู้ช่วยได้เคยสอบผู้บริหาร										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยมศึกษา	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เคยสอบหรือจัดแต่เพียงเด็ก	118	53.64	118	19.67	1	14	4	4.95	.35	3.75	
เคยสอบหรือจัดแต่เด็กมานาน	33	15.00	33	5.50	15	40	20	22.15	1.23	7.07	
เคยสอบหรือจัดแต่เพียงเด็ก	42	19.09	42	7.00	1	14	3	4.43	0.62	4.03	
เคยสอบหรือจัดแต่เด็กมานาน	27	12.27	27	4.50	15	43	20	21.63	1.24	6.44	
รวม	220	100.00	600	100.00	1	43	6	9.48	0.61	9.01	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 20 ก. สาเหตุที่ผู้ป่วยเด็กสุขภาพดีตามสภาวะการสุขภาพ

สภาวะการสุขภาพของผู้ป่วย	สาเหตุที่ผู้ป่วยเด็กสุขภาพดี												รวม	
	เด็กเอง		รู้โทษจากการสุขภาพดี		หมอห้ามไม่ให้สูบ		ครอบครัวบอกให้เลิก		เลิกเฉยๆ		จำนวน	ร้อยละ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	63	28.64	3	1.36	43	19.55	9	4.09	-	-	118	53.64		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	19	8.64	3	1.36	6	2.73	2	0.91	3	1.36	33	15.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	16	7.27	1	0.45	22	10.00	1	0.45	2	0.91	42	19.09		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	16	7.27	2	0.91	3	1.36	1	0.45	5	2.27	27	12.27		
รวม	114	51.82	9	4.09	74	33.64	13	5.91	10	4.55	220	100.00		

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 21 ก. ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสุขภาพ

สภาวะการสุขภาพของผู้ป่วย	ลักษณะที่ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่						รวม	
	ค่อยๆเลิก		เลิกโดยที่เดียว		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	13	5.91	105	47.73	118	53.64		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	1	0.45	32	14.55	33	15.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	2	0.91	40	18.18	42	19.09		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	2	0.91	25	11.36	27	12.27		
รวม	18	8.18	202	91.82	220	100.00		

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 22 ก จำนวนบุตรที่เกินครองที่สูบลดเฉลี่ยต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนบุตรที่เกินครองที่สูบลดเฉลี่ย (มวน/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	15	10.27	32	5.33	2	50	20	20.13	3.29	12.74	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	13	8.90	24	4.00	2	13	4	4.54	0.80	2.88	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	68	46.58	118	19.67	3	60	15	16.97	1.45	11.98	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	20	13.70	33	5.50	4	40	20	25.95	2.84	12.72	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	20	13.70	42	7.00	2	20	5	6.90	1.19	5.33	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	10	6.85	27	4.50	2	20	5	6.00	1.62	5.12	
รวม	146	100.00	600	100.00	2	60	10	15.29	1.03	12.44	

ที่มา: จากตารางจ

ตาราง 23 ก จำนวนบุตรที่ไม่มีเกินครองที่สูบลดเฉลี่ยต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนบุตรที่ไม่มีเกินครองที่สูบลดเฉลี่ย (มวน/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	8	61.54	118	19.67	3	20	9	11.13	2.70	7.64	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	4	30.77	33	5.50	5	30	15	16.25	5.54	11.09	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	1	7.69	27	4.50	5	5	5	5.00	-	-	
รวม	13	100.00	600	100.00	3	30	10	12.23	2.41	8.68	

ที่มา: จากตารางจ

ตาราง 24 ก จำนวนยามวนที่สูบลดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนยามวนที่สูบลด (มวน/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	20	11.11	32	5.33	3	20	10	11.35	1.17	5.23	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	13	7.22	24	4.00	2	10	4	4.38	0.58	2.10	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	81	45.00	118	19.67	2	60	10	12.53	1.01	9.05	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	17	9.44	33	5.50	2	20	10	10.76	1.31	5.41	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	29	16.11	42	7.00	2	12	5	6.14	0.52	2.77	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	20	11.11	27	4.50	2	13	5	5.20	0.64	2.88	
รวม	180	100.00	600	100.00	2	60	10	9.80	0.55	7.41	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 25 ก จำนวนใบปีที่สูบลดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนใบปีที่สูบลด (มวน/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	1	100.00	32	5.33	20	20	20	20.00	-	-	
รวม	1	100.00	600	100.00	20	20	20	20.00	-	-	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 26 ก จำนวนซิกาที่สูบลดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนซิกาที่สูบลด (มวน/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	2	100.00	33	5.50	5	10	8	7.50	2.50	3.54	
รวม	2	100.00	600	100.00	5	10	8	7.50	2.50	3.54	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 27 ก จำนวนผู้ที่มีกรรงที่สวมมากที่สุดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนผู้ที่มีกรรงที่สวมมากที่สุด (รวม/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	15	10.27	32	5.33	7	60	20	26.47	3.93	15.22	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	13	8.90	24	4.00	5	20	10	11.77	1.47	5.31	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	68	46.58	118	19.67	5	60	20	22.18	1.59	13.08	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	20	13.70	33	5.50	5	50	30	29.50	2.78	12.45	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	20	13.70	42	7.00	3	30	10	10.70	1.37	6.14	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	10	6.85	27	4.50	3	20	10	11.60	1.98	6.26	
รวม	146	100.00	600	100.00	3	60	20	20.40	1.09	13.16	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 28 ก จำนวนผู้ที่มีกรรงที่สวมมากที่สุดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนผู้ที่มีกรรงที่สวมมากที่สุด (รวม/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	8	61.54	118	19.67	6	40	15	18.75	5.04	14.25	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	4	30.77	33	5.50	10	60	28	31.25	11.61	23.23	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	1	7.69	27	4.50	10	10	10	10.00	-	-	
รวม	13	100.00	600	100.00	6	60	15	21.92	4.81	17.35	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 29 ก จำนวนยานพาหนะที่สูบบมากที่สุดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนยานพาหนะที่สูบบมากที่สุด (มวน/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	20	11.11	32	5.33	5	30	15	14.75	1.33	5.95	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	13	7.22	24	4.00	5	20	10	10.08	1.21	4.35	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	81	45.00	118	19.67	5	80	15	17.02	1.33	11.99	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	17	9.44	33	5.50	5	30	15	14.82	1.78	7.32	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	29	16.11	42	7.00	3	20	10	10.55	0.87	4.69	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	20	11.11	27	4.50	3	20	10	9.15	0.94	4.20	
รวม	180	100.00	600	100.00	3	80	10	14.14	0.70	9.45	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 30 ก จำนวนผู้ป่วยที่สูบบมากที่สุดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยที่สูบบมากที่สุด (มวน/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	1	100.00	32	5.33	20	20	20	20.00			
รวม	1	100.00	600	100.00	20	20	20	20.00			

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 31 ก จำนวนนิการที่สูบบมากที่สุดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนนิการที่สูบบมากที่สุด (มวน/วัน)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	2	100.00	33	5.50	15	30	23	22.50	7.50	10.61	
รวม	2	100.00	600	100.00	15	30	23	22.50	7.50	10.61	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 32 ก. สภาวะร่างกายของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	กลุ่มสภาวะร่างกายของผู้ป่วย												รวม	
	ผู้ป่วยร่างกายผอมมาก		ผู้ป่วยร่างกายผอม		ผู้ป่วยน้ำหนักปกติตัว		ผู้ป่วยร่างกายอ้วน		ผู้ป่วยร่างกายอ้วนมาก		จำนวน	ร้อยละ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	9	1.50	46	7.67	170	28.33	80	13.33	19	3.17	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	-	-	8	1.33	17	2.83	6	1.00	1	0.17	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	-	-	3	0.50	17	2.83	4	0.67	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	2	0.33	12	2.00	76	12.67	25	4.17	3	0.50	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	1	0.17	5	0.83	17	2.83	9	1.50	1	0.17	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	-	-	6	1.00	22	3.67	13	2.17	1	0.17	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	1	0.17	4	0.67	14	2.33	6	1.00	2	0.33	27	4.50		
รวม	13	2.17	84	14.00	333	55.50	143	23.83	27	4.50	600	100.00		

หมายเหตุ : สภาวะร่างกายของผู้ป่วย หากได้จากดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) ของผู้ป่วย จะอยู่ในรูปของส่วนสูงและน้ำหนัก

คำนวณได้โดยนำน้ำหนัก (กิโลกรัม) คูณด้วย 10,000 และนำไปหารด้วยส่วนสูง (เซนติเมตร) ยกกำลังสอง

โดยค่าที่อยู่ที่ระหว่าง 20-25 แสดงว่ามีน้ำหนักตัวพอดี ถ้ามมากกว่า 30 แสดงว่าเป็นคนอ้วนและถ้ามากกว่า 40 แสดงว่าเป็นภาวะโรคอ้วน ส่วนค่าที่น้อยกว่า 16 แสดงว่าผอมจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 33 ก ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งของหลอดลมและปอดแยกตามสถานภาพการสูบบุหรี่

สถานภาพการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	มะเร็งของหลอดลมและปอด												รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยสูบบุหรี่	4	7.14	5	8.93	2	3.57	4	7.14	15	26.79				
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	4	7.14	4	7.14	-	-	1	1.79	9	16.07				
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	1	1.79	-	-	-	-	-	-	1	1.79				
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	9	16.07	6	10.71	1	1.79	3	5.36	19	33.93				
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	1	1.79	2	3.57	1	1.79	1	1.79	5	8.93				
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	1	1.79	1	1.79	1	1.79	1	1.79	4	7.14				
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	2	3.57	-	-	1	1.79	-	-	3	5.36				
รวม	22	39.29	18	32.14	6	10.71	10	17.86	56	100.00				

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 34 ก ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งของปากมดลูกแยกตามสถานภาพการสูบบุหรี่

สถานภาพการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	มะเร็งของปากมดลูก				รวม	
	ระยะที่ 2		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยสูบบุหรี่	1	100.00	1	100.00	1	100.00
รวม	1	100.00	1	100.00	1	100.00

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 35 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจรวมเด็กตามสถานะการสูญพันธุ์

	โรคหัวใจรวมเด็ก						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน			
สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย								
ไม่เคยสูญพันธุ์	314	52.33	10	1.67	324	54.00		
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	32	5.33		
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	116	19.33	2	0.33	118	19.67		
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	33	5.50	-	-	33	5.50		
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	41	6.83	1	0.17	42	7.00		
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	26	4.33	1	0.17	27	4.50		
รวม	586	97.67	14	2.33	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 36 ก ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

	โรคความดันโลหิตสูง						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน			
สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย								
ผู้ป่วยไม่เคยสูญพันธุ์	177	29.50	147	24.50	324	54.00		
ผู้ป่วยสูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	26	4.33	6	1.00	32	5.33		
ผู้ป่วยสูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	21	3.50	3	0.50	24	4.00		
ผู้ป่วยเคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	94	15.67	24	4.00	118	19.67		
ผู้ป่วยเคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	26	4.33	7	1.17	33	5.50		
ผู้ป่วยเคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	33	5.50	9	1.50	42	7.00		
ผู้ป่วยเคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	19	3.17	8	1.33	27	4.50		
รวม	396	66.00	204	34.00	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 37 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	โรคหัวใจขาดเลือด						รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	244	40.67	80	13.33	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	26	4.33	6	1.00	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	15	2.50	9	1.50	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	84	14.00	34	5.67	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	23	3.83	10	1.67	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	30	5.00	12	2.00	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	18	3.00	9	1.50	27	4.50		
รวม	440	73.33	160	26.67	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 38 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจอื่นแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	โรคหัวใจอื่น ๆ						รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	201	33.50	123	20.50	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	8	1.33	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	13	2.17	11	1.83	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	88	14.67	30	5.00	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	26	4.33	7	1.17	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	23	3.83	19	3.17	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	21	3.50	6	1.00	27	4.50		
รวม	396	66.00	204	34.00	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 39 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	โรคหลอดเลือดในสมอง				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญพันธุ์	244	40.67	80	13.33	324	54.00
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	25	4.17	7	1.17	32	5.33
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	17	2.83	7	1.17	24	4.00
เคยสูญพันธุ์จัดและเพ็งเด็ก	95	15.83	23	3.83	118	19.67
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	28	4.67	5	0.83	33	5.50
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพ็งเด็ก	35	5.83	7	1.17	42	7.00
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	19	3.17	8	1.33	27	4.50
รวม	463	77.17	137	22.83	600	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 40 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	โรคหลอดเลือดเฉิง				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญพันธุ์	323	53.83	1	0.17	324	54.00
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	32	5.33
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00
เคยสูญพันธุ์จัดและเพ็งเด็ก	118	19.67	-	-	118	19.67
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	33	5.50	-	-	33	5.50
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพ็งเด็ก	42	7.00	-	-	42	7.00
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	-	-	27	4.50
รวม	599	99.83	1	0.17	600	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 41 ก ผู้ป่วยด้วยโรคสมองขาดเลือดแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

	โรคสมองขาดเลือด						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน			
สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย								
ไม่เคยสูบบุหรี่	319	53.17	5	0.83	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	30	5.00	2	0.33	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	109	18.17	9	1.50	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	33	5.50	-	-	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	41	6.83	1	0.17	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	-	-	27	4.50		
รวม	583	97.17	17	2.83	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 42 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดที่หลอดเลือดสมองเนื่องด้วยหัวใจแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

	โรคหลอดเลือดที่หลอดเลือดสมองเนื่องด้วยหัวใจ						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน			
สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย								
ไม่เคยสูบบุหรี่	320	53.33	4	0.67	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	117	19.50	1	0.17	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	32	5.33	1	0.17	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	40	6.67	2	0.33	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	-	-	27	4.50		
รวม	592	98.67	8	1.33	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 43 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดชนิดอื่นแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	โรคหลอดเลือดชนิดอื่น ๆ						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูบบุหรี่	324	54.00	-	-	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	117	19.50	1	0.17	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	33	5.50	-	-	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	41	6.83	1	0.17	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	-	-	27	4.50		
รวม	598	99.67	2	0.33	600	100.00		

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 44 ก ผู้ป่วยด้วยวัณโรคปอดแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	วัณโรคปอด						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูบบุหรี่	322	53.67	2	0.33	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	116	19.33	2	0.33	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	33	5.50	-	-	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	42	7.00	-	-	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	-	-	27	4.50		
รวม	596	99.33	4	0.67	600	100.00		

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 45 ก ผู้ป่วยด้วยโรคปอดควมแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	โรคปอดควม						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูบบุหรี่	318	53.00	6	1.00	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	30	5.00	2	0.33	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	110	18.33	8	1.33	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	33	5.50	-	-	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	40	6.67	2	0.33	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	25	4.17	2	0.33	27	4.50		
รวม	580	96.67	20	3.33	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 46 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูบบุหรี่	323	53.83	1	0.17	324	54.00		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	115	19.17	3	0.50	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	32	5.33	1	0.17	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	42	7.00	-	-	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	-	-	27	4.50		
รวม	595	99.17	5	0.83	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 47 ก ผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงแยกตามสภาวะการสูญน้ำ

สภาวะการสูญน้ำของผู้ป่วย	โรคอุจจาระร่วง						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน			
ไม่เคຍสูญน้ำ	321	53.50	3	0.50	324	54.00		
สูญน้ำจัดในปัจจุบัน	29	4.83	3	0.50	32	5.33		
สูญน้ำไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคຍสูญน้ำจัดและเพิ่งเด็ก	105	17.50	13	2.17	118	19.67		
เคຍสูญน้ำจัดและเด็กมานาน	30	5.00	3	0.50	33	5.50		
เคຍสูญน้ำไม่จัดและเพิ่งเด็ก	42	7.00	-	-	42	7.00		
เคຍสูญน้ำไม่จัดและเด็กมานาน	26	4.33	1	0.17	27	4.50		
รวม	577	96.17	23	3.83	600	100.00		

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 48 ก ผู้ป่วยด้วยโรคหอบหืดแยกตามสภาวะการสูญน้ำ

สภาวะการสูญน้ำของผู้ป่วย	โรคหอบหืด						รวม	
	ไม่เป็น			เป็น			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน			
ไม่เคຍสูญน้ำ	307	51.17	17	2.83	324	54.00		
สูญน้ำจัดในปัจจุบัน	25	4.17	7	1.17	32	5.33		
สูญน้ำไม่จัดในปัจจุบัน	23	3.83	1	0.17	24	4.00		
เคຍสูญน้ำจัดและเพิ่งเด็ก	83	13.83	35	5.83	118	19.67		
เคຍสูญน้ำจัดและเด็กมานาน	28	4.67	5	0.83	33	5.50		
เคຍสูญน้ำไม่จัดและเพิ่งเด็ก	37	6.17	5	0.83	42	7.00		
เคຍสูญน้ำไม่จัดและเด็กมานาน	26	4.33	1	0.17	27	4.50		
รวม	529	88.17	71	11.83	600	100.00		

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 49 ก ผู้ป่วยด้วยโรคอุกคั่นทางเดินหายใจเรื้อรังแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	โรคอุกคั่นทางเดินหายใจเรื้อรัง						รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	324	54.00	-	-	324	54.00		
สูบบุหรี่จัด ในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัด ในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	116	19.33	2	0.33	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	31	5.17	2	0.33	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	42	7.00	-	-	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	-	-	27	4.50		
รวม	596	99.33	4	0.67	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 50 ก การออกกำลังกายของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	ผู้ป่วยออกกำลังกายเป็นประจำ						รวม	
	ไม่ใช้		ใช้		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	193	32.17	131	21.83	324	54.00		
สูบบุหรี่จัด ในปัจจุบัน	25	4.17	7	1.17	32	5.33		
สูบบุหรี่ไม่จัด ในปัจจุบัน	18	3.00	6	1.00	24	4.00		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	85	14.17	33	5.50	118	19.67		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	19	3.17	14	2.33	33	5.50		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	25	4.17	17	2.83	42	7.00		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	17	2.83	10	1.67	27	4.50		
รวม	382	63.67	218	36.33	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 51 ก การสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูญบุพหุ

สภาวะการสูญบุพหุของผู้ป่วย	ผู้ป่วยสวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นประจำ						รวม	
	ไม่ใช้			ใช้			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญบุพหุ	308	51.33	16	2.67	324	54.00		
สูญบุพหุจัดในปัจจุบัน	29	4.83	3	0.50	32	5.33		
สูญบุพหุไม่จัดในปัจจุบัน	22	3.67	2	0.33	24	4.00		
เคยสูญบุพหุจัดและเพิ่งเด็ก	108	18.00	10	1.67	118	19.67		
เคยสูญบุพหุจัดและเด็กมานาน	29	4.83	4	0.67	33	5.50		
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเพิ่งเด็ก	40	6.67	2	0.33	42	7.00		
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเด็กมานาน	26	4.33	1	0.17	27	4.50		
รวม	562	93.67	38	6.33	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 52 ก การตีตมเครื่องตีตมแอลกอฮอล์เป็นประจำของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูญบุพหุ

สภาวะการสูญบุพหุของผู้ป่วย	ผู้ป่วยตีตมเครื่องตีตมแอลกอฮอล์						รวม	
	ไม่ตีตม			ตีตม			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญบุพหุ	313	52.17	11	1.83	324	54.00		
สูญบุพหุจัดในปัจจุบัน	22	3.67	10	1.67	32	5.33		
สูญบุพหุไม่จัดในปัจจุบัน	17	2.83	7	1.17	24	4.00		
เคยสูญบุพหุจัดและเพิ่งเด็ก	108	18.00	10	1.67	118	19.67		
เคยสูญบุพหุจัดและเด็กมานาน	31	5.17	2	0.33	33	5.50		
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเพิ่งเด็ก	41	6.83	1	0.17	42	7.00		
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเด็กมานาน	25	4.17	2	0.33	27	4.50		
รวม	557	92.83	43	7.17	600	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 53 ก จำนวนนิรภัยที่ดื่มของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนนิรภัยที่ดื่มของผู้ป่วยดื่ม (แก้ว/สัปดาห์)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูบบุหรี่	1	14.29	324	54.00	1	1	1	1.00	-	-	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	1	14.29	32	5.33	28	28	28	28.00	-	-	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	2	28.57	24	4.00	3	28	16	15.50	12.50	17.68	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	2	28.57	118	19.67	8	20	14	14.00	6.00	8.49	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	1	14.29	42	7.00	2	2	2	2.00	-	-	
รวม	7	100.00	600	100.00	1	28	8	12.86	4.60	12.17	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 54 ก จำนวนสุราที่ดื่มของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนสุราที่ดื่มของผู้ป่วยดื่ม (แก้ว/สัปดาห์)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูบบุหรี่	9	25.00	324	54.00	1	40	2	9.11	4.39	13.18	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	9	25.00	32	5.33	1	80	10	28.67	10.49	31.47	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	6	16.67	24	4.00	1	70	13	23.33	11.07	27.11	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	8	22.22	118	19.67	1	20	3	6.13	2.54	7.18	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	2	5.56	33	5.50	20	80	50	50.00	30.00	42.43	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	2	5.56	27	4.50	1	1	1	1.00	-	-	
รวม	36	100.00	600	100.00	1	80	5	17.53	4.06	24.38	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 55 ก ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับผู้สูบบุหรี่ (Passive Smoker) ในที่อยู่อาศัยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	ความสัมพันธ์ของผู้สูบบุหรี่กับผู้ป่วยในที่อยู่อาศัย												รวม	
	พ่อแม่		ญาติพี่น้อง		สามี,ภรรยา		ลูก,หลาน		ลูกเขย,ลูกสะใภ้		จำนวน	ร้อยละ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	7	2.93	13	5.44	52	21.76	46	19.25	24	10.04	142	59.41		
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	1	0.42	5	2.09	1	0.42	7	2.93	1	0.42	15	6.28		
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	1	0.42	4	1.67	-	-	2	0.84	1	0.42	8	3.35		
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	1	0.42	12	5.02	-	-	22	9.21	5	2.09	40	16.74		
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	-	-	4	1.67	1	0.42	7	2.93	1	0.42	13	5.44		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	1	0.42	5	2.09	-	-	5	2.09	-	-	11	4.60		
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	2	0.84	2	0.84	-	-	6	2.51	-	-	10	4.18		
รวม	13	5.44	45	18.83	54	22.59	95	39.75	32	13.39	239	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 56 ก ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับผู้สูบบุหรี่ (Passive Smoker) ในสถานที่ทำงานแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	ความสัมพันธ์ของผู้สูบบุหรี่กับผู้ป่วยในที่ทำงาน												รวม	
	เพื่อนร่วมงาน		ลูกค้า		ลูกจ้าง		จำนวน	ร้อยละ						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ								
ไม่เคยสูบบุหรี่	5	21.74	-	-	-	-	5	21.74						
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	3	13.04	-	-	-	-	3	13.04						
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	3	13.04	-	-	-	-	3	13.04						
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	5	21.74	2	8.70	1	4.35	8	34.78						
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	1	4.35	-	-	-	-	1	4.35						
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	1	4.35	-	-	-	-	1	4.35						
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	1	4.35	-	-	1	4.35	2	8.70						
รวม	19	82.61	2	8.70	2	8.70	23	100.00						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 57 ก. ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับผู้สูบบุหรี่ (Passive Smoker) ในสถานศึกษาแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	ความสัมพันธ์ของผู้สูบบุหรี่กับผู้ป่วยในสถานศึกษา						รวม	
	เพื่อน		อาจารย์		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	1	50.00	-	-	1	-	1	50.00
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	-	-	1	50.00	1	-	1	50.00
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1	50.00	1	50.00	2	-	2	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 58 ก. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพในชีวิตประจำวัน						รวม	
	ไม่มี		มี		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูบบุหรี่	160	26.67	164	27.33	324	54.00	324	54.00
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	17	2.83	15	2.50	32	5.33	32	5.33
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	8	1.33	16	2.67	24	4.00	24	4.00
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	62	10.33	56	9.33	118	19.67	118	19.67
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	9	1.50	24	4.00	33	5.50	33	5.50
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	24	4.00	18	3.00	42	7.00	42	7.00
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	13	2.17	14	2.33	27	4.50	27	4.50
รวม	293	48.83	307	51.17	600	100.00	600	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 59 ก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย						รวม	
	ไม่เปลี่ยน			ลดลง			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน		
ผู้ป่วยไม่เคยสูบบุหรี่	164	53.42	-	-	-	164	53.42	
ผู้ป่วยสูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	8	2.61	7	2.28	2.28	15	4.89	
ผู้ป่วยสูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	4	1.30	12	3.91	3.91	16	5.21	
ผู้ป่วยเคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	49	15.96	7	2.28	2.28	56	18.24	
ผู้ป่วยเคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	24	7.82	-	-	-	24	7.82	
ผู้ป่วยเคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	17	5.54	1	0.33	0.33	18	5.86	
ผู้ป่วยเคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	14	4.56	-	-	-	14	4.56	
รวม	280	91.21	27	8.79	8.79	307	100.00	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 60 ก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	การดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วย						รวม	
	ไม่เปลี่ยน			ลดลง			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน		
ไม่เคยสูบบุหรี่	160	52.12	4	1.30	1.30	164	53.42	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	12	3.91	3	0.98	0.98	15	4.89	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	11	3.58	5	1.63	1.63	16	5.21	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	48	15.64	8	2.61	2.61	56	18.24	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	22	7.17	2	0.65	0.65	24	7.82	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	16	5.21	2	0.65	0.65	18	5.86	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	14	4.56	-	-	-	14	4.56	
รวม	283	92.18	24	7.82	7.82	307	100.00	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 61 ก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	การออกกำลังกายของผู้ป่วย						รวม	
	ไม่เปลี่ยนแปลง		เพิ่มขึ้น		ลดลง		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูบบุหรี่	80	26.06	14	4.56	70	22.80	164	53.42
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	7	2.28	1	0.33	7	2.28	15	4.89
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	8	2.61	1	0.33	7	2.28	16	5.21
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	29	9.45	3	0.98	24	7.82	56	18.24
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	15	4.89	2	0.65	7	2.28	24	7.82
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	4	1.30	5	1.63	9	2.93	18	5.86
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	9	2.93	-	-	5	1.63	14	4.56
รวม	152	49.51	26	8.47	129	42.02	307	100.00

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 62 ก การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวของผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูบบุหรี่

สถานะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	น้ำหนักตัวของผู้ป่วย						รวม	
	ไม่เปลี่ยนแปลง		เพิ่มขึ้น		ลดลง		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูบบุหรี่	19	6.19	8	2.61	137	44.63	164	53.42
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	4	1.30	-	-	11	3.58	15	4.89
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	4	1.30	3	0.98	9	2.93	16	5.21
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	3	0.98	3	0.98	50	16.29	56	18.24
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	2	0.65	3	0.98	19	6.19	24	7.82
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	1	0.33	2	0.65	15	4.89	18	5.86
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	1	0.33	1	0.33	12	3.91	14	4.56
รวม	34	11.07	20	6.51	253	82.41	307	100.00

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 63 ก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการบริหารของหน่วยแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า	การบริโภคอาหารของสัตว์ป่า						รวม	
	ไม่เปลี่ยน		เพิ่มขึ้น		ลดลง		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญพันธุ์	28	9.12	4	1.30	132	43.00	164	53.42
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	3	0.98	-	-	12	3.91	15	4.89
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	6	1.95	3	0.98	7	2.28	16	5.21
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	5	1.63	3	0.98	48	15.64	56	18.24
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	4	1.30	3	0.98	17	5.54	24	7.82
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	6	1.95	2	0.65	10	3.26	18	5.86
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	1	0.33	1	0.33	12	3.91	14	4.56
รวม	53	17.26	16	5.21	238	77.52	307	100.00

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 64 ก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการบริหารของหน่วยแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า	การนอนหลับพักผ่อน						รวม	
	ไม่เปลี่ยน		เพิ่มขึ้น		ลดลง		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญพันธุ์	3	11.54	1	3.85	10	38.46	14	53.85
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	-	-	-	-	1	3.85	1	3.85
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	-	-	1	3.85	2	7.69	3	11.54
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	-	-	-	-	3	11.54	3	11.54
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	-	-	1	3.85	1	3.85	2	7.69
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	-	-	1	3.85	2	7.69	3	11.54
รวม	3	11.54	4	15.38	19	73.08	26	100.00

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 65 ก จำนวนวันที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่บ้านเป็นเวลาหนึ่งปีแยกตามสถานะการสุขภาพ

สถานะการสุขภาพของผู้ป่วย	จำนวนวันที่ผู้ป่วยต้องพักอยู่ที่บ้าน (วัน/ปี)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสุขภาพดี	151	54.12	324	54.00	2	20	31.25	3.25	39.89	
สุขภาพดีในปัจจุบัน	13	4.66	32	5.33	2	30	53.38	17.34	62.52	
สุขภาพดีไม่จัดในปัจจุบัน	4	1.43	24	4.00	5	10	8.75	1.25	2.50	
เคยสุขภาพดีและเพิ่งเด็ก	62	22.22	118	19.67	2	20	41.35	8.77	69.07	
เคยสุขภาพดีและเด็กมานาน	17	6.09	33	5.50	2	20	25.53	4.87	20.08	
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเพิ่งเด็ก	19	6.81	42	7.00	3	10	37.21	18.63	81.19	
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเด็กมานาน	13	4.66	27	4.50	5	20	24.92	5.70	20.56	
รวม	279	100.00	600	100.00	2	20	33.96	3.05	50.93	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 66 ก จำนวนวันที่ผู้ป่วยนอนพักอยู่คนเดียวเป็นเวลาหนึ่งปีแยกตามสถานะการสุขภาพ

สถานะการสุขภาพของผู้ป่วย	จำนวนวันที่ผู้ป่วยต้องนอนพักอยู่คนเดียว (วัน/ปี)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสุขภาพดี	36	46.15	324	54.00	2	13	27.78	6.57	39.45	
สุขภาพดีในปัจจุบัน	6	7.69	32	5.33	7	28	37.17	11.34	27.77	
เคยสุขภาพดีและเพิ่งเด็ก	22	28.21	118	19.67	2	20	46.41	15.54	72.90	
เคยสุขภาพดีและเด็กมานาน	7	8.97	33	5.50	2	6	15.43	7.75	20.51	
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเพิ่งเด็ก	3	3.85	42	7.00	10	10	10.00	-	-	
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเด็กมานาน	4	5.13	27	4.50	3	17	24.25	12.69	25.38	
รวม	78	100.00	600	100.00	2	13	31.78	5.53	48.80	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 67 ก สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยไปรับการดูแลรักษาสุขภาพเป็นประจำแยกตามสถานะการสุขภาพ

สถานะการสุขภาพของผู้ป่วย	ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาสุขภาพจากสถานที่ใดเป็นประจำ												รวม	
	โรงพยาบาลรัฐ		คลินิก		สถานีอนามัย		ร้านขายยา		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ						
ไม่เคยสุขภาพ	321	53.50	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-	324	54.00
สุขภาพดีในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	5.33
สุขภาพดีไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.00
เคยสุขภาพดีและเพิ่งเด็ก	116	19.33	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	118	19.67
เคยสุขภาพดีและเด็กมานาน	32	5.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	33	5.50
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเพิ่งเด็ก	42	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	7.00
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเด็กมานาน	27	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4.50
รวม	594	99.00	2	0.33	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	600	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 68 ก บุคคลที่ดูแลรักษาและพยาบาลผู้ป่วยโดยมากแยกตามสถานะการสุขภาพ

สถานะการสุขภาพของผู้ป่วย	บุคคลที่ดูแลรักษาและพยาบาลผู้ป่วยโดยมาก										รวม			
	แพทย์และพยาบาล		เจ้าหน้าที่สาธารณสุข		เภสัชกร		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ								
ไม่เคยสุขภาพ	324	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	54.00
สุขภาพดีในปัจจุบัน	32	5.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	5.33
สุขภาพดีไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.00
เคยสุขภาพดีและเพิ่งเด็ก	117	19.50	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	118	19.67
เคยสุขภาพดีและเด็กมานาน	32	5.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	33	5.50
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเพิ่งเด็ก	42	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	7.00
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเด็กมานาน	27	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4.50
รวม	598	99.67	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	600	100.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 69 ก ประเภทของยานพาหนะที่ผู้ป่วยใช้เพื่อไปพบแพทย์โดยมากแยกตามสภาวะการสูญหู

สภาวะการสูญหูของผู้ป่วย	ประเภทของยานพาหนะที่ผู้ป่วยใช้เพื่อไปพบแพทย์โดยมาก																รวม	
	รถยนต์ส่วนตัว		รถยนต์ยูนิต,เพื่อน		รถโดยสารประจำทาง		รถแท็กซี่,เหมารถ		รถโรงพยาบาล		เดินเท้า		จำนวน	ร้อยละ				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่เคยสูญหู	104	17.33	6	1.00	161	26.83	43	7.17	9	1.50	1	0.17	324	54.00				
สูญหูหรือจัดในปัจจุบัน	11	1.83	4	0.67	9	1.50	1	0.17	6	1.00	1	0.17	32	5.33				
สูญหูหรือไม่จัดในปัจจุบัน	6	1.00	-	-	15	2.50	1	0.17	2	0.33	-	-	24	4.00				
เคยสูญหูหรือจัดและเพิ่งเด็ก	50	8.33	7	1.17	38	6.33	15	2.50	7	1.17	1	0.17	118	19.67				
เคยสูญหูหรือจัดและเด็กมานาน	17	2.83	-	-	12	2.00	4	0.67	-	-	-	-	33	5.50				
เคยสูญหูหรือไม่จัดและเพิ่งเด็ก	4	0.67	4	0.67	20	3.33	8	1.33	6	1.00	-	-	42	7.00				
เคยสูญหูหรือไม่จัดและเด็กมานาน	10	1.67	1	0.17	12	2.00	2	0.33	2	0.33	-	-	27	4.50				
รวม	202	33.67	22	3.67	267	44.50	74	12.33	32	5.33	3	0.50	600	100.00				

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 70 ก จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยใน ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลแยกตามสภาวะการสูญหู

สภาวะการสูญหูของผู้ป่วย	จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาพยาบาล (ครั้ง/ปี)											ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน			
ไม่เคยสูญหู	242	51.27	324	54.00	1	7	1	1.62	0.07	1.04		
สูญหูหรือจัดในปัจจุบัน	27	5.72	32	5.33	1	14	2	2.37	0.49	2.53		
สูญหูหรือไม่จัดในปัจจุบัน	21	4.45	24	4.00	1	9	1	2.27	0.47	2.21		
เคยสูญหูหรือจัดและเพิ่งเด็ก	104	22.03	118	19.67	1	13	2	2.20	0.19	1.96		
เคยสูญหูหรือจัดและเด็กมานาน	26	5.51	33	5.50	1	10	2	2.50	0.44	2.27		
เคยสูญหูหรือไม่จัดและเพิ่งเด็ก	29	6.14	42	7.00	1	7	1	1.90	0.28	1.52		
เคยสูญหูหรือไม่จัดและเด็กมานาน	23	4.87	27	4.50	1	3	2	1.78	0.17	0.80		
รวม	472	100.00	600	100.00	1	14	1	1.89	0.07	1.58		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 71 ก จำนวนวันที่พักรักษาตัวของผู้ป่วยในแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนวันที่พักรักษาของผู้ป่วยใน (วัน/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูบบุหรี่	242	51.27	324	54.00	1	105	5	9.14	0.77	11.93	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	27	5.72	32	5.33	1	87	4	10.11	3.26	16.92	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	21	4.45	24	4.00	1	48	6	9.33	2.77	12.71	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	104	22.03	118	19.67	1	112	8	12.83	1.65	16.78	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	26	5.51	33	5.50	1	50	10	13.85	2.47	12.62	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	29	6.14	42	7.00	1	44	3	7.52	1.82	9.81	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	23	4.87	27	4.50	1	90	6	12.70	4.04	19.39	
รวม	472	100.00	600	100.00	1	112	6	10.35	0.64	13.87	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 72 ก ระยะทางจากบ้านผู้ป่วยในมายังโรงพยาบาลแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	ระยะทางที่ผู้ป่วยใช้ในการเดินทางจากบ้านมายังโรงพยาบาล (กิโลเมตร/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูบบุหรี่	242	51.27	324	54.00	1	720	24	45.17	4.79	74.54	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	27	5.72	32	5.33	1	488	50	86.11	21.19	110.12	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	21	4.45	24	4.00	3	750	28	83.95	35.44	162.42	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิก	104	22.03	118	19.67	1	720	40	71.12	10.21	104.16	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	26	5.51	33	5.50	4	650	20	62.38	25.20	128.49	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิก	29	6.14	42	7.00	3	350	32	59.41	13.76	74.08	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	23	4.87	27	4.50	5	300	26	56.78	14.16	67.90	
รวม	472	100.00	600	100.00	1	750	28	57.34	4.27	92.86	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 73 ก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยในแยกตามสถานะการศุภบุพหรี

สถานะการศุภบุพหรีของผู้ป่วย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยใน (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีรถยนต์	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยศุภบุพหรี	215	52.31	324	54.00	10	6,300	100	228.00	34.58	507.08	
ศุภบุพหรีจัดในปัจจุบัน	23	5.60	32	5.33	20	3,200	150	368.17	148.26	711.05	
ศุภบุพหรีไม่จัดในปัจจุบัน	15	3.65	24	4.00	10	280	60	86.27	21.25	82.31	
เคยศุภบุพหรีจัดและเพิ่งเลิก	89	21.65	118	19.67	10	1,900	100	245.11	31.66	298.65	
เคยศุภบุพหรีจัดและเลิกมานาน	24	5.84	33	5.50	20	1,420	150	234.33	58.77	287.90	
เคยศุภบุพหรีไม่จัดและเพิ่งเลิก	22	5.35	42	7.00	10	3,500	100	464.18	177.46	832.35	
เคยศุภบุพหรีไม่จัดและเลิกมานาน	23	5.60	27	4.50	20	620	100	198.87	44.49	213.35	
รวม	411	100.00	600	100.00	10	6,300	100	245.76	23.55	477.41	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 74 ก เวลาที่ผู้ป่วยในมารอรับการรักษาแยกตามสถานะการศุภบุพหรี

สถานะการศุภบุพหรีของผู้ป่วย	เวลาที่ผู้ป่วยในมารอรับการรักษา (นาที/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีรถยนต์	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยศุภบุพหรี	132	50.97	324	54.00	5	300	20	26.70	2.65	30.40	
ศุภบุพหรีจัดในปัจจุบัน	14	5.41	32	5.33	5	60	20	21.79	3.77	14.09	
ศุภบุพหรีไม่จัดในปัจจุบัน	9	3.47	24	4.00	10	60	20	24.44	5.30	15.90	
เคยศุภบุพหรีจัดและเพิ่งเลิก	53	20.46	118	19.67	10	60	20	19.62	1.63	11.88	
เคยศุภบุพหรีจัดและเลิกมานาน	18	6.95	33	5.50	10	100	20	33.89	6.42	27.25	
เคยศุภบุพหรีไม่จัดและเพิ่งเลิก	17	6.56	42	7.00	10	70	20	24.71	4.47	18.41	
เคยศุภบุพหรีไม่จัดและเลิกมานาน	16	6.18	27	4.50	10	60	20	23.75	3.28	13.10	
รวม	259	100.00	600	100.00	5	300	20	25.10	1.53	24.68	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 75 ก จำนวนญาติที่ดูแลระหว่างผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาลตามสภาวะการสูญบุพหรี

สภาวะการสูญบุพหรีของผู้ป่วย	จำนวนญาติที่ดูแลระหว่างผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาล (คน/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุพหรี	240	51.17	324	54.00	1	12	1	1.82	0.10	1.49	
สูญบุพหรีจัดในปัจจุบัน	27	5.76	32	5.33	1	19	2	2.74	0.69	3.57	
สูญบุพหรีไม่จัดในปัจจุบัน	21	4.48	24	4.00	1	7	1	1.95	0.36	1.66	
เคยสูญบุพหรีจัดและเพิ่งเลิก	103	21.96	118	19.67	1	13	2	2.22	0.20	2.06	
เคยสูญบุพหรีจัดและเลิกมานาน	26	5.54	33	5.50	1	10	2	2.88	0.55	2.80	
เคยสูญบุพหรีไม่จัดและเพิ่งเลิก	29	6.18	42	7.00	1	10	2	2.10	0.37	1.97	
เคยสูญบุพหรีไม่จัดและเลิกมานาน	23	4.90	27	4.50	1	6	2	2.04	0.26	1.22	
รวม	469	100.00	600	100.00	1	19	1	2.05	0.09	1.92	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 76 ก ค่าจ้างคนดูแลระหว่างผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาลตามสภาวะการสูญบุพหรี

สภาวะการสูญบุพหรีของผู้ป่วย	ค่าจ้างคนดูแลระหว่างผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาล (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุพหรี	2	100.00	324	54.00	500	18,000	9,250	9,250.00	8,750.00	12,374.37	
รวม	2	100.00	600	100.00	500	18,000	9,250	9,250.00	8,750.00	12,374.37	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 77 ก จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาพยาบาลสถานการสุขภาพ

สถานะการสุขภาพของผู้ป่วย	จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาพยาบาล (ครั้ง/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสุขภาพดี	313	55.79	324	54.00	1	17	12	8.97	0.22	3.83	
สุขภาพดีในปัจจุบัน	24	4.28	32	5.33	1	13	12	8.29	0.90	4.43	
สุขภาพดีไม่จัดในปัจจุบัน	18	3.21	24	4.00	1	12	8	7.72	1.01	4.28	
เคยสุขภาพดีจัดและเพิ่งเลิก	110	19.61	118	19.67	1	24	12	9.54	0.41	4.26	
เคยสุขภาพดีจัดและเลิกมานาน	33	5.88	33	5.50	1	12	6	7.73	0.65	3.72	
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเพิ่งเลิก	40	7.13	42	7.00	1	25	12	9.65	0.77	4.86	
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเลิกมานาน	23	4.10	27	4.50	1	12	12	9.87	0.83	3.97	
รวม	561	100.00	600	100.00	1	25	12	9.03	0.17	4.05	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 78 ก ระยะทางจากบ้านผู้ป่วยนอกมายังโรงพยาบาลเขตตามสถานการสุขภาพ

สถานะการสุขภาพของผู้ป่วย	ระยะทางจากบ้านผู้ป่วยนอกมายังโรงพยาบาล (กิโลเมตร/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสุขภาพดี	313	55.79	324	54.00	1	2,400	120	217.27	15.85	280.36	
สุขภาพดีจัดในปัจจุบัน	24	4.28	32	5.33	3	1,116	70	182.79	54.76	268.25	
สุขภาพดีไม่จัดในปัจจุบัน	18	3.21	24	4.00	3	1,680	109	266.89	98.44	417.67	
เคยสุขภาพดีจัดและเพิ่งเลิก	110	19.61	118	19.67	2	1,440	144	242.67	27.96	293.30	
เคยสุขภาพดีจัดและเลิกมานาน	33	5.88	33	5.50	5	2,040	60	194.24	71.71	411.93	
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเพิ่งเลิก	40	7.13	42	7.00	20	900	120	232.13	40.07	253.42	
เคยสุขภาพดีไม่จัดและเลิกมานาน	23	4.10	27	4.50	7	1,200	144	245.87	60.03	287.89	
รวม	561	100.00	600	100.00	1	2,400	120	223.24	12.42	294.14	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 79 ก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยนอกแยกตามสถานะการสูญบุตร

สถานะการสูญบุตรของผู้ป่วย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยนอก (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุตร	311	56.14	324	54.00	10	7,200	300	674.86	55.67	981.72	
สูญบุตรจัดในบึงจวบ	23	4.15	32	5.33	20	2,450	300	540.26	137.30	658.48	
สูญบุตรไม่จัดในบึงจวบ	18	3.25	24	4.00	10	1,440	180	288.94	83.65	354.90	
เคยสูญบุตรจัดและเพิ่งเด็ก	106	19.13	118	19.67	9	5,400	360	666.24	79.76	821.18	
เคยสูญบุตรจัดและเด็กมานาน	33	5.96	33	5.50	10	3,600	240	589.82	147.74	848.70	
เคยสูญบุตรไม่จัดและเพิ่งเด็ก	40	7.22	42	7.00	35	8,400	350	760.63	249.67	1,579.06	
เคยสูญบุตรไม่จัดและเด็กมานาน	23	4.15	27	4.50	20	8,400	600	972.96	358.30	1,718.34	
รวม	554	100.00	600	100.00	9	8,400	306	668.59	43.22	1,017.18	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 80 ก เวลาที่ผู้ป่วยนอกมารักษาแยกตามสถานะการสูญบุตร

สถานะการสูญบุตรของผู้ป่วย	เวลาที่ผู้ป่วยนอกมารักษา (ชั่วโมง/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุตร	312	55.81	324	54.00	1	240	36	35.29	1.34	23.59	
สูญบุตรจัดในบึงจวบ	24	4.29	32	5.33	2	104	29	31.21	4.94	24.21	
สูญบุตรไม่จัดในบึงจวบ	18	3.22	24	4.00	1	60	22	23.17	3.35	14.20	
เคยสูญบุตรจัดและเพิ่งเด็ก	109	19.50	118	19.67	2	160	28	33.96	2.40	25.10	
เคยสูญบุตรจัดและเด็กมานาน	33	5.90	33	5.50	2	60	36	29.09	2.99	17.19	
เคยสูญบุตรไม่จัดและเพิ่งเด็ก	40	7.16	42	7.00	2	100	34	34.60	3.53	22.31	
เคยสูญบุตรไม่จัดและเด็กมานาน	23	4.11	27	4.50	4	60	24	28.87	3.33	15.99	
รวม	559	100.00	600	100.00	1	240	30	33.79	0.98	23.06	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 81 ก จำนวนญาติที่ดูแลระหว่างผู้ป่วยนอกมาโรงพยาบาลแยกตามสภาวะการสูญพันธุ์

สภาวะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	จำนวนญาติที่ดูแลระหว่างผู้ป่วยนอกมาโรงพยาบาล (คน/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	200	55.25	324	54.00	1	48	12	9.09	0.35	5.00	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	13	3.59	32	5.33	1	26	5	7.31	2.02	7.30	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	7	1.93	24	4.00	4	12	12	10.57	1.13	2.99	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	75	20.72	118	19.67	1	24	12	9.35	0.54	4.65	
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	22	6.08	33	5.50	1	12	6	7.64	0.83	3.89	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	30	8.29	42	7.00	1	24	12	9.03	1.00	5.49	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	15	4.14	27	4.50	1	12	12	10.13	1.04	4.02	
รวม	362	100.00	600	100.00	1	48	12	9.06	0.26	4.94	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 82 ก ค่าจ้างคนดูแลระหว่างผู้ป่วยนอกมาโรงพยาบาลแยกตามสภาวะการสูญพันธุ์

สภาวะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ค่าจ้างคนดูแลระหว่างผู้ป่วยนอกมาโรงพยาบาล (บาท/ปี)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เคยสูญพันธุ์	1	100.00	324	54.00	18,000	18,000	18,000	18,000.00	-	-
รวม	1	100.00	600	100.00	18,000	18,000	18,000	18,000.00	-	-

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 83 ก จำนวนครั้งที่ผู้ช่วยข้าราชการกองแยกตามสภาวะการอุปฐัมภ์

สภาวะการอุปฐัมภ์ของผู้ป่วย	จำนวนครั้งที่ผู้ช่วยข้าราชการกอง									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เคยอุปฐัมภ์	41	32.54	324	54.00	1	12	1	2.44	0.38	2.46
อุปฐัมภ์จัดในปัจจุบัน	9	7.14	32	5.33	1	10	2	3.89	1.20	3.59
อุปฐัมภ์ไม่จัดในปัจจุบัน	7	5.56	24	4.00	3	12	4	5.00	1.23	3.27
เคยอุปฐัมภ์จัดและเพิ่งเลิก	40	31.75	118	19.67	1	7	2	2.13	0.24	1.51
เคยอุปฐัมภ์จัดและเลิกมานาน	12	9.52	33	5.50	1	6	1	1.92	0.43	1.51
เคยอุปฐัมภ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	11	8.73	42	7.00	1	6	2	2.00	0.45	1.48
เคยอุปฐัมภ์ไม่จัดและเลิกมานาน	6	4.76	27	4.50	1	10	2	2.83	1.45	3.54
รวม	126	100.00	600	100.00	1	12	2	2.52	0.21	2.33

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 84 ก ค่าจ้างคนงานดูแลผู้ป่วยที่บ้านแยกตามสภาวะการอุปฐัมภ์

สภาวะการอุปฐัมภ์ของผู้ป่วย	ค่าจ้างคนงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (บาท/ปี)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เคยอุปฐัมภ์	11	33.33	324	54.00	200	6,139	2,000	2,730.36	564.65	1,872.72
อุปฐัมภ์จัดในปัจจุบัน	2	6.06	32	5.33	3,000	3,250	3,125	3,125.00	125.00	176.78
อุปฐัมภ์ไม่จัดในปัจจุบัน	4	12.12	24	4.00	1,750	12,000	3,175	5,025.00	2,350.22	4,700.44
เคยอุปฐัมภ์จัดและเพิ่งเลิก	8	24.24	118	19.67	300	15,825	3,580	6,187.38	2,187.31	6,186.64
เคยอุปฐัมภ์จัดและเลิกมานาน	3	9.09	33	5.50	1,500	6,139	2,250	3,296.37	1,437.76	2,490.28
เคยอุปฐัมภ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	2	6.06	42	7.00	1,500	6,500	4,000	4,000.00	2,500.00	3,535.53
เคยอุปฐัมภ์ไม่จัดและเลิกมานาน	3	9.09	27	4.50	2,250	3,750	2,750	2,916.67	440.96	763.76
รวม	33	100.00	600	100.00	200	15,825	3,000	4,015.82	661.52	3,800.15

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 85 ก ค่าต่อเติมส่วนต่างๆของบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูญบุหรี

สภาวะการสูญบุหรีของผู้ป่วย	ค่าต่อเติมส่วนต่างๆของบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุหรี	3	42.86	324	54.00	2,967	3,017	2,992	2,992.00	14.43	25.00	
สูญบุหรีจัดในปัจจุบัน	1	14.29	32	5.33	3,041	3,041	3,041	3,041.00	-	-	
สูญบุหรีไม่จัดในปัจจุบัน	1	14.29	24	4.00	2,992	2,992	2,992	2,991.70	-	-	
เคยสูญบุหรีจัดและเพิ่งเลิก	1	14.29	118	19.67	3,041	3,041	3,041	3,041.30	-	-	
เคยสูญบุหรีไม่จัดและเลิกมานาน	1	14.29	27	4.50	2,967	2,967	2,967	2,966.90	-	-	
รวม	7	100.00	600	100.00	2,967	3,041	2,992	3,002.41	11.90	31.50	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 86 ก ค่าซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูญบุหรี

สภาวะการสูญบุหรีของผู้ป่วย	ค่าซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุหรี	8	47.06	324	54.00	4,000	20,539	5,000	8,341.19	2,319.52	6,560.58	
สูญบุหรีจัดในปัจจุบัน	1	5.88	32	5.33	6,139	6,139	6,139	6,139.10	-	-	
สูญบุหรีไม่จัดในปัจจุบัน	2	11.76	24	4.00	2,000	15,346	8,673	8,673.00	6,673.00	9,437.05	
เคยสูญบุหรีจัดและเพิ่งเลิก	4	23.53	118	19.67	2,500	18,808	11,026	10,839.95	4,146.63	8,293.26	
เคยสูญบุหรีไม่จัดและเพิ่งเลิก	1	5.88	42	7.00	20,539	20,539	20,539	20,539.00	-	-	
เคยสูญบุหรีไม่จัดและเลิกมานาน	1	5.88	27	4.50	5,500	5,500	5,500	5,500.00	-	-	
รวม	17	100.00	600	100.00	2,000	20,539	5,500	9,389.02	1,676.96	6,914.29	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 87 ก ค่าอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วยแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ค่าอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วย (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	12	31.58	324	54.00	200	12,000	3,250	3,808.33	899.28	3,115.20	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	2	5.26	32	5.33	200	6,000	3,100	3,100.00	2,900.00	4,101.22	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	1	2.63	24	4.00	5,000	5,000	5,000	5,000.00	-	-	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	13	34.21	118	19.67	300	36,000	2,000	9,769.23	3,694.65	13,321.25	
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	3	7.89	33	5.50	2,500	4,200	4,000	3,566.67	536.45	929.16	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	2	5.26	42	7.00	2,000	4,000	3,000	3,000.00	1,000.00	1,414.21	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	5	13.16	27	4.50	1,500	24,000	12,000	10,400.00	4,072.47	9,106.32	
รวม	38	100.00	600	100.00	200	36,000	4,000	6,647.37	1,452.24	8,952.21	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 88 ก ค่าสาธารณสุขโลกที่เพิ่มขึ้นจากปกติแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ค่าสาธารณสุขโลกที่เพิ่มขึ้นจากปกติ (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	4	36.36	324	54.00	1,500	12,900	8,862	8,030.75	2,891.94	5,783.87	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	1	9.09	118	19.67	1,500	1,500	1,500	1,500.00	-	-	
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	1	9.09	33	5.50	4,009	4,009	4,009	4,009.00	-	-	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	4	36.36	42	7.00	3,978	4,823	4,401	4,400.83	235.33	470.66	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	1	9.09	27	4.50	3,978	3,978	3,978	3,978.00	-	-	
รวม	11	100.00	600	100.00	1,500	12,900	4,009	5,383.03	1,174.98	3,896.98	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 89 ก ลักษณะการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่ป่วยแยกตามสถานะการสูญบุตร

สถานะการสูญบุตรของผู้ป่วย	ประเภทการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย														รวม	
	จ่ายเอง		บัตรทอง		บัตรประกันสังคม		บัตร สป.ร.		สิทธิข้าราชการ		บัตรผู้สูงอายุ		บัตรทหารผ่านศึก		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญบุตร	3	0.50	259	43.17	4	0.67	-	-	57	9.50	1	0.17	-	-	324	54.00
สูญบุตรจัดในบึงจวบ	-	-	19	3.17	1	0.17	-	-	9	1.50	2	0.33	1	0.17	32	5.33
สูญบุตรไม่จัดในบึงจวบ	1	0.17	19	3.17	2	0.33	-	-	2	.33	-	-	-	-	24	4.00
เคยสูญบุตรจัดและเพ็งเด็ก	-	-	94	15.67	2	0.33	1	0.17	17	2.83	3	0.50	1	0.17	118	19.67
เคยสูญบุตรจัดและเด็กมานาน	-	-	20	3.33	-	-	-	-	13	2.17	-	-	-	-	33	5.50
เคยสูญบุตรไม่จัดและเพ็งเด็ก	1	0.17	37	6.17	1	0.17	-	-	3	.50	-	-	-	-	42	7.00
เคยสูญบุตรไม่จัดและเด็กมานาน	-	-	21	3.50	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-	27	4.50
รวม	5	0.83	469	78.17	10	1.67	1	0.17	107	17.83	6	1.00	2	0.33	600	100.00

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 90 ก จำนวนวันที่ผู้ป่วยคงงานทั้งหมดแยกตามสถานะการสูญบุตร

สถานะการสูญบุตรของผู้ป่วย	จำนวนวันที่ผู้ป่วยคงงานทั้งหมด (วัน/ปี)											รวม		
	จำนวนที่ปรากฏ		ร้อยละ		จำนวนทั้งหมด		ร้อยละ		ค่าเฉลี่ย		ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยสูญบุตร	66	54.55	324	54.00	1	135	12	17.29	2.91	23.64	23.64	324	54.00	
สูญบุตรจัดในบึงจวบ	6	4.96	32	5.33	3	60	8	15.50	8.96	21.95	21.95	32	5.33	
สูญบุตรไม่จัดในบึงจวบ	9	7.44	24	4.00	1	50	7	13.44	5.09	15.26	15.26	24	4.00	
เคยสูญบุตรจัดและเพ็งเด็ก	21	17.36	118	19.67	3	120	12	19.43	5.40	24.73	24.73	118	19.67	
เคยสูญบุตรจัดและเด็กมานาน	4	3.31	33	5.50	5	30	18	17.75	5.36	10.72	10.72	33	5.50	
เคยสูญบุตรไม่จัดและเพ็งเด็ก	13	10.74	42	7.00	6	30	15	15.92	1.71	6.16	6.16	42	7.00	
เคยสูญบุตรไม่จัดและเด็กมานาน	2	1.65	27	4.50	1	50	26	25.50	24.50	34.65	34.65	27	4.50	
รวม	121	100.00	600	100.00	1	135	12	17.29	1.95	21.46	21.46	600	100.00	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 91 ก จำนวนวันที่ไม่สามารถทำงานประจำวันได้เพราะปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนวันที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำงานประจำวันได้ (วัน/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูบบุหรี่	133	52.78	324	54.00	1	135	15	23.66	2.27	26.21	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	13	5.16	32	5.33	3	200	12	37.38	15.61	56.28	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	9	3.57	24	4.00	1	20	5	6.67	1.83	5.50	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเด็ก	58	23.02	118	19.67	2	150	19	28.26	4.07	30.97	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	10	3.97	33	5.50	2	200	31	48.40	18.29	57.84	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	22	8.73	42	7.00	5	65	14	16.95	2.90	13.61	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	7	2.78	27	4.50	1	120	20	34.71	15.61	41.31	
รวม	252	100.00	600	100.00	1	200	15	25.52	1.95	31.00	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 92 ก จำนวนวันที่หยุดงานเป็นเวลานานเพราะปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการสูบบุหรี่

สภาวะการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย	จำนวนระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องหยุดงานเป็นเวลานาน (วัน/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูบบุหรี่	46	50.55	324	54.00	2	30	5	6.30	0.70	4.74	
สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน	5	5.49	32	5.33	3	10	5	5.60	1.33	2.97	
สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน	5	5.49	24	4.00	2	30	4	9.40	5.21	11.65	
เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเด็ก	22	24.18	118	19.67	2	30	7	10.05	1.52	7.11	
เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกมานาน	4	4.40	33	5.50	4	14	7	8.00	2.12	4.24	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	8	8.79	42	7.00	3	7	5	4.63	0.46	1.30	
เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกมานาน	1	1.10	27	4.50	20	20	20	20.00	-	-	
รวม	91	100.00	600	100.00	2	30	5	7.42	0.62	5.95	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 93 ก จำนวนครั้งที่เปลี่ยนชั่วโมงการทำงานเพราะปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยแยกตามสถานภาพการสูญบุหรี

สถานะการสูญบุหรีของผู้ป่วย	จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนชั่วโมงการทำงาน (ครั้ง/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มัชยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุหรี	15	62.50	324	54.00	1	2	1	1.40	0.13	0.51	
สูญบุหรีจัดในปัจจุบัน	1	4.17	32	5.33	1	1	1	1.00	-	-	
สูญบุหรีไม่จัดในปัจจุบัน	1	4.17	24	4.00	1	1	1	1.00	-	-	
เคยสูญบุหรีจัดและเพิ่งเลิก	3	12.50	118	19.67	1	2	2	1.67	0.33	0.58	
เคยสูญบุหรีจัดและเลิกมานาน	1	4.17	33	5.50	1	1	1	1.00	-	-	
เคยสูญบุหรีไม่จัดและเพิ่งเลิก	3	12.50	42	7.00	1	1	1	1.00	-	-	
รวม	24	100.00	600	100.00	1	2	1	1.33	0.10	0.48	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 94 ก จำนวนครั้งและจำนวนชั่วโมงทำงานที่ต้องลดลงแยกตามสถานภาพการสูญบุหรี

สถานะการสูญบุหรีของผู้ป่วย	จำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้ป่วยที่ต้องลดลงต่อครั้ง (ชั่วโมง/ครั้ง)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มัชยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุหรี	15	62.50	324	54.00	1	3	2	1.80	0.20	0.77	
สูญบุหรีจัดในปัจจุบัน	1	4.17	32	5.33	2	2	2	2.00	-	-	
สูญบุหรีไม่จัดในปัจจุบัน	1	4.17	24	4.00	1	1	1	1.00	-	-	
เคยสูญบุหรีจัดและเพิ่งเลิก	3	12.50	118	19.67	1	5	1	2.33	1.33	2.31	
เคยสูญบุหรีจัดและเลิกมานาน	1	4.17	33	5.50	1	1	1	1.00	-	-	
เคยสูญบุหรีไม่จัดและเพิ่งเลิก	3	12.50	42	7.00	2	10	2	4.67	2.67	4.62	
รวม	24	100.00	600	100.00	1	10	2	2.17	0.39	1.93	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 95 ก จำนวนชั่วโมงที่เสียไปเพราะปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยในปีที่ผ่านมาแยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	จำนวนชั่วโมงที่ผู้ป่วยเสียไปเพื่อไปพบแพทย์ (ชั่วโมง/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	312	55.61	324	54.00	1	96	36	35.46	1.16	20.57	
สูญพันธุ์จัดในปีปัจจุบัน	25	4.46	32	5.33	2	104	28	30.00	4.89	24.43	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปีปัจจุบัน	18	3.21	24	4.00	1	60	24	24.94	3.37	14.30	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	111	19.79	118	19.67	2	96	30	33.10	2.06	21.74	
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	33	5.88	33	5.50	2	60	36	30.06	3.02	17.33	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	40	7.13	42	7.00	2	100	36	36.05	3.43	21.67	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	22	3.92	27	4.50	4	60	24	29.68	3.37	15.81	
รวม	561	100.00	600	100.00	1	104	33	33.91	0.87	20.63	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 96 ก เพศของผู้ป่วย

เพศของผู้ป่วย	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ระบุเพศ	158	26.3
เพศชาย	110	18.3
เพศหญิง	332	55.3
รวม	600	100.0

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 97 ก อาชีพของญาติผู้ป่วยแยกตามเพศ

อาชีพญาติผู้ป่วย	เพศชาย						เพศหญิง						รวม	
	จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ						
ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว	14	3.54	20	5.06	34	8.61								
พนักงานบริษัทเอกชน	5	1.27	14	3.54	19	4.81								
ผู้ให้บริการ, ธุรกรรมกร	11	2.78	10	2.53	21	5.32								
ว่างงาน, กำลังหางาน	1	0.25	7	1.77	8	2.03								
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ	10	2.53	19	4.81	29	7.34								
เกษตรกร, รับจ้าง	57	14.43	138	34.94	195	49.37								
แม่บ้าน	-	-	80	20.25	80	20.25								
นักเรียน, นักศึกษา	3	0.76	4	1.01	7	1.77								
อาชีพอื่นๆ	-	-	2	0.51	2	0.51								
รวม	101	25.57	294	74.43	395	100.00								

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 98 ก รายได้ปัจจุบันของญาติผู้ป่วยแยกตามเพศ

เพศญาติผู้ป่วย	รายได้ปัจจุบันของญาติผู้ป่วย (บาท/เดือน)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศชาย	96	32.76	110	18.33	200	30000	4000	5950.35	561.25	5499.09
เพศหญิง	197	67.24	332	55.33	300	50000	3000	5345.75	421.39	5914.56
รวม	293	100.00	600	100.00	200	50000	3400	5543.85	337.63	5779.29

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 99 ก รายได้ปัจจุบันของญาติผู้ป่วยที่จัดเป็น 8 กลุ่มแยกตามเพศ

รายได้ปัจจุบันญาติผู้ป่วย (บาท/เดือน)	ไม่มีญาติ						เพศญาติผู้ป่วย						รวม	
	จำนวน		ร้อยละ	เพศชาย		ร้อยละ	จำนวน		ร้อยละ	เพศหญิง		ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ						
ไม่มีรายได้	158	26.33	14	2.33	135	22.50	307	51.17						
น้อยกว่า 5,000 บาท	-	-	61	10.17	131	21.83	192	32.00						
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท	-	-	22	3.67	47	7.83	69	11.50						
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท	-	-	9	1.50	10	1.67	19	3.17						
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท	-	-	2	0.33	6	1.00	8	1.33						
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท	-	-	2	0.33	2	0.33	4	0.67						
มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17						
รวม	158	26.33	110	18.33	332	55.33	600	100.00						

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 100 ก เวลาที่ญาติผู้ป่วยใช้เดินทางมายังโรงพยาบาลแต่ละครั้งแยกตามเพศ

เพศญาติผู้ป่วย	เวลาที่ญาติผู้ป่วยใช้เดินทางมายังโรงพยาบาลแต่ละครั้ง (นาที/ครั้ง)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศชาย	109	24.83	110	18.33	4	210	30	46.18	3.54	36.91
เพศหญิง	330	75.17	332	55.33	2	330	30	46.52	2.23	40.50
รวม	439	100.00	600	100.00	2	330	30	46.43	1.89	39.60

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 101 ก ค่าใช้จ่ายของญาติผู้ป่วยที่ใช้ในการเดินทางมายังโรงพยาบาลแยกตามเพศ

เพศญาติผู้ป่วย	ค่าใช้จ่ายของญาติผู้ป่วยที่ใช้ในการเดินทางมายังโรงพยาบาล (บาท/ครั้ง)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศชาย	105	25.49	110	18.33	10	2000	80	123.75	21.90	224.39
เพศหญิง	307	74.51	332	55.33	10	900	75	120.75	8.17	143.08
รวม	412	100.00	600	100.00	10	2000	78	121.52	8.24	167.29

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 102 ก การเดินทางของญาติผู้ป่วยมายังผู้ป่วยแยกตามเพศ

เพศญาติผู้ป่วย	ญาติผู้ป่วยเดินทางมาผู้ป่วยทุกครั้งหรือไม่										รวม	
	ไม่ได้มาด้วย					ทุกครั้ง					จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ไม่ได้เดินทางมาผู้ป่วย	158	26.33	-	-	-	-	-	-	-	-	158	26.33
เพศชาย	2	0.33	69	11.50	39	6.50	110	18.33	18.33			
เพศหญิง	5	0.83	227	37.83	100	16.67	332	55.33	55.33			
รวม	165	27.50	296	49.33	139	23.17	600	100.00	100.00			

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 103 ก จำนวนครั้งที่ญาติผู้ป่วยเดินทางมาผู้ป่วยด้วยแยกตามเพศ

เพศญาติผู้ป่วย	จำนวนครั้งที่ญาติผู้ป่วยเดินทางมาผู้ป่วยด้วย (ครั้ง/ปี)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศชาย	108	24.83	110	18.33	1	26	7	7.71	0.53	5.55
เพศหญิง	327	75.17	332	55.33	1	30	6	7.16	0.29	5.17
รวม	435	100.00	600	100.00	1	30	6	7.29	0.25	5.26

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 104 ก การกลางนหรือหยุดงานทั้งวันของญาติผู้ป่วยแยกตามเพศ

	เพศญาติผู้ป่วย						รวม	
	เพศชาย			เพศหญิง			จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่ได้	20	5.56	27	7.50	47	13.06		
ใช่	66	18.33	135	37.50	201	55.83		
ไม่ได้ทำงาน	9	2.50	103	28.61	112	31.11		
รวม	95	26.39	265	73.61	360	100.00		

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 105 ก เวลาที่ญาติผู้ป่วยนอกต้องลาหรือหยุดงานแยกตามเพศ

เพศญาติผู้ป่วย	เวลาที่ญาติผู้ป่วยนอกต้องลาหรือหยุดงาน (นาที/ครั้ง)							ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	
เพศชาย	20	42.55	110	18.33	120	360	15.33	68.55
เพศหญิง	27	57.45	332	55.33	30	360	15.95	82.90
รวม	47	100.00	600	100.00	30	360	11.14	76.38

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 106 ก เวลาที่ญาติผู้ป่วยนอกรอขณะผู้ป่วยรับการรักษาแยกตามเพศ

เพศญาติผู้ป่วย	เวลาที่ญาติผู้ป่วยนอกรอขณะผู้ป่วยรับการรักษา (นาที/ครั้ง)							ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	
เพศชาย	95	26.10	110	18.33	30	480	211.37	95.13
เพศหญิง	269	73.90	332	55.33	10	480	219.90	90.28
รวม	364	100.00	600	100.00	10	480	217.67	91.51

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 107 ก จำนวนวันที่ญาติผู้ป่วยในต้องขาดงานเพื่ออยู่ดูแลผู้ป่วยแยกตามเพศ

เพศญาติผู้ป่วย	จำนวนวันที่ญาติผู้ป่วยในต้องขาดงานเพื่ออยู่ดูแลผู้ป่วย (วัน/ครั้ง)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศชาย	57	19.72	110	18.33	1	12	3	3.72	0.31	2.30
เพศหญิง	232	80.28	332	55.33	1	30	4	5.14	0.30	4.61
รวม	289	100.00	600	100.00	1	30	3	4.86	0.25	4.29

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 108 ก ต้นทุนส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสถานะการสูญบุหรี

สถานะการสูญบุหรีของผู้ป่วย	ต้นทุนส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ป่วย (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคสูญบุหรี	324	54.00	324	54.00	650.10	190,457.20	24,382.50	32,512.42	1,532.84	27,591.04	
สูญบุหรีจัดในปัจจุบัน	32	5.33	32	5.33	230.86	145,051.00	24,439.22	30,504.85	5,216.31	29,507.91	
สูญบุหรีไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	24	4.00	2,890.00	117,892.50	21,744.20	36,154.45	6,697.05	32,808.71	
เคสูญบุหรีจัดและเพิ่งเกิด	118	19.67	118	19.67	2,900.57	150,278.00	35,935.92	41,688.04	2,566.09	27,874.83	
เคสูญบุหรีจัดและเลิกมานาน	33	5.50	33	5.50	3,862.02	93,546.89	33,013.54	36,784.99	4,278.47	24,577.94	
เคสูญบุหรีไม่จัดและเพิ่งเกิด	42	7.00	42	7.00	4,138.50	93,053.46	19,819.95	28,996.30	3,589.36	23,261.71	
เคสูญบุหรีไม่จัดและเลิกมานาน	27	4.50	27	4.50	2,734.68	154,371.17	35,802.67	47,876.01	7,581.93	39,396.84	
รวม	600	100.00	600	100.00	230.86	190,457.20	26,901.12	35,035.79	1,161.04	28,439.52	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 109 ก ค่ามากที่สุดของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยใน ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ค่ามากที่สุดของค่าใช้จ่ายพยาบาลรวมผู้ป่วยใน (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	243	51.37	324	54.00	680	413,377	25,620	49,898.32	4,400.45	68,596.25	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	27	5.71	32	5.33	200	241,783	15,079	46,842.56	12,183.29	63,306.24	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	21	4.44	24	4.00	4,225	134,767	18,198	26,558.43	6,627.01	30,368.77	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	104	21.99	118	19.67	1,180	242,133	28,432	55,901.27	6,149.98	62,717.73	
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	26	5.50	33	5.50	2,713	241,783	26,901	60,908.31	13,989.52	71,332.83	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	29	6.13	42	7.00	2,984	175,064	18,257	38,847.69	9,087.38	48,937.03	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	23	4.86	27	4.50	7,030	241,883	40,600	79,299.26	16,613.06	79,673.46	
รวม	473	100.00	600	100.00	200	413,377	23,364	51,364.86	3,023.89	65,765.20	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 110 ก ค่าน้อยที่สุดของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยใน ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ค่าน้อยที่สุดของค่าใช้จ่ายพยาบาลรวมผู้ป่วยใน (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	243	51.37	324	54.00	105	75,764	2,316	4,525.19	573.51	8,940.10	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	27	5.71	32	5.33	200	12,385	2,600	4,242.56	657.38	3,415.86	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	21	4.44	24	4.00	260	12,325	2,057	3,564.86	756.43	3,466.41	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเลิก	104	21.99	118	19.67	390	54,446	2,505	5,034.05	638.06	6,506.97	
เคยสูญพันธุ์จัดและเลิกมานาน	26	5.50	33	5.50	210	50,000	2,588	7,555.08	2,345.09	11,957.65	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเลิก	29	6.13	42	7.00	1,260	21,406	2,459	3,785.10	790.38	4,256.31	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเลิกมานาน	23	4.86	27	4.50	641	40,600	2,516	6,321.48	2,072.86	9,941.09	
รวม	473	100.00	600	100.00	105	75,764	2,399	4,786.82	371.71	8,084.25	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 111 ก ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยใน ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการสูญบุหนรี

สภาวะการสูญบุหนรีของผู้ป่วย	ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายพยาบาลรวมผู้ป่วยใน (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุหนรี	243	51.37	324	54.00	680	90,892	10,448	15,324.95	929.62	14,491.27	
สูญบุหนรีจัดในบัจจุบัน	27	5.71	32	5.33	200	51,989	11,157	13,580.30	2,227.35	11,573.63	
สูญบุหนรีไม่จัดในบัจจุบัน	21	4.44	24	4.00	4,225	20,929	9,422	10,081.52	973.16	4,459.58	
เคยสูญบุหนรีจัดเคยและเพ็งเล็ก	104	21.99	118	19.67	1,180	54,447	13,876	16,956.65	1,075.10	10,963.88	
เคยสูญบุหนรีจัดเคยเดกเคยมานาน	26	5.50	33	5.50	2,713	50,000	13,089	18,375.81	2,563.28	13,070.23	
เคยสูญบุหนรีไม่จัดและเพ็งเล็ก	29	6.13	42	7.00	2,984	56,471	9,502	12,697.38	2,126.48	11,451.45	
เคยสูญบุหนรีไม่จัดและเดกมานาน	23	4.86	27	4.50	4,416	52,089	16,120	21,746.39	3,034.60	14,553.44	
รวม	473	100.00	600	100.00	200	90,892	11,701	15,670.18	605.88	13,176.92	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 112 ก ค่ามากที่สุดของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยนอก ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการสูญบุหนรี

สภาวะการสูญบุหนรีของผู้ป่วย	ค่ามากที่สุดของค่าใช้จ่ายพยาบาลรวมผู้ป่วยนอก (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุหนรี	313	55.79	324	54.00	70	108,960	8,040	15,788.86	1,152.59	20,391.45	
สูญบุหนรีจัดในบัจจุบัน	24	4.28	32	5.33	761	94,815	6,255	12,161.76	3,940.70	19,305.43	
สูญบุหนรีไม่จัดในบัจจุบัน	18	3.21	24	4.00	1,448	94,728	19,605	23,618.42	5,662.01	24,021.89	
เคยสูญบุหนรีจัดเคยและเพ็งเล็ก	110	19.61	118	19.67	224	108,960	7,299	14,546.38	1,689.51	17,719.75	
เคยสูญบุหนรีจัดเคยเดกเคยมานาน	33	5.88	33	5.50	254	81,420	5,490	14,046.52	3,292.68	18,914.99	
เคยสูญบุหนรีไม่จัดและเพ็งเล็ก	40	7.13	42	7.00	800	45,888	7,050	12,120.56	1,880.72	11,894.72	
เคยสูญบุหนรีไม่จัดและเดกมานาน	23	4.10	27	4.50	450	108,528	13,200	24,802.70	6,113.65	29,320.03	
รวม	561	100.00	600	100.00	70	108,960	7,500	15,646.79	841.20	19,924.15	

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 113 ก ค่าเฉลี่ยที่สุดของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยนอก I ปี แยกตามสภาวะการสูญบุหรื

สภาวะการสูญบุหรืของผู้ป่วย	ค่าเฉลี่ยที่สุดของค่าใช้จ่ายพยาบาลรวมผู้ป่วยนอก (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุหรื	313	55.79	324	54.00	70	108,960	6,720	13,364.12	1,081.43	19,132.51	
สูญบุหรืจัดใหม่ปัจจุบัน	24	4.28	32	5.33	155	94,815	4,786	10,791.28	3,988.52	19,539.69	
สูญบุหรืไม่จัดใหม่ปัจจุบัน	18	3.21	24	4.00	528	94,728	8,693	19,568.83	5,779.00	24,518.20	
เคยสูญบุหรืจัดและเพ็งเด็ก	110	19.61	118	19.67	130	108,960	6,630	13,503.50	1,680.86	17,629.04	
เคยสูญบุหรืจัดและเด็กมีกามาน	33	5.88	33	5.50	252	81,420	5,490	11,379.42	2,646.46	15,202.76	
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเพ็งเด็ก	40	7.13	42	7.00	480	45,888	5,780	10,766.62	1,925.57	12,178.40	
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเด็กมีกามาน	23	4.10	27	4.50	265	108,528	6,420	20,069.83	5,905.63	28,322.40	
รวม	561	100.00	600	100.00	70	108,960	6,540	13,453.44	798.27	18,907.48	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 114 ก ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยนอก I ปี แยกตามสภาวะการสูญบุหรื

สภาวะการสูญบุหรืของผู้ป่วย	ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายพยาบาลรวมผู้ป่วยนอก (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุหรื	313	55.79	324	54.00	70	107,760	6,540	13,626.16	1,070.60	18,940.87	
สูญบุหรืจัดใหม่ปัจจุบัน	24	4.28	32	5.33	461	98,977	10,150	25,484.03	6,247.63	34,219.67	
สูญบุหรืไม่จัดใหม่ปัจจุบัน	18	3.21	24	4.00	940	94,488	13,920	20,035.81	5,245.96	22,866.61	
เคยสูญบุหรืจัดและเพ็งเด็ก	110	19.61	118	19.67	153	107,760	6,400	13,134.82	1,680.67	17,384.98	
เคยสูญบุหรืจัดและเด็กมีกามาน	33	5.88	33	5.50	240	81,180	4,990	12,644.36	2,790.57	16,030.63	
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเพ็งเด็ก	40	7.13	42	7.00	600	45,528	6,000	10,731.36	1,855.76	11,589.19	
เคยสูญบุหรืไม่จัดและเด็กมีกามาน	23	4.10	27	4.50	270	107,760	12,000	22,056.13	5,734.81	27,503.18	
รวม	561	100.00	600	100.00	70	107,760	6,540	14,465.77	839.77	19,943.46	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 115 ก ค่าใช้จ่ายในการชื้อยารักษาทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสถานะการสูญบุพหุ

สถานะการสูญบุพหุของผู้ป่วย	ค่าใช้จ่ายรวมที่ผู้ป่วยชื้อยารักษาโรค (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุพหุ	41	32.54	324	54.00	20	20,000	2,495	3,836.68	622.52	3,986.08	
สูญบุพหุจัดในปัจจุบัน	9	7.14	32	5.33	545	8,260	2,495	3,662.71	774.37	2,323.12	
สูญบุพหุไม่จัดในปัจจุบัน	7	5.56	24	4.00	110	9,696	3,000	2,889.14	1,256.21	3,323.63	
เคยสูญบุพหุจัดและเพิ่งเลิก	40	31.75	118	19.67	20	20,000	2,495	3,151.02	662.60	4,190.63	
เคยสูญบุพหุจัดและเลิกมานาน	12	9.52	33	5.50	20	7,290	2,495	2,410.24	538.48	1,865.35	
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเพิ่งเลิก	11	8.73	42	7.00	786	13,347	2,495	3,490.98	1,058.48	3,510.58	
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเลิกมานาน	6	4.76	27	4.50	351	8,260	1,641	2,616.43	1,225.48	3,001.80	
รวม	126	100.00	600	100.00	20	20,000	2,495	3,329.81	325.05	3,648.70	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 116 ก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสถานะการสูญบุพหุ

สถานะการสูญบุพหุของผู้ป่วย	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นรวม (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญบุพหุ	36	34.62	324	54.00	200	20,539	3,798	5,098.96	781.21	4,687.27	
สูญบุพหุจัดในปัจจุบัน	6	5.77	32	5.33	200	6,139	3,146	3,605.02	904.84	2,216.39	
สูญบุพหุไม่จัดในปัจจุบัน	8	7.69	24	4.00	1,750	15,346	3,175	5,679.71	1,806.05	5,108.28	
เคยสูญบุพหุจัดและเพิ่งเลิก	27	25.96	118	19.67	300	36,000	3,350	8,311.11	1,985.41	10,316.51	
เคยสูญบุพหุจัดและเลิกมานาน	7	6.73	33	5.50	1,500	6,139	4,000	3,514.01	588.08	1,555.91	
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเพิ่งเลิก	9	8.65	42	7.00	1,500	20,539	4,009	5,793.59	1,909.02	5,727.05	
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเลิกมานาน	11	10.58	27	4.50	1,500	24,000	3,750	6,654.08	2,060.49	6,833.88	
รวม	104	100.00	600	100.00	200	36,000	3,797	6,009.29	665.51	6,786.86	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 117 ก ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีขยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	324	54.00	324	54.00	270	184,647	18,365	25,500.92	1,393.63	25,085.31	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	32	5.33	32	5.33	2,947	106,633	24,307	35,390.71	5,228.22	30,930.59	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.00	24	4.00	2,500	115,377	19,789	26,873.44	4,887.11	24,435.54	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	118	19.67	118	19.67	660	134,137	27,390	29,957.97	1,926.15	20,655.61	
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	33	5.50	33	5.50	3,000	84,421	26,139	28,573.70	3,696.58	21,235.23	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	42	7.00	42	7.00	1,638	78,571	14,502	20,780.54	2,845.22	18,218.31	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	27	4.50	27	4.50	2,126	149,149	34,086	40,436.20	7,010.93	36,429.84	
รวม	600	100.00	600	100.00	270	184,647	20,161	27,507.81	1,016.76	24,905.49	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 118 รายได้ของผู้ป่วยที่สูญเสียไปเนื่องจากการขจัดเนื้อมะเร็งในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	รายได้ที่สูญเสียไปของผู้ป่วย (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีขยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	194	54.96	324	54.00	33.33	28,560.00	2,610	3,436.63	274.90	3,828.96	
สูญพันธุ์จัดในปัจจุบัน	16	4.53	32	5.33	408.00	27,200.00	3,060	6,356.54	2,000.45	8,001.81	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	11	3.12	24	4.00	100.00	3,264.00	1,360	1,464.86	286.97	951.79	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	72	20.40	118	19.67	138.83	49,640.00	2,312	5,018.92	1,037.33	8,802.03	
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	18	5.10	33	5.50	272.00	8,840.00	3,536	3,713.11	666.16	2,826.26	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	28	7.93	42	7.00	408.00	49,640.00	1,791	4,206.50	1,722.94	9,116.92	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	14	3.97	27	4.50	136.00	8,160.00	2,040	3,374.29	791.21	2,960.43	
รวม	353	100.00	600	100.00	33.33	49,640.00	2,100	3,902.96	311.99	5,861.67	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 119 ก รายได้ของญาติผู้ช่วยที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดทุนเพราะอุบัติเหตุผู้ช่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามเพศ

เพศญาติผู้ช่วย	รายได้ที่สูญเสียไปของญาติผู้ช่วย (บาท/ปี)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ค่าสุด	สูงสุด	มีฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศชาย	85	23.74	110	18.33	27.77	84,000.00	3,808.00	6,012.56	1,114.39	10,274.20
เพศหญิง	273	76.26	332	55.33	13.33	102,666.67	2,856.00	6,814.75	704.30	11,636.92
รวม	358	100.00	600	100.00	13.33	102,666.67	3,116.67	6,624.29	598.25	11,319.44

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 120 ก ต้นทุนค่าเสียเวลาในการเดินทางและรอรับการตรวจของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสถานะการสูญบุพหุ

สถานะการสูญบุพหุของผู้ป่วย	ค่าเสียเวลาของผู้ป่วย (บาท/ปี)									
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มีฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เคยสูญบุพหุ	319	54.81	324	54.00	0.40	6,488.10	612	678.65	35.32	630.81
สูญบุพหุจัดในปัจจุบัน	29	4.98	32	5.33	2.83	1,768.00	306	453.98	82.51	444.34
สูญบุพหุไม่จัดในปัจจุบัน	20	3.44	24	4.00	2.83	1,020.00	374	372.48	58.63	262.20
เคยสูญบุพหุจัดและเพิ่งเลิก	115	19.76	118	19.67	2.83	6,696.43	510	646.56	68.50	734.61
เคยสูญบุพหุจัดและเลิกมานาน	33	5.67	33	5.50	34.00	7,800.00	612	725.34	227.87	1,308.99
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเพิ่งเลิก	41	7.04	42	7.00	2.83	1,735.71	615	654.41	65.86	421.70
เคยสูญบุพหุไม่จัดและเลิกมานาน	25	4.30	27	4.50	2.38	3,428.57	414	587.40	131.50	657.52
รวม	582	100.00	600	100.00	0.40	7,800.00	607	647.61	28.28	682.22

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 121 ก ต้นทุนค่าเสียเวลาในการเดินทางและรอขณะผู้ป่วยรับการตรวจรักษาของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี เขตตามเขต

เพศของผู้ป่วย	ค่าเสียเวลาของผู้ป่วย (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความแตกต่างต่อคนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เพศชาย	108	24.88	110	18.33	1.45	7,500.00	442.27	868.77	117.63	1,222.46	
เพศหญิง	326	75.12	332	55.33	0.39	22,005.21	367.46	746.77	87.36	1,577.28	
รวม	434	100.00	600	100.00	0.39	22,005.21	372.00	777.13	71.83	1,496.45	

ที่มา: จากการศึกษา

ตาราง 122 ก ต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี เขตตามสถานะการสูญพันธุ์

สถานะการสูญพันธุ์ของผู้ป่วย	ต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดของผู้ป่วย (บาท/ปี)										
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความแตกต่างต่อคนมาตรฐาน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ไม่เคยสูญพันธุ์	324	54.18	324	54.00	0.39	77,562.08	3,869.55	6,099.77	434.08	7,813.40	
สูญพันธุ์ในปัจจุบัน	32	5.35	32	5.33	30.86	73,161.38	1,977.79	8,506.34	2,646.98	14,973.59	
สูญพันธุ์ไม่จัดในปัจจุบัน	24	4.01	24	4.00	6.09	92,061.00	1,967.75	9,268.83	4,399.55	21,553.29	
เคยสูญพันธุ์จัดและเพิ่งเด็ก	118	19.73	118	19.67	47.25	107,561.00	4,438.87	10,851.76	1,531.78	16,639.44	
เคยสูญพันธุ์จัดและเด็กมานาน	33	5.52	33	5.50	102.00	49,052.61	4,778.28	7,451.05	1,633.45	9,383.43	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเพิ่งเด็ก	41	6.86	42	7.00	614.83	51,730.20	3,958.40	7,125.11	1,494.15	9,567.20	
เคยสูญพันธุ์ไม่จัดและเด็กมานาน	26	4.35	27	4.50	33.04	35,343.00	3,249.56	6,689.34	1,731.99	8,831.46	
รวม	598	100.00	600	100.00	0.39	107,561.00	3,807.49	7,463.92	474.17	11,595.28	

ที่มา: จากการศึกษา

ภาคผนวก ข

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS})

ตาราง 1 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	473	2.90	11.72	7.65	3,620.50
EXP_{NS} (INPATIENT)	473	2.57	10.35	7.11	3,365.03
EXP_A (OUTPATIENT)	561	2.87	11.29	8.61	4,831.18
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	561	3.36	10.63	8.56	4,801.45
EXP_A (DRUG)	126	0.19	7.00	2.27	285.91
EXP_{NS} (DRUG)	126	-0.58	6.94	1.45	182.95
EXP_A (OTHER)	104	-1.72	4.91	1.69	175.65
EXP_{NS} (OTHER)	104	-0.61	3.82	1.20	124.40

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 2 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยเพศชาย

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	283	2.90	11.72	7.84	2,218.75
EXP_{NS} (INPATIENT)	283	2.57	10.35	6.94	1,964.94
EXP_A (OUTPATIENT)	323	2.87	11.29	8.50	2,746.96
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	323	3.36	10.63	8.41	2,715.56
EXP_A (DRUG)	94	0.29	7.00	2.60	244.03
EXP_{NS} (DRUG)	94	-0.58	6.94	1.51	142.07
EXP_A (OTHER)	76	-1.72	4.91	1.78	135.35
EXP_{NS} (OTHER)	76	-0.61	3.82	1.17	88.64

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 3 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยเพศหญิง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	190	4.45	10.12	7.38	1,401.75
EXP_{NS} (INPATIENT)	190	4.45	10.12	7.37	1,400.09
EXP_A (OUTPATIENT)	238	6.06	10.41	8.76	2,084.21
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	238	6.06	10.41	8.76	2,085.89
EXP_A (DRUG)	32	0.19	3.23	1.31	41.88
EXP_{NS} (DRUG)	32	0.19	3.23	1.28	40.88
EXP_A (OTHER)	28	0.38	3.65	1.44	40.30
EXP_{NS} (OTHER)	28	0.19	3.65	1.28	35.76

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 4 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยอายุระหว่าง 18-34 ปี

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	18	3.06	8.05	5.80	104.42
EXP_{NS} (INPATIENT)	18	2.97	8.13	5.43	97.81
EXP_A (OUTPATIENT)	25	6.98	9.93	8.03	200.67
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	25	6.44	9.93	7.97	199.16
EXP_A (DRUG)	4	0.93	3.39	2.18	8.71
EXP_{NS} (DRUG)	4	0.93	3.26	1.91	7.64
EXP_A (OTHER)	3	0.30	1.78	1.28	3.84
EXP_{NS} (OTHER)	3	0.30	1.06	0.68	2.04

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 5 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยอายุระหว่าง 35-64 ปี

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	241	2.90	11.72	7.16	1,724.97
EXP_{NS} (INPATIENT)	241	2.57	10.28	6.65	1,601.47
EXP_A (OUTPATIENT)	301	2.87	11.29	8.48	2,552.09
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	301	3.36	9.78	8.41	2,530.10
EXP_A (DRUG)	69	0.32	7.00	2.30	158.72
EXP_{NS} (DRUG)	69	0.07	6.94	1.51	103.91
EXP_A (OTHER)	50	-1.72	3.98	1.22	60.94
EXP_{NS} (OTHER)	50	-0.61	3.65	1.02	50.98

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 6 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	214	5.27	11.72	8.37	1,791.11
EXP_{NS} (INPATIENT)	214	4.93	10.35	7.78	1,665.75
EXP_A (OUTPATIENT)	235	4.17	11.14	8.84	2,078.41
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	235	4.76	10.63	8.82	2,072.19
EXP_A (DRUG)	53	0.19	5.18	2.24	118.48
EXP_{NS} (DRUG)	53	-0.58	4.45	1.35	71.40
EXP_A (OTHER)	51	0.38	4.91	2.17	110.88
EXP_{NS} (OTHER)	51	0.08	3.82	1.40	71.39

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 7 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยที่ไม่ได้เรียนหนังสือ

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	52	5.63	11.72	8.75	454.76
EXP_{NS} (INPATIENT)	52	4.93	10.29	8.33	433.26
EXP_A (OUTPATIENT)	52	6.39	10.10	8.66	450.57
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	52	7.09	10.10	8.69	451.96
EXP_A (DRUG)	14	0.19	5.14	2.39	33.50
EXP_{NS} (DRUG)	14	0.19	4.29	1.85	25.94
EXP_A (OTHER)	10	0.38	4.68	2.07	20.72
EXP_{NS} (OTHER)	10	0.19	2.16	1.07	10.75

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 8 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	341	3.06	11.72	7.55	2,576.20
EXP_{NS} (INPATIENT)	341	2.97	10.28	7.02	2,395.15
EXP_A (OUTPATIENT)	408	2.87	11.14	8.64	3,526.11
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	408	3.36	10.63	8.59	3,504.75
EXP_A (DRUG)	86	0.29	4.79	1.98	170.60
EXP_{NS} (DRUG)	86	-0.48	3.75	1.09	93.74
EXP_A (OTHER)	72	-1.72	4.72	1.66	119.39
EXP_{NS} (OTHER)	72	-0.61	3.82	1.10	79.54

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 9 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	52	2.90	9.85	6.85	356.08
EXP_{NS} (INPATIENT)	52	2.61	9.46	6.28	326.47
EXP_A (OUTPATIENT)	72	6.92	11.29	8.50	612.21
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	72	6.84	10.13	8.47	609.75
EXP_A (DRUG)	13	0.65	4.78	2.33	30.31
EXP_{NS} (DRUG)	13	-0.58	3.51	1.42	18.52
EXP_A (OTHER)	12	-1.67	4.91	1.41	16.88
EXP_{NS} (OTHER)	12	0.30	2.17	1.24	14.85

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 10 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	28	4.11	11.37	8.34	233.47
EXP_{NS} (INPATIENT)	28	2.57	10.35	7.51	210.15
EXP_A (OUTPATIENT)	29	6.14	10.69	8.35	242.29
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	29	6.62	9.29	8.10	234.99
EXP_A (DRUG)	13	1.21	7.00	3.96	51.51
EXP_{NS} (DRUG)	13	1.21	6.94	3.44	44.75
EXP_A (OTHER)	10	-1.41	3.98	1.87	18.66
EXP_{NS} (OTHER)	10	0.81	3.65	1.93	19.27

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 11 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ไม่มีรายได้ส่วนบุคคลเลย

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	400	2.90	11.72	7.74	3,097.43
EXP_{NS} (INPATIENT)	400	2.61	10.35	7.22	2,886.08
EXP_A (OUTPATIENT)	475	2.87	11.29	8.72	4,140.81
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	475	3.36	10.63	8.66	4,115.18
EXP_A (DRUG)	102	0.19	5.14	2.09	212.75
EXP_{NS} (DRUG)	102	-0.58	4.29	1.21	123.27
EXP_A (OTHER)	89	-1.72	4.72	1.64	146.37
EXP_{NS} (OTHER)	89	0.08	3.82	1.18	104.99

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 12 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่มีรายได้ส่วนบุคคลน้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	37	3.06	8.76	6.56	242.62
EXP_{NS} (INPATIENT)	37	2.97	8.29	5.97	220.93
EXP_A (OUTPATIENT)	47	5.99	9.68	7.87	369.89
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	47	5.89	9.25	7.82	367.41
EXP_A (DRUG)	8	0.32	2.93	1.52	12.14
EXP_{NS} (DRUG)	8	0.09	1.96	0.95	7.60
EXP_A (OTHER)	5	0.97	2.24	1.64	8.21
EXP_{NS} (OTHER)	5	-0.61	1.68	0.47	2.33

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 13 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่มีรายได้ส่วนบุคคลระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	18	4.18	11.72	7.84	141.09
EXP_{NS} (INPATIENT)	18	4.18	10.28	7.29	131.21
EXP_A (OUTPATIENT)	19	6.98	9.48	8.27	157.05
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	19	6.44	9.40	8.29	157.56
EXP_A (DRUG)	7	0.93	4.94	3.53	24.71
EXP_{NS} (DRUG)	7	0.93	3.51	2.74	19.17
EXP_A (OTHER)	3	0.30	1.63	0.97	2.91
EXP_{NS} (OTHER)	3	0.30	1.63	0.97	2.91

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 14 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่มีรายได้ส่วนบุคคลมากกว่า 10,001 บาทต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	18	4.11	10.44	7.74	139.37
EXP_{NS} (INPATIENT)	18	2.57	9.32	7.04	126.81
EXP_A (OUTPATIENT)	20	6.06	10.13	8.17	163.43
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	20	6.06	9.29	8.06	161.29
EXP_A (DRUG)	9	1.21	7.00	4.03	36.31
EXP_{NS} (DRUG)	9	1.21	6.94	3.66	32.92
EXP_A (OTHER)	7	-1.41	4.91	2.60	18.17
EXP_{NS} (OTHER)	7	0.81	3.65	2.02	14.16

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 15 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่แต่งงานแล้ว

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	451	2.90	11.72	7.70	3,474.64
EXP_{NS} (INPATIENT)	451	2.57	10.35	7.15	3,225.90
EXP_A (OUTPATIENT)	532	2.87	11.29	8.63	4,592.53
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	532	3.36	10.63	8.58	4,563.66
EXP_A (DRUG)	123	0.29	7.00	2.30	282.34
EXP_{NS} (DRUG)	123	-0.58	6.94	1.46	179.38
EXP_A (OTHER)	99	-1.72	4.91	1.68	166.36
EXP_{NS} (OTHER)	99	-0.61	3.82	1.19	118.10

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 16 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่เป็นโสด

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	22	3.06	10.68	6.63	145.86
EXP_{NS} (INPATIENT)	22	2.97	9.17	6.32	139.14
EXP_A (OUTPATIENT)	29	6.57	10.00	8.23	238.64
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	29	6.44	10.00	8.20	237.78
EXP_A (DRUG)	3	0.19	2.46	1.19	3.57
EXP_{NS} (DRUG)	3	0.19	2.46	1.19	3.57
EXP_A (OTHER)	5	0.30	3.98	1.86	9.29
EXP_{NS} (OTHER)	5	0.30	1.62	1.26	6.30

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 17 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	395	2.90	11.72	7.82	3,089.20
EXP_{NS} (INPATIENT)	395	2.57	10.29	7.26	2,869.19
EXP_A (OUTPATIENT)	458	2.87	11.29	8.60	3,936.59
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	458	3.36	10.63	8.54	3,913.45
EXP_A (DRUG)	105	0.19	7.00	2.28	239.15
EXP_{NS} (DRUG)	105	-0.58	6.94	1.43	150.35
EXP_A (OTHER)	87	-1.72	4.91	1.74	151.02
EXP_{NS} (OTHER)	87	-0.61	3.82	1.20	104.67

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 18 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	78	3.06	11.37	6.81	531.31
EXP_{NS} (INPATIENT)	78	2.61	10.35	6.36	495.84
EXP_A (OUTPATIENT)	103	6.14	10.69	8.69	894.59
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	103	6.35	10.41	8.62	888.00
EXP_A (DRUG)	21	0.68	4.37	2.23	46.77
EXP_{NS} (DRUG)	21	0.55	4.37	1.55	32.60
EXP_A (OTHER)	17	-0.93	2.95	1.45	24.63
EXP_{NS} (OTHER)	17	0.19	2.16	1.16	19.73

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 19 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาล

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	108	4.04	10.91	7.54	814.73
EXP_{NS} (INPATIENT)	108	2.57	10.35	6.96	751.65
EXP_A (OUTPATIENT)	132	4.12	11.14	8.72	1,151.69
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	132	4.61	10.41	8.64	1,140.00
EXP_A (DRUG)	37	0.32	7.00	2.95	109.03
EXP_{NS} (DRUG)	37	-0.58	6.94	1.96	72.66
EXP_A (OTHER)	24	-1.67	4.91	1.71	41.10
EXP_{NS} (OTHER)	24	0.01	2.57	1.07	25.67

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 20 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	365	2.90	11.72	7.69	2,805.77
EXP_{NS} (INPATIENT)	365	2.61	10.28	7.16	2,613.38
EXP_A (OUTPATIENT)	429	2.87	11.29	8.58	3,679.49
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	429	3.36	10.63	8.53	3,661.44
EXP_A (DRUG)	89	0.19	5.18	1.99	176.89
EXP_{NS} (DRUG)	89	-0.48	4.45	1.24	110.29
EXP_A (OTHER)	80	-1.72	4.72	1.68	134.55
EXP_{NS} (OTHER)	80	-0.61	3.82	1.23	98.73

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 21 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคในกลุ่มมะเร็ง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	46	5.42	10.81	8.01	368.36
EXP_{NS} (INPATIENT)	46	3.91	10.29	7.17	329.73
EXP_A (OUTPATIENT)	49	2.87	10.62	7.74	379.31
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	49	3.36	9.75	7.69	376.81
EXP_A (DRUG)	13	1.48	5.14	2.71	35.27
EXP_{NS} (DRUG)	13	0.03	4.29	1.48	19.18
EXP_A (OTHER)	14	-1.44	3.09	1.95	27.35
EXP_{NS} (OTHER)	14	0.17	2.57	1.37	19.22

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 22 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นโรคในกลุ่มมะเร็ง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	427	2.90	11.72	7.62	3,252.14
EXP_{NS} (INPATIENT)	427	2.57	10.35	7.11	3,035.31
EXP_A (OUTPATIENT)	512	4.12	11.29	8.70	4,451.86
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	512	4.21	10.63	8.64	4,424.64
EXP_A (DRUG)	113	0.19	7.00	2.22	250.64
EXP_{NS} (DRUG)	113	-0.58	6.94	1.45	163.77
EXP_A (OTHER)	90	-1.72	4.91	1.65	148.31
EXP_{NS} (OTHER)	90	-0.61	3.82	1.17	105.19

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 23 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	408	2.90	11.65	7.47	3,047.39
EXP_{NS} (INPATIENT)	408	2.57	10.19	7.00	2,855.40
EXP_A (OUTPATIENT)	501	4.12	11.29	8.75	4,383.96
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	501	4.21	10.63	8.70	4,358.31
EXP_A (DRUG)	102	0.19	7.00	2.14	218.25
EXP_{NS} (DRUG)	102	-0.58	6.94	1.39	141.35
EXP_A (OTHER)	88	-1.72	4.91	1.59	139.94
EXP_{NS} (OTHER)	88	-0.61	3.82	1.17	102.67

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 24 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นโรคในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	65	4.99	11.72	8.82	573.11
EXP_{NS} (INPATIENT)	65	3.91	10.35	7.84	509.63
EXP_A (OUTPATIENT)	60	2.87	9.84	7.45	447.22
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	60	3.36	9.05	7.39	443.14
EXP_A (DRUG)	24	1.28	5.14	2.82	67.66
EXP_{NS} (DRUG)	24	0.44	4.29	1.73	41.60
EXP_A (OTHER)	16	0.88	3.08	2.23	35.72
EXP_{NS} (OTHER)	16	0.01	2.16	1.36	21.73

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 25 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	86	5.76	11.72	8.92	767.10
EXP_{NS} (INPATIENT)	86	5.71	10.35	8.01	689.09
EXP_A (OUTPATIENT)	86	4.17	11.14	8.49	729.89
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	86	4.54	10.63	8.44	725.73
EXP_A (DRUG)	27	0.29	5.14	2.54	68.54
EXP_{NS} (DRUG)	27	-0.48	4.29	1.50	40.57
EXP_A (OTHER)	24	0.97	4.72	2.64	63.43
EXP_{NS} (OTHER)	24	0.01	3.82	1.77	42.42

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 26 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	387	2.90	10.68	7.37	2,853.41
EXP_{NS} (INPATIENT)	387	2.57	9.48	6.91	2,675.94
EXP_A (OUTPATIENT)	475	2.87	11.29	8.63	4,101.28
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	475	3.36	10.41	8.58	4,075.72
EXP_A (DRUG)	99	0.19	7.00	2.20	217.38
EXP_{NS} (DRUG)	99	-0.58	6.94	1.44	142.39
EXP_A (OTHER)	80	-1.72	4.91	1.40	112.22
EXP_{NS} (OTHER)	80	-0.61	3.65	1.02	81.98

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 27 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่มีผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสูบบุหรี่

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	207	3.06	11.72	7.85	1,624.60
EXP_{NS} (INPATIENT)	207	2.57	10.35	7.36	1,523.65
EXP_A (OUTPATIENT)	230	4.12	10.77	8.42	1,936.76
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	230	4.21	10.31	8.38	1,927.58
EXP_A (DRUG)	52	0.63	7.00	2.33	121.04
EXP_{NS} (DRUG)	52	0.05	6.94	1.68	87.50
EXP_A (OTHER)	36	-1.44	3.26	1.47	53.00
EXP_{NS} (OTHER)	36	0.08	2.57	0.97	34.80

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 28 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสูบบุหรี่

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	266	2.90	11.65	7.50	1,995.91
EXP_{NS} (INPATIENT)	266	2.90	10.19	6.92	1,841.38
EXP_A (OUTPATIENT)	331	2.87	11.29	8.74	2,894.42
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	331	3.36	10.63	8.68	2,873.87
EXP_A (DRUG)	74	0.19	5.18	2.23	164.87
EXP_{NS} (DRUG)	74	-0.58	4.45	1.29	95.45
EXP_A (OTHER)	68	-1.72	4.91	1.80	122.65
EXP_{NS} (OTHER)	68	-0.61	3.82	1.32	89.60

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 29 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่มีการออกกำลังกายเป็นประจำ

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	162	2.90	10.22	7.22	1,168.92
EXP_{NS} (INPATIENT)	162	2.57	9.32	6.78	1,098.26
EXP_A (OUTPATIENT)	213	4.17	11.29	8.91	1,897.78
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	213	4.76	10.63	8.86	1,887.02
EXP_A (DRUG)	46	0.29	5.18	2.25	103.51
EXP_{NS} (DRUG)	46	-0.48	4.45	1.53	70.47
EXP_A (OTHER)	40	-1.44	4.91	1.85	73.91
EXP_{NS} (OTHER)	40	0.19	3.65	1.21	48.47

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 30 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	311	3.64	11.72	7.88	2,451.58
EXP_{NS} (INPATIENT)	311	2.61	10.35	7.29	2,266.77
EXP_A (OUTPATIENT)	348	2.87	11.02	8.43	2,933.40
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	348	3.36	10.13	8.37	2,914.42
EXP_A (DRUG)	80	0.19	7.00	2.28	182.41
EXP_{NS} (DRUG)	80	-0.58	6.94	1.41	112.48
EXP_A (OTHER)	64	-1.72	4.72	1.59	101.74
EXP_{NS} (OTHER)	64	-0.61	3.82	1.19	75.93

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 31 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรทอง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	374	3.06	11.72	7.65	2,859.27
EXP_{NS} (INPATIENT)	374	2.61	10.29	7.12	2,662.04
EXP_A (OUTPATIENT)	439	4.12	10.69	8.57	3,761.60
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	439	4.21	10.16	8.51	3,737.14
EXP_A (DRUG)	94	0.19	5.14	2.09	196.40
EXP_{NS} (DRUG)	94	0.05	4.29	1.23	115.76
EXP_A (OTHER)	75	-1.72	4.72	1.62	121.15
EXP_{NS} (OTHER)	75	-0.61	3.82	1.07	80.42

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 32 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยสิทธิของข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	79	2.90	10.91	7.51	592.91
EXP_{NS} (INPATIENT)	79	2.57	10.35	6.97	550.68
EXP_A (OUTPATIENT)	102	2.87	11.29	8.86	903.48
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	102	3.36	10.63	8.81	898.69
EXP_A (DRUG)	25	0.29	5.18	2.65	66.30
EXP_{NS} (DRUG)	25	-0.58	4.45	2.05	51.30
EXP_A (OTHER)	25	-1.32	4.91	2.01	50.33
EXP_{NS} (OTHER)	25	0.17	3.65	1.60	39.98

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 33 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีอื่นๆ เช่น จ่ายเอง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	20	5.63	10.44	8.42	168.32
EXP_{NS} (INPATIENT)	20	5.64	9.09	7.62	152.31
EXP_A (OUTPATIENT)	20	5.99	10.77	8.30	166.10
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	20	5.89	9.97	8.28	165.62
EXP_A (DRUG)	7	1.51	7.00	3.32	23.22
EXP_{NS} (DRUG)	7	0.03	6.94	2.27	15.90
EXP_A (OTHER)	4	-1.41	2.61	1.04	4.17
EXP_{NS} (OTHER)	4	0.19	2.12	1.00	4.00

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 34 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	243	2.90	10.12	7.19	1,749.44
EXP_{NS} (INPATIENT)	243	2.90	10.12	7.19	1,749.44
EXP_A (OUTPATIENT)	313	4.21	10.41	8.70	2,725.63
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	313	4.21	10.41	8.70	2,725.63
EXP_A (DRUG)	41	0.19	4.37	1.38	56.87
EXP_{NS} (DRUG)	41	0.19	4.37	1.38	56.87
EXP_A (OTHER)	36	0.30	3.65	1.22	44.05
EXP_{NS} (OTHER)	36	0.30	3.65	1.22	44.05

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 35 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัดในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	26	5.57	10.91	7.99	207.90
EXP_{NS} (INPATIENT)	26	4.84	10.35	7.31	190.10
EXP_A (OUTPATIENT)	24	2.87	9.24	6.94	182.77
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	24	3.36	9.97	7.61	166.72
EXP_A (DRUG)	9	1.26	5.14	3.07	27.66
EXP_{NS} (DRUG)	9	0.07	4.29	2.05	18.49
EXP_A (OTHER)	6	1.98	2.61	2.24	13.49
EXP_{NS} (OTHER)	6	1.56	2.12	1.76	10.59

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 36 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไม่จัดในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	21	5.82	10.67	8.08	169.79
EXP_{NS} (INPATIENT)	21	4.47	9.22	6.59	138.56
EXP_A (OUTPATIENT)	18	8.00	11.29	9.95	179.22
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	18	6.62	9.78	8.49	152.95
EXP_A (DRUG)	7	1.51	7.00	3.01	21.08
EXP_{NS} (DRUG)	7	0.91	6.94	2.56	17.97
EXP_A (OTHER)	8	1.72	0.93	1.45	11.67
EXP_{NS} (OTHER)	8	0.41	1.52	0.79	6.39

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 37 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่เคยสูบบุหรี่จัดและเพิ่งเลิกสูบบุหรี่

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	104	4.11	11.72	8.56	890.66
EXP_{NS} (INPATIENT)	104	2.57	10.24	7.08	736.47
EXP_A (OUTPATIENT)	110	5.99	10.44	8.41	925.96
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	110	5.89	10.31	8.29	912.35
EXP_A (DRUG)	40	1.56	6.48	2.84	113.65
EXP_{NS} (DRUG)	40	0.03	5.31	1.32	52.97
EXP_A (OTHER)	27	0.97	4.72	2.32	62.89
EXP_{NS} (OTHER)	27	0.01	3.82	1.46	39.50

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 38 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่เคยสูบบุหรี่จัดและเลิกสูบบุหรี่มา 15 ปีแล้ว

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	27	5.46	9.85	8.01	216.35
EXP_{NS} (INPATIENT)	27	4.72	9.08	7.27	196.40
EXP_A (OUTPATIENT)	33	5.14	11.14	9.42	310.91
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	33	4.54	10.25	8.60	283.98
EXP_A (DRUG)	12	1.27	5.18	2.86	34.41
EXP_{NS} (DRUG)	12	-0.58	4.45	1.73	20.86
EXP_A (OTHER)	7	0.86	2.67	1.67	11.74
EXP_{NS} (OTHER)	7	0.08	1.96	0.96	6.74

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 39 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเพิ่งเลิกสูบบุหรี่

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	29	3.06	8.18	6.59	191.36
EXP_{NS} (INPATIENT)	29	2.97	8.25	6.60	191.59
EXP_A (OUTPATIENT)	40	6.60	10.08	8.50	343.38
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	40	6.67	10.16	8.58	340.22
EXP_A (DRUG)	11	1.51	3.10	2.22	24.46
EXP_{NS} (DRUG)	11	0.15	1.85	1.03	11.42
EXP_A (OTHER)	9	1.18	2.76	1.76	15.91
EXP_{NS} (OTHER)	9	0.19	1.70	0.73	6.64

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 40 ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการสูบบุหรี่จริง (EXP_A) และ ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่เลย (EXP_{NS}) ของ ผู้ป่วยที่เคยสูบบุหรี่ไม่จัดและเลิกสูบบุหรี่มา 15 ปีแล้ว

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	23	5.80	11.72	8.47	195.01
EXP_{NS} (INPATIENT)	23	4.45	10.28	7.06	162.48
EXP_A (OUTPATIENT)	23	6.02	9.81	7.93	200.39
EXP_{NS} (OUTPATIENT)	23	6.71	10.63	8.71	182.51
EXP_A (DRUG)	6	0.29	2.45	1.29	7.77
EXP_{NS} (DRUG)	6	-0.48	1.96	0.72	4.37
EXP_A (OTHER)	11	2.03	4.91	3.56	39.24
EXP_{NS} (OTHER)	11	-0.61	2.00	0.95	10.48

ที่มา: จากการคำนวณ

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

หมายเลขแบบสอบถาม

วันที่ สัมภาษณ์ //

ผู้สัมภาษณ์

แบบสอบถาม

ต้นทุนส่วนบุคคลและต้นทุนทางสังคมของผู้ป่วยที่เป็นโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่:

การศึกษาข้อมูลภาคตัดขวางในประเทศไทย

(Private and Social Costs of the Patients with Illness Caused by Related Smoking Diseases (RSD): A Cross-sectional Observational Study in Thailand)

คำชี้แจง การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการวิจัยจากสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส) ดำเนินการวิจัยโดย รศ.ดร. เสถียร ศรีบุญเรือง คณะเศรษฐศาสตร์ อ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ และ นพ. ญัฐพล โฆษคุณพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อประเมินมูลค่าต้นทุนทางสังคมของผู้เจ็บป่วยเนื่องจากการสูบบุหรี่ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ **ส่วนที่1:** สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วย **ส่วนที่2:** ประวัติการสูบบุหรี่และสถานะสุขภาพของผู้ป่วย **ส่วนที่3:** ค่าใช้จ่ายในการรักษาและต้นทุนที่เกิดขึ้นของผู้ป่วย และ **ส่วนที่4:** ข้อมูลของญาติพี่น้องของผู้ป่วย ข้อมูลที่ได้จากท่านนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการวิจัยครั้งนี้มาก ผู้วิจัยถือว่าข้อมูลที่ได้นี้เป็นความลับและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ด้วย

ส่วนที่ 1

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย

1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง
2. อายุ ปี
3. ระดับการศึกษา
1. ไม่ได้เรียนหนังสือ 5.ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ประถมศึกษา (ป....) 6. ปริญญาโทหรือสูงกว่า
3. มัธยมศึกษา (ม.../ม.ศ....) 7. อื่นๆ ระบุ.....
4. อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส. ปี....)
4. อาชีพ (ถ้าท่านไม่ได้ทำงานกรุณาข้ามไปตอบข้อ 7.)
1. ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ระบุ..... 6. ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2. พนักงานบริษัทเอกชน 7. เกษตรกรหรือรับจ้าง ระบุ.....
3. ผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกร 8. แม่บ้าน
4. เกษียณอายุ 9. นักเรียนหรือนักศึกษา
5. ว่างานหรือกำลังหางาน 10. อื่นๆ ระบุ
5. ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์ ชั่วโมง
6. รายได้ในปัจจุบันของท่าน (ไม่ใช่ทั้งครัวเรือน)บาท/เดือน
7. รายได้ในปัจจุบันครัวเรือนของครอบครัวท่านบาท/เดือน
8. สถานภาพสมรส
1. โสด 3. หย่า 5. แต่งงานแล้ว
2. แยกกันอยู่ 4. เป็นหม้าย
9. จำนวนบุตรและธิดารวม คน
10. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมจำนวน คน
11. บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ท่านเป็นเจ้าของใช่หรือไม่
1. ไม่ใช่ 2. ใช่
12. ท่านอาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลหรือไม่
1. ไม่ใช่ 2. ใช่
13. ท่านนับถือศาสนาอะไร
1. พุทธ 2. คริสต์ 3. อิสลาม 4. อื่นๆ ระบุ.....

ส่วนที่ 2

1) ประวัติและพฤติกรรมกาสูบบุหรี่ของผู้ป่วย

14. ท่านเคยสูบบุหรี่หรือไม่ □/□□
1. ไม่เคย ให้ข้ามไปตอบข้อ 24.
2. เคย ถ้าเคยท่านสูบบุหรี่มากี่ปีแล้ว ปี
15. ปัจจุบันท่านยังคงสูบบุหรี่หรือไม่ □/□□
1. ไม่สูบ ท่านเลิกสูบบุหรี่มากี่ปีแล้ว ระบุ..... ปี
2. สูบ ให้ข้ามไปตอบข้อ 18.
16. สาเหตุที่ท่านเลิกสูบบุหรี่ □
1. เลิกเองเพราะสุขภาพไม่ดี 4. คนในครอบครัวบอกให้เลิก
2. ได้รับรู้โทษและพิษภัยจากการสูบบุหรี่ 5. อื่นๆ ระบุ
3. หมอห้ามไม่ให้สูบเพราะมีผลเสียต่อสุขภาพ
17. การเลิกของท่านมีลักษณะอย่างไร □
1. ค่อยๆ เลิก 2. เลิกเลยทีเดียว 3. อื่นๆ ระบุ
18. จำนวนบุหรี่ที่สูบ □/□/□□
1. กรณีที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว 2. กรณีที่กำลังสูบในปัจจุบัน
- | <u>ชนิด</u> | <u>เฉลี่ยต่อวัน (มวน/ซอง)</u> | <u>มากที่สุดต่อวัน (มวน/ซอง)</u> |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. บุหรี่มีก้นกรอง | | |
| <input type="checkbox"/> 2. บุหรี่ไม่มีก้นกรอง | | |
| <input type="checkbox"/> 3. ยามวน | | |
| <input type="checkbox"/> 4. ไปป์ | | |
| <input type="checkbox"/> 5. ซิการ์ | | |
- 19 ช่วงเวลาที่ท่านเคยหรือสูบบุหรี่มากที่สุด □□□□
- (ให้ระบุตัวเลขที่ตรงกับตัวท่านที่สุดหน้าข้อความ โดย 1 = มากที่สุด, 2 = ปานกลาง, 3 = เล็กน้อย และ 4 = น้อยที่สุด)
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. เวลาว่าง | 5. เวลาทำงาน |
| 2. ก่อนทานอาหาร | 6. หลังทานอาหาร |
| 3. ก่อนนอน | 7. หลังตื่นนอน |
| 4. เวลาเข้าสังคม | 8. อื่นๆ ระบุ..... |

20 ช่วงที่ท่านเคยสูบบุหรี่มากนั้นเป็นเพราะสาเหตุใดมากที่สุด

(ให้ระบุตัวเลขที่ตรงกับตัวท่านที่สุดหน้าข้อความ โดย 1 = มากที่สุด, 2 = ปานกลาง, 3 = เล็กน้อย และ 4 = น้อยที่สุด)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. สูบคลายเครียด | 4. สูบเวลาสังสรรค์เข้าสังคม |
| 2. เพื่อดับทุกข์แก้เครียด | 5. สูบแก้เซ็ง |
| 3. สูบตามเพื่อน | 6. อื่นๆ ระบุ |

2) ทัศนคติและความเชื่อ

ให้เรียงคำตอบจากข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยเรียงจากมากไปหาน้อย

21 ท่านคิดว่าอะไรเป็นข้อดีของการสูบบุหรี่ซึ่งส่งผลให้เริ่มสูบหรือยังคงสูบต่อไป

(โปรดระบุตัวเลขที่ตรงกับตัวท่านที่สุดหน้าข้อความ โดย 1 = มากที่สุด, 2 = รองลงมา, 3 = เล็กน้อย และ 4 = น้อยที่สุด)

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
|1) สูบเพื่อลดความตึงเครียด |5) สูบตามเพื่อน |
|2) สูบเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ |6) สูบเพื่อดับทุกข์แก้เครียด |
|3) สูบเวลาสังสรรค์เข้าสังคม |7) สูบเพื่อช่วยลดน้ำหนัก |
|4) สูบเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ |8) ทดลองสูบเพราะสนุกสนาน |

22. ท่านคิดว่าอะไรเป็นข้อเสียของการสูบบุหรี่ซึ่งส่งผลให้ท่านคิดจะเลิกบุหรี่

(โปรดระบุตัวเลขที่ตรงกับตัวท่านที่สุดหน้าข้อความ โดย 1 = มากที่สุด, 2 = รองลงมา, 3 = เล็กน้อย และ 4 = น้อยที่สุด)

-1) เพิ่มโอกาสในการเป็นโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก
-2) เพิ่มโอกาสในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด
-3) เพิ่มโอกาสในการเป็นโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง
-4) เพิ่มโอกาสในการเสพติด
-5) เป็นสาเหตุให้สุขภาพไม่ดี
-6) เกิดคราบตามฟันและนิ้วมือ
-7) เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
-8) ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
-9) ทำให้เกิดปัญหากับคนในครอบครัว
-10) ถูกลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎหมาย

23. ท่านคิดว่าสิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูบบุหรี่มากที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
1. พ่อ แม่ ญาติที่สูบบุหรี่
 2. เพื่อนที่สูบบุหรี่
 3. สื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ทีวี สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
 4. ตราผลิตภัณฑ์บุหรี่บนสินค้า เช่น บนเสื้อผ้า หมวก ฯลฯ
 5. ทดลองด้วยตนเอง
 6. อื่นๆ ระบุ.....
24. ในสถานที่ต่อไปนี้ มีบุคคลอื่นสูบบุหรี่หรือไม่และมีความสัมพันธ์กับท่านอย่างไร
- 24.1) ที่อยู่อาศัย 1. ไม่มี 2. มี /
- ถ้ามี ความสัมพันธ์เป็นเช่นใด 1. พ่อ แม่ 3. ปู่ย่า ตายาย
 2. ญาติพี่น้อง 4. อื่นๆ ระบุ.....
- 24.2) ที่ทำงาน 1. ไม่มี 2. มี /
- ถ้ามี ความสัมพันธ์เป็นเช่นใด 1. เพื่อนร่วมงาน 3. นายจ้าง
 2. ลูกค้า 4. อื่นๆ ระบุ.....
- 24.3) สถานศึกษา 1. ไม่มี 2. มี /
- ถ้ามี ความสัมพันธ์เป็นเช่นใด 1. เพื่อน 3. อาจารย์
 2. นักการภารโรง 4. อื่นๆ ระบุ.....
25. ท่านคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเป็นอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่หรือไม่
1. ไม่เกี่ยว 2. เกี่ยว 3. ไม่ทราบ
26. ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา มีคนในครอบครัวของท่านเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่หรือไม่
- /
1. ไม่มี 2. มี ระบุโรค..... เสียชีวิตมานาน.....ปี
27. ท่านทราบหรือไม่ว่าการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างดังต่อไปนี้
1. ไม่ทราบ 2. ทราบ
- ถ้าทราบโปรดทำเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็น โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
1. โรคหอบหืด 6. โรคสมองขาดเลือด
 2. โรคถุงลมโป่งพอง 7. โรคผนังเส้นโลหิตแดงหนาและอุดตัน
 3. โรคความดันโลหิตสูง 8. โรคหัวใจล้มเหลว/กล้ามเนื้อหัวใจตาย

- 4. โรคมะเร็งปอด
- 9. โรคอื่นๆ โปรดระบุ.....
- 5. โรคมะเร็งกล่องเสียง

3) ภาวะสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

28. ท่านมีส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.

□□□/□□□

29. ท่านได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์โรงพยาบาลว่าเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่

(ในกรณีที่ เป็นโรคมะเร็งโปรดระบุระยะของโรค โดย 1 = ระยะที่ 1, 2 = ระยะที่ 2, 3 = ระยะที่ 3, และ 4 = ระยะที่ 4 โดยให้ทำเครื่องหมาย หน้าตัวเลขที่ตรงกับตัวท่านที่สุด)

29.1 กลุ่มโรคมะเร็ง (Malignant Neoplasm) ได้แก่

□/□/□□□□□□□□□□

1) มะเร็งริมฝีปาก ช่องปากและลำคอ (Lip Oral Cavity pharynx)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

2) มะเร็งของหลอดอาหาร (Esophagus)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

3) มะเร็งของตับอ่อน (Pancreas)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

4) มะเร็งของกล่องเสียง (Larynx)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

5) มะเร็งของหลอดลมและปอด (Trachea, bronchus, Lung)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

6) มะเร็งของปากมดลูก (Cervix uteri)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

7) มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

8) มะเร็งไตและระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Kidney, Other unspecified urinary organs)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

9) มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach)

- 1. ระยะที่ 1
- 2. ระยะที่ 2
- 3. ระยะที่ 3
- 4. ระยะที่ 4

29.2

กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

□/□□□□□□□□□□□□

1) โรคหัวใจรูมาติก (Rheumatic heart disease)

- 2) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertensive disease)
- 3) โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease)
- 4) โรกระบบไหลเวียนของปอด
- 5) โรคหัวใจอื่นๆ (Other heart disease)
- 6) โรคหลอดเลือดในสมอง (Cerebrovascular disease)
- 7) โรคหลอดเลือดแข็ง (Arteriosclerosis)
- 8) โรคหลอดเลือดเออติคโป่งพอง (Aortic aneurysm)
- 9) โรคสมองขาดเลือด (Stroke)
- 10) โรคหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อหัวใจ (Coronary heart disease)
- 11) โรคหัวใจล้มเหลว (Heart attack)
- 12) โรคหลอดเลือดชนิดอื่นๆ (Other arterial disease)

29.3 กลุ่มโรกระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Disease)

/

- 1) วัณโรคปอด (Respiratory tuberculosis)
- 2) โรคปอดบวม (Pneumonia)
- 3) โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
- 4) โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)
- 5) ถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
- 6) โรคหอบหืด (Asthma)
- 7) โรคอุดกั้นทางเดินหายใจเรื้อรัง (Chronic airway obstruction)

30. ท่านออกกำลังกายเป็นประจำหรือไม่ 1. ไม่ใช่ 2. ใช่

ถ้าใช่ กรุณาตอบคำถามข้างล่าง

- 1) ออกกำลังกายโดยยึดหรือคลายกล้ามเนื้อ.....ชั่วโมง / สัปดาห์
- 2) ออกกำลังกายโดยการเดินหรือวิ่ง.....ชั่วโมง / สัปดาห์
- 3) ออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำหรือกีฬาทางน้ำ.....ชั่วโมง / สัปดาห์
- 4) ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ.....ชั่วโมง/สัปดาห์
- 5) ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน.....ชั่วโมง/สัปดาห์
- 6) ออกกำลังกายโดยการเล่นเครื่องออกกำลังกาย.....ชั่วโมง/สัปดาห์
- 7) ออกกำลังกายโดยการเดินแอโรบิก.....ชั่วโมง/สัปดาห์
- 8) อื่นๆ โปรดระบุ..... เป็นเวลา.....ชั่วโมง/สัปดาห์

31. ท่านสวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นประจำหรือไม่

1. ไม่ใช่ 2. ใช่

32. ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่

1. ไม่ดื่ม 2. ดื่ม

ถ้าดื่ม กรุณาระบุจำนวนแอลกอฮอล์ที่ท่านดื่มต่อสัปดาห์

1) เบียร์.....ขวดหรือ.....แก้ว/สัปดาห์

2) ไวน์.....ขวดหรือ.....แก้ว/สัปดาห์

3) สุรา.....ขวดหรือ.....แก้ว/สัปดาห์

4) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้ป่วย

33. ในปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพในชีวิตประจำวันของท่านหรือไม่ เช่น พฤติกรรมด้านการดื่มหรือกิน การสูบบุหรี่ การออกกำลังกายหรือน้ำหนักที่เปลี่ยนไป

1. ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 35. 2. มีการเปลี่ยนแปลง

34. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนไปของท่านคือ

1) การสูบบุหรี่ 1. ไม่เปลี่ยน 2. เพิ่มขึ้น 3. ลดลง

2) การดื่มแอลกอฮอล์ 1. ไม่เปลี่ยน 2. เพิ่มขึ้น 3. ลดลง

3) การออกกำลังกาย 1. ไม่เปลี่ยน 2. เพิ่มขึ้น 3. ลดลง

4) น้ำหนักตัว 1. ไม่เปลี่ยน 2. เพิ่มขึ้น 3. ลดลง

5) การบริโภคอาหาร 1. ไม่เปลี่ยน 2. เพิ่มขึ้น 3. ลดลง

6) อื่นๆ ระบุ..... 1. ไม่เปลี่ยน 2. เพิ่มขึ้น 3. ลดลง

5) ลักษณะการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

35. ในปีที่ผ่านมาท่านต้องพักอยู่ที่บ้านเพราะการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่
1. ไม่ใช่ ให้ข้ามไปตอบข้อ 39. 2. ใช่
36. ถ้าต้องพักรักษาตัว ท่านต้องนอนอยู่บนเตียงใช่หรือไม่
1. ไม่ใช่ ให้ข้ามไปตอบข้อ 38. 2. ใช่
37. ถ้าใช่ จำนวนกี่วันที่ท่านต้องนอนพักอยู่บนเตียง.....วันในช่วง 1 ปี
38. และเป็นจำนวนกี่วันที่ท่านต้องพักอยู่ที่บ้าน.....วันในช่วง 1 ปี
39. ปกติแล้วท่านได้รับการดูแลรักษาสุขภาพจากสถานที่ใดต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลรัฐ 4. สถานีอนามัย
2. โรงพยาบาลเอกชน 5. สถานพยาบาลสังกัดหน่วยงานของท่าน
3. คลินิก 6. อื่นๆ ระบุ.....
40. ปกติแล้ว ท่านได้รับการดูแลรักษาและได้รับบริการพยาบาลจากใคร
1. แพทย์ 4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. พยาบาล 5. อื่นๆ ระบุ.....
3. นักกายภาพบำบัด
41. ประเภทของยานพาหนะที่ท่านใช้เพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลโดยมากคือ
1. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว 4. รถแท็กซี่หรือรถรับจ้าง
2. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของญาติ เพื่อน 5. อื่นๆ ระบุ.....
3. รถโดยสารประจำทาง

43. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านได้มาทำการรักษาหรือผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยนอกหรือไม่

1. ไม่ใช่ 2. ใช่

ถ้าใช่ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร เมื่อต้องมารับการรักษาที่คลินิก หรือมาโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก กรุณากรอกรายละเอียด

ครั้งที่	สถานพยาบาล (โรงพยาบาล คลินิก สถานี หรืออนามัย)	ระยะทางจาก บ้านท่านมายัง สถานพยาบาล (กม.)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บาท)	เวลาที่ท่าน รอรับการ รักษา (ชั่วโมง)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ดูแล ระหว่างมาสถานพยาบาล		ค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลรวม (บาท)
					จำนวน ญาติ (คน/วัน)	ค่าจ้างคน ดูแล (บาท)	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							

44. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแล้ว ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อยารักษาโรคกี่ครั้ง แต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินเท่าไร

1. ไม่มี 2. มี

ครั้งที่1. ค่าใช้จ่าย.....บาท ครั้งที่5. ค่าใช้จ่าย.....บาท
 ครั้งที่2. ค่าใช้จ่าย.....บาท ครั้งที่6. ค่าใช้จ่าย.....บาท
 ครั้งที่3. ค่าใช้จ่าย.....บาท ครั้งที่7. ค่าใช้จ่าย.....บาท
 ครั้งที่4. ค่าใช้จ่าย.....บาท ครั้งที่8. ค่าใช้จ่าย.....บาท
 รวมทุกครั้งประมาณ.....บาท

45. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยหรือไม่ (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ซื้อรถเข็น ต่อเติมห้องนอน บันได บ้าน ซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ)

1. ไม่มี 2. มี

ถ้ามี, กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อความของรายการที่เกิดขึ้นพร้อมระบุจำนวนเงินโดยประมาณ

1. จ้างคนดูแล (Caregivers) มาช่วยดูแลรักษาที่บ้าน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี

2. ต่อเติมบ้าน ห้องนอน หรือส่วนต่างๆของบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี

3. ซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถเข็น ไม้ค้ำยัน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี

4. อาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วย เช่น อาหารเหลว อาหารเสริม วิตามิน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี

5. อื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี

46. ท่านจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีใด

1. จ่ายเอง

2. บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

3. บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)

4. บัตรประกันสังคม

5. บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (บัตร ส.ป.ร.)

6. ใช้สิทธิข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

7. อื่นๆ ระบุ.....

2) สภาวะการทำงาน: ต้นทุนทางอ้อม

47. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยขาดงาน เพราะปัญหาสุขภาพหรือไม่ /□□□
1. ไม่เคย 2. เคย
- ถ้าเคย จำนวนวันทั้งหมด คือ.....วัน
48. ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านมีวันที่ไม่สามารถทำงานประจำได้เพราะปัญหาสุขภาพหรือไม่ /□□□
1. ไม่มี 2. มี
- ถ้ามี จำนวนวันทั้งหมด คือ.....วัน
49. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านต้องหยุดทำงานเป็นช่วงเวลานานเพราะปัญหาสุขภาพหรือไม่ /□/□□
1. ไม่เคย 2. เคย
- ถ้าเคย จำนวนระยะเวลาทั้งหมด คือ.....เดือน.....วัน
50. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยเปลี่ยนชั่วโมงการทำงาน เพราะปัญหาสุขภาพหรือไม่ /□
1. ไม่เคย 2. เคย
- ถ้าเคย โปรดระบุจำนวน.....ครั้ง
- และแต่ละครั้งต้องลดชั่วโมงทำงานลง.....ชั่วโมง
51. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านเสียเวลาเพื่อไปพบแพทย์, หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไม่ /□□□
1. ไม่เคย 2. เคย
- ถ้าเคย จำนวนชั่วโมงที่คุณเสียไป.....ชั่วโมง /ปี

ส่วนที่ 4

แบบสอบถามสำหรับผู้ป่วย

52. เพศ 1. ชาย 2. หญิง
53. อายุ.....ปี □□
54. อาชีพ
1. ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ระบุ..... 6. ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2. พนักงานบริษัทเอกชน 7. เกษตรกรหรือรับจ้าง ระบุ.....
3. ผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกร 8. แม่บ้าน
4. เกษียณอายุ 9. นักเรียนหรือนักศึกษา
5. ว่างานหรือกำลังหางาน 10. อื่นๆ ระบุ
55. รายได้ของท่านประมาณ..... (บาท/เดือน) □□□□
56. ท่านใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งประมาณ.....ชั่วโมง.....นาที □

57. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ละครั้ง โดยเฉลี่ย.....บาท / ครั้ง
 (ถ้าท่านไม่สามารถประมาณได้ โปรดระบุค่าใช้จ่ายครั้งหลังสุด)

58. ท่านเดินทางมากับผู้ป่วยทุกครั้งหรือไม่ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา /
1. ทุกครั้ง จำนวน.....ครั้ง 2. บางครั้ง จำนวน.....ครั้ง

ข้อ 59 และ 60 สำหรับญาติผู้ป่วยนอก

59. ท่านเสียเวลารอคอยเมื่อผู้ป่วย (ญาติของท่าน) รับการตรวจ/รักษา แต่ละครั้งประมาณ
ชั่วโมง.....นาที

(ถ้าท่านไม่สามารถประมาณได้ โปรดระบุระยะเวลาครั้งหลังสุด)

60. ท่านต้อง ลาหรือขาดงาน ในการพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทั้งวันหรือไม่ /

1. ไม่ใช่ โดยลาหรือหยุดงาน.....ชม.....นาที

2. ใช่

3. ไม่ได้ลาหรือหยุดงาน เพราะไม่ได้ทำงาน

ข้อ 61. สำหรับญาติผู้ป่วยใน

61. ในช่วงที่ท่านดูแลผู้ป่วยท่านต้องขาดงานเฉลี่ยประมาณครั้งละ.....วัน
 (ถ้าท่านไม่สามารถประมาณได้ โปรดระบุครั้งหลังสุด)

ขอขอบพระคุณที่ช่วยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ลิขสิทธิ์ © by Chiang Mai University
 All rights reserved

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นายกิตติคุณ พงษ์กล่าวขำ
วัน เดือน ปี เกิด	27 กรกฎาคม 2520
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2538 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2542
ทุนการศึกษา	ได้รับทุนการศึกษาจากเงินค่าบำรุงพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved