

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	กรณีศึกษาผู้พยายามฆ่าตัวตายในหมู่บ้านวังดุงใหม่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้เขียน	นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ไกรพิบูลย์ ประธานกรรมการ อาจารย์ วิสุทธิ์ วานิช กรรมการ รองศาสตราจารย์ ศิสรณี มีสมศัพท์ กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของผู้พยายามฆ่าตัวตายในหมู่บ้านวังดุงใหม่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2541 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2542 ศึกษาจากผู้ที่มีการพยายามฆ่าตัวตายทุกรายและครอบครัว รวมทั้งญาติ เพื่อน ฯลฯ ของผู้มีภูมิลำเนาในอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 8 ราย เป็นชาย 5 ราย หญิง 3 ราย ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใช้แบบวัดบุคลิกภาพ MPI และแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 เพื่อวัดความแปรปรวนของบุคลิกภาพ และสุขภาพจิตทั่วไป เช่น กลุ่มอาการซึมเศร้า วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ ก้าวร้าว หวาดระแวง และโรคจิต

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จ (Suicide Attempt) จำนวน 4 ราย และผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ (Complete Suicide) จำนวน 4 ราย พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรณีศึกษาทั้ง 8 ราย พยายามฆ่าตัวตายเหมือนกันมากที่สุดคือ มาจากสภาพภูมิหลังของครอบครัวเสียบิดาหรือมารดาตั้งแต่อายุน้อย ครอบครัวแตกแยก ขาดความรักความอบอุ่น บุคลิกภาพแปรปรวน ซึมเศร้า เก็บกด ขาดความมั่นใจในตนเอง มีอาการทางจิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายเมื่อใดขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับการวัดผลทางบุคลิกภาพของกรณีศึกษาทั้ง 4 ราย

ที่มีชีวิตอยู่พบว่า ค่ามิติทางด้านพฤติกรรม (Extroversion) มีตีความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ (Introversion) มีค่าสูงกว่าบุคคลปกติทั่วไป และตรงกับผลการวัดทางสุขภาพจิตเช่นกัน ที่พบว่าค่า T - Score ในแต่ละกลุ่มอาการสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ 50 ทุกราย โดยเฉพาะกลุ่มอาการทางโรคจิต อาการซึมเศร้า ย้ำคิดย้ำทำ วิตกกังวล ไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น หวาดระแวง กลัวโดยไม่มีเหตุผล และมีส่วนหนึ่งที่มีปัจจัยมาจากการคิดสุรา การใช้ยาเสพติด และคิดเชื่อเอคต์ จึงเป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดการพยายามฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น

Thesis Title Case Study of Suicide Attempted Persons in Wang Lung Mai
Village, Hang Dong Sub-District, Hod District, Chiang Mai Province

Author Mr. Nuttawut Jaichomcheun

M. Ed. Health Promotion

Examining Committee

Asst. Prof. Dr. Suchada Kraiphibul	Chairman
Lect. Wisut Wanit	Member
Assoc. Prof. Tisananee Mesomsup	Member

Abstract

The purpose of this qualitative research was to study the factors of suicide attempted persons in Wang Lung Mai Village, Hang Dong Sub-District, Hod District, Chiang Mai Province, in two years back from January 1998 to December 1999. The purposively – randomized subjects were 4 suicide attempted persons and 4 complete suicide persons (5 males and 3 females) in the target village. The research instruments included the structure and non – structure interview ovm, and the participatory observation form. In addition the Maudley Personality Inventory test and the Symptom Checklist – 90 Purpose Extroversion and Introversion Neuroticism Personality test were used to investigate depressive dimension, phobic anxiety dimension, obsessive and compulsive dimension, hostility dimension, paranoid ideation dimension, and psychoticism dimension.

The research findings revealed that the most similar factors that caused 8 subjects to commit suicide were family backgrounds ; for example, the loss of the parents, the broken families, the lack of love and warmth, the personality change, being depressive and sad, and the lack of self – confidence. All of these affected their feelings when they grew up.

These findings had a correlation with the results of the Maudley Personality Inventory test of 4 suicide attempted persons in the way that the scores of extroversion and introversion dimension and neuroticism dimension were higher than those of the normal persons. Moreover, they also correlated with the results of the Symptom Checklist – 90 Purpose Extroversion and Introversion Neuroticism Personality test which showed that the T – scores of each dimensions were so up, especially the dimensions as follows : psychoticism, depressive, obsessive - compulsive, having anxiety, lacking interpersonal sensitivity, paranoid ideation, and phobic anxiety. Besides, it was found that alcoholism, drug addiction, and the infection of HIV were the minor factors that led more people to commit suicide.