ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ชื่อผู้เขียน

นางสาวอัมภวรรณ์ ใจเปี้ย

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ:

รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พงษ์สนิท ประชานกรรมการ อาจารย์ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล กรรมการ รองศาสตราจารย์ชลอศรี แคงเปี่ยม กรรมการ อาจารย์ คร. ยุวยงค์ จันทรวิจิตร กรรมการ

บทกัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดห้าย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งได้รับการรักษาโดยการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สถานพยาบาลเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำนวน 41 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตาม กรอบแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 1991) มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาลเท่ากับ .79 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงเนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการดูแลตนเองด้านการดูแลตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไป ตามระยะพัฒนาการ และในภาวะเบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง เมื่อจำแนกรายข้อมีบางข้อ อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ การรับประทานอาหารประเภทเมล็ดพืช นมสด เนย ไข่แดง ไอสกรีม การรับประทานผลไม้ทุกวัน การมีงานอดิเรกทำ การรับประทานอาหารที่ปรุงเฉพาะโรคไตวาย การใช้วิธี แต่งหน้าหรือแต่งตัวให้ดูดีเพื่อช่วยปิดบังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการไปร่วมงานสังคมตามปกติ แต่บางข้อกลุ่มตัวอย่างมีการดูแลตนเองอยู่ในระดับต่ำได้แก่ การนำน้ำที่อยู่ในน้ำแกง ก๋วยเตี๋ยว นมหรือ โอวัลติน มาคิดรวมเป็นปริมาณน้ำดื่มในแต่ละวัน การปรุงอาหารโดยการเติมรสเปรี้ยวหรือหวานเพิ่ม การรับประทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น การเข้าร่วมชมรมหรือมีกิจกรรมอื่น

การจดบันทึกปริมาณน้ำคื่มและปัสสาวะ การรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารโดยรับประทานก่อน หรือหลังอาหารไม่ถึงครึ่งชั่วโมง และการวางแผนการรักษาร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ผู้ดูแล

การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล สุขภาพตนเองและได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากทีมสุขภาพ เพื่อให้มีความรู้ มีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมใน ทุกเรื่องอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข **Independent Study Title**

Self-Care of the Patient with End Stage Chronic Renal Failure

Author

Miss Ampawan Jaipear

Master of Public Health

Independent Study Examining Committee:

Assoc. Prof. Kannikar		Pongsanit	Chairperson
Lect.	Prapim	Buddhirakkul	Member
Assoc, Prof.	Chalorsri	Dangpiam	Member
Lect. Dr.	Yuwayong	Jantarawijit	Member

Abstract

The purpose of this study was to determine the self – care of the patients with end stage chronic renal failure. Forty one samples were selected by purposive sampling from the hemodialysis patients at Chiang Mai Kidney Clinic. The instrument used for data collection was a questionnaire applied by using Orem's concepts (Orem, 1991). The reliability was .79 by Cronbach's alpha coefficient. Data were analysed by descriptive statistics and content analysis.

The results showed that the self-care of the samples with end stage chronic renal failure in universal self-care requisites, developmental self-care requisites, and health deviation self-care requisites were high in all categories. However, consumption of plant seed, milk, cheese, egg yolk, and ice cream; consumption of fruit in every day; hobby performing; consumption of diet for renal failure patients; making or dressing up for good looking and social participation were found in the moderate level. Except recording of daily fluid intake from soup, noodle, and milk; cooking with sour or sweet; eating with high carbohydrate and glucose diet; measuring of oral fluid intake and urine output; taking of medicine half an hour before and after meal; and making therapeutic plan with doctor or health care team were found in the low level.

This study indicated that the patients with end stage chronic renal failure should participate with health care team according to their self-care planning. The patients should receive health promotion from health personnel in order to gain more knowledge and appropriate practice continuously and effectively, including good quality of life, and prolonging their happy life.