

**ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์**

เปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณ์จริงของผู้ป่วยเกี่ยวกับ  
ระดับความเจ็บปวด และกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความ  
เจ็บปวดหลังผ่าตัด

**ชื่อผู้เขียน**

นางสาว มยุลี สํารามญาติ

**พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต**

สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยกรรมศาสตร์

**คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์**

- |  |               |
|--|---------------|
| รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์                 | ประธานกรรมการ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสงค์ คุณทรงเกียรติ | กรรมการ       |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ คุณพันธ์                | กรรมการ       |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวรรณ์ เสนารัตน์           | กรรมการ       |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศนา มหามาน                   | กรรมการ       |

**บทคัดย่อ**

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดตามที่  
ผู้ป่วยคาดหวังกับตามประสบการณ์จริงที่ผู้ป่วยได้รับ และเปรียบเทียบกิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับ  
หลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตามผู้ป่วยคาดหวังกับตามประสบการณ์จริง กลุ่มตัวอย่างคือ  
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเอาน้ำออกโดยผ่านเนื้อไต กรวยไต ท่อไต และตัดไตออก ในหอผู้ป่วย  
ศัลยกรรมชาย 2 และศัลยกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 65 ราย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย แบบบันทึกระดับความ  
เจ็บปวดของผู้ป่วย มาตรวัดความเจ็บปวดของพรินริคเตอร์ อุดมถาวรสุข และแบบสัมภาษณ์

กิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์กิจกรรมการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ป่วย เท่ากับ 0.94 และค่าความเชื่อมั่นตามประสบการณ์จริงของผู้ป่วย เท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

1. ระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดตามผู้ป่วยคาดหวัง แตกต่างจากระดับความเจ็บปวดตามประสบการณ์จริงที่ผู้ป่วยได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดตามผู้ป่วยคาดหวังน้อยกว่าตามประสบการณ์จริง
2. กิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตามผู้ป่วยคาดหวัง แตกต่างจากประสบการณ์จริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตามผู้ป่วยคาดหวังมากกว่าตามประสบการณ์จริง

**Thesis Title** Comparison of Patient's Expectations with Actual Experiences on Pain Level and Nursing Activities to Relief Postoperative Pain

**Author** Miss Mayulee Somrarnyart

**M.N.S.** Medical and Surgical Nursing

**Examining Committee:**

Associate Professor Nunta Leksawasdi	Chairman
Assistant Professor Dr. Prasong Khunsongkiet	Member
Assistant Professor Aunnop Koonphandh	Member
Assistant Professor Wilawan Senaratana	Member
Assistant Professor Tatsana Mahanupab	Member

**Abstract**

The main purpose of this study was to compare patient's expectations with actual experiences on pain level and patient's expectations with actual experiences on nursing activities to relief postoperative pain. Samples were 65 patients undergoing nephrolithotomy, pyelolithotomy, ureterolithotomy and nephrectomy admitted in male surgical ward 2 and female surgical ward 2 at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. The research instruments consisted of

patients' record form, patients' pain level record form, Porniran Udomthavornasuk's pain color scale and interview form about nursing activities to relief postoperative pain developed by the researcher. The content validity was assessed by experts. The reliability was obtained by means of Cronbach's coefficient alpha. The reliability of interview form about patient's expectations on nursing activities to relief postoperative pain was 0.94 and the actual experiences was 0.90. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test.

The results of the study revealed that:

1. There was statistically significant difference between the patient's expectations with actual experiences on pain level at the level of .001. The patient's expectations on pain level were less than the actual experiences.

2. There was statistically significant difference between the patient's expectations with actual experiences on nursing activities to relief postoperative pain at the level of .001. The patient's expectations on nursing activities to relief postoperative pain were more than the actual experiences.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved