

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชและการจัดการของบุคลากร
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ชื่อผู้เขียน นายกชพงศ์ สารการ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล	วิวัฒน์คุณูปการ	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารารวรรณ	ตะปิ่นตา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินจง	โปธิบาล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร	สุคำวัง	กรรมการ

บทคัดย่อ

พฤติกรรมรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การจัดการสำหรับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจึงเป็นกิจกรรมพยาบาลที่มีความสำคัญ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราชุกของพฤติกรรมรุนแรงแต่ละลักษณะของผู้ป่วยจิตเวชและการจัดการสำหรับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชแต่ละลักษณะของบุคลากรแต่ละระดับที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี ประชากรที่ศึกษามี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยจิตเวชชาย 1 และจิตเวชหญิง 1 จำนวน 149 คน กลุ่มที่สองเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 1 และจิตเวชหญิง 1 จำนวน 45 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชของยูตอฟสกี ซิลเวอร์ และ แจคสัน (1986) ซึ่งผู้วิจัยแปลและดัดแปลงมาใช้ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 0.95 และแบบสังเกตการจัดการของบุคลากรวัดโดยแบบสังเกตการจัดการของบุคลากรของยูตอฟสกี ซิลเวอร์ และแจคสัน (1986) ซึ่งผู้วิจัยแปลและดัดแปลงมาใช้ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 0.89 โดยการหาความเชื่อมั่นของแบบสังเกต ได้ค่าความตรงกันของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย (interrater reliability) เท่ากับ 1 ข้อมูลทั้งหมดนำมาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 37.6 ของผู้ป่วยจิตเวชเกิดพฤติกรรมรุนแรง เมื่อพิจารณาอัตราชุกของพฤติกรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วย 100 ราย พบว่า ทั้งผู้ป่วยชายและหญิงมีพฤติกรรมรุนแรงทางคำพูดมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ พฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายผู้อื่น พฤติกรรมรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ และพฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายตนเอง

การจัดการสำหรับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชแต่ละลักษณะของบุคลากรแต่ละระดับพบว่า พฤติกรรมรุนแรงทางคำพูด พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคใช้วิธีการพูดคุยกับผู้ป่วยมากที่สุด ส่วนผู้ช่วยเหลือคนไข้ ใช้การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดมากที่สุด ด้านพฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายตนเอง พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคใช้วิธีการพูดคุยกับผู้ป่วยมากที่สุด ส่วนผู้ช่วยเหลือคนไข้ใช้วิธีการนำผู้ป่วยไปไว้ในห้องจำกัดพฤติกรรมและการผูกมัดผู้ป่วยมากที่สุด ด้านพฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายผู้อื่น พยาบาลวิชาชีพใช้วิธีการพูดคุยกับผู้ป่วยมากที่สุด พยาบาลเทคนิคใช้วิธีการพูดคุยกับผู้ป่วยและการให้ยาฉีดมากที่สุด ส่วนผู้ช่วยเหลือคนไข้ใช้วิธีการผูกมัดผู้ป่วยมากที่สุด และสำหรับพฤติกรรมรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิคและผู้ช่วยเหลือคนไข้ ใช้วิธีการพูดคุยกับผู้ป่วยมากที่สุด

ผลการศึกษารังนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

Thesis Title Violent Behaviors of Psychiatric Patient and Management of Staffs at Prasrimahabhodi Psychiatric Hospital

Author Mr. Kotchamong Sarakan

M.N.S. Mental Health and Psychiatric Nursing

Examining Committee :

Asst. Prof. Srinuan	Wiwatkunupakan	Chairman
Asst. Prof. Dr. Darawan	Thapinta	Member
Asst. Prof. Dr. Linchong	Pothiban	Member
Asst. Prof. Dr. Khanokporn	Sucamvang	Member

Abstract

Violent behaviors of psychiatric patient are usually found among psychiatric patients who were hospitalized. Management of violent behaviors of these patients, therefore, is an important nursing intervention. The purpose of this study was to examine the prevalence of violent behaviors of psychiatric patient and the management for violent behaviors of nursing staffs working at Prasrimahabhodi Psychiatric Hospital, Ubonratchatane Province. The population studied were one hundred and forty-nine psychiatric patients admitted to at acute care ward and forty-five staffs working at acute care ward. Data were collected by non - participating observation using the Violent Behavior Observational Checklist of Yudofsky, Silver, and Jackson (1986) modified and translated into Thai by the researcher which Content Validity Index (CVI) was 0.95 and the Staff Management Observational Checklist of Yudofsky, Silver, and Jackson (1986) modified and translated to Thai by the researcher which CVI was 0.89. The interrater reliability coefficient of the two instruments was 1 equally. Data were analyzed in terms of frequency and percentage.

Study finding demonstrated that 37.6 percent of psychiatric patients showed violent behaviors. The most prevalence violent behaviors of male and female psychiatric patients were verbal violent behaviors. Physical violent behavior against other people, physical violent behavior against object and physical violent behavior against self were also found.

Management method for each violent behaviors of each group of nursing staff was also investigated. For verbal violent behaviors professional nurse and technical nurse used talking to patient mostly, while the attendant used closer observation. For physical violent behavior against self professional nurse and technical nurse used talking to patient mostly, whereas, the attendant used seclusion and restraints. For physical violent behavior against other people professional nurse used talking to patient mostly, while the technical nurse used talking to patient and immediate medication injection and the attendant used restraining. For violent behavior against object all professional nurse, technical nurse and the attendant used talking to patient mostly.

These finding can be used as a guideline for managing the violent behaviors of hospitalized psychiatric patient.