

.8724 และ .8829 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS

ผลการศึกษาพบว่า ความรู้สึกไม่แน่นอนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเผชิญความเครียดแบบการมองโลกในแง่ดี (optimistic) มากที่สุด และใช้วิธีการแสดงอารมณ์ (emotive) น้อยที่สุด ความรู้สึกไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบหลีกเลี่ยงปัญหา (evasive) การมองสถานการณ์ในแง่ร้าย (fatalistic) และการใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคม (supportant) แต่มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับเล็กน้อย กับวิธีการเผชิญสถานการณ์และปัญหา (confrontive) วิธีการมองโลกในแง่ดี และสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลางกับวิธีการพึ่งพาตนเอง (self-reliant) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอน และวิธีการเผชิญความเครียดแบบการบรรเทาเบาบาง (palliative)

ผลการวิเคราะห์ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติ การศึกษา และการบริหารการพยาบาล ตลอดจนการทำวิจัยครั้งต่อไป

Thesis Title Uncertainty and Coping of Hospitalized
Acute Myocardial Infarction Patients

Author Mrs. Chen Xianhua

M.N.S Medical and Surgical Nursing

Examining Committee:

Assistant Professor Dr.Linchong Pothiban	Chairman
Instructor Totsaporn Khampolsiri	Member
Assistant Professor Wanpen Eamjoy	Member
Assistant Professor Wimon Tanasuwan	Member
Professor Liu Zhiquan	Member

Abstract

Uncertainty is the cognitive state created when a person cannot adequately structure or categorize an illness event because of the lack of sufficient cues. This condition can cause stress to people to which they have to cope. This correlational descriptive study was conducted to describe uncertainty levels and coping styles of hospitalized acute myocardial infarction (AMI) patients, and to examine the relationship between the two variables. A purposively selected sample consisted of 68 AMI patients

admitted to Coronary Care Unit of Tongji Medical University. Demographic Data Recording Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS), and the Jalowiec Coping Scale (JCS) in Chinese version were used to collect data. The reliability of the instruments was tested from which the Cronbach's alpha coefficients of MUIS and JCS in Chinese version were .8724 and .8829, respectively. Data were analyzed using SPSS.

Result of study indicated that the uncertainty of participants was at moderate level. Optimistic coping style was used most, whereas emotive coping style was used least. Uncertainty was moderately positive related to evasive, fatalistic, emotive, and supportant coping styles, but slightly negative related with confrontive, and optimistic, and moderately negative related to self-reliant coping styles. There was no significant relationship between uncertainty and palliative coping style.

Implications for nursing practice, nursing education, nursing administration, and recommendations for further study were described.