# ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ สุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพา ของมารดาเด็กออทิสติก

ชื่อผู้เขียน

นางสาวอิชยา เชื่อนมั่น

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

## คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

อาจารย์ คร. ภัทราภรณ์

ทุ่งปันคำ

ประชานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล

วิวัฒน์คุณปการ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ คร. พัชราภรณ์

อารีย์

กรรมการ

ผู้ช่วยสาสตราจารย์วิมล

ธนสุวรรณ

กรรมการ

### บทคัดย่อ

การดูแลเด็กออทิสติกมีผลกระทบต่อครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นมารดาที่ต้อง เผชิญกับอาการที่ซับซ้อนของเด็กออทิสติก และต้องพัฒนาความสามารถในการดูแลบุตรที่เป็นโรค ออทิสติกเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กออทิสติกอย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผล ทำให้มารดาเด็กออทิสติกมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิต ความสามารถในการคูแถบุคคลที่ ค้องพึ่งพา และความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและความสามารถในการคูแลบุคคลที่ค้องพึ่งพา ของมารคาเค็กออทิสติก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือมารคาเค็กออทิสติกที่มารับบริการที่โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสึมา จำนวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามประกอบค้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัคสุขภาพจิตของเวทท์ และ แวร์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดย ผู้ศึกษา และ3) แบบวัคความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารคาเค็กออทิสติกที่พัฒนา ขึ้นตามแนวคิดความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของโอเรม และผ่านการตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือทั้งความตรงและความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

- 1. สัดส่วนของมารดาเด็กออทิสติกที่มีภาวะสุขภาพจิตคี้เท่ากับมารดาที่มีภาวะ สุขภาพจิตไม่ดี
  - 2. มารคาเด็กออทิสติกมีความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาในระดับสูง และ
- 3. สุขภาพจิต โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้อง พึ่งพาของมารคาเด็กออทิสติกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .46, p< .01)

ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางในการ ส่งเสริมสุขภาพจิต และความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาให้แก่มารคาเด็กออทิสติก เพื่อให้มีภาวะสุขภาพจิตที่ดี และสามารถที่จะให้การคูแลเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ **Independent Study Title** 

Mental Health and Dependent-care Agency Among

Mothers of Autistic Children

Author

Miss. Itchaya Khueanman

M.N.S.

Mental Health and Psychiatric Nursing

#### **Independent Study Examining Committee:**

| Lect. Dr. Patraporn           | Tungpunkom     | Chairman |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Asst. Prof. Srinuan           | Wiwatkunupakan | Member   |
| Assoc. Prof. Dr. Patcharaporn | Aree           | Member   |
| Asst. Prof. Wimon             | Tanasuwan      | Member   |

#### **Abstract**

Caring for autistic children has an impact on their families, especially mothers who have to face with the complexity of the children's conditions. In addition, mothers need to develop their capabilities in order to take care of autistic children effectively. This may lead to mental health problems among mothers.

The purpose of this study was to describe mental health and dependent-care agency and to examine the relationship between mental health and dependent-care agency of mothers who cared for autistic children. The study sample were 72 mothers of autistic child who had received treatment at Nakon Ratchasima psychiatric hospital. The research instrument was a questionnaire consisting of three parts: 1) Demographic Data 2) the Mental Health Questionnaire by Veit and Ware (1983) translated into Thai by the investigator, and 3) the Dependent-care Agency Questionnaire developed by the investigator based on Orem's concept. The instrument demonstrated validity and reliability. The descriptive statistics that were used to

analyse data included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's product moment coefficient.

The results of the study were as follows:

- 1. An equal proportion of mothers had either good mental health or poor mental health,
  - 2. The mothers had high level of dependent-care agency, and
- 3. There was a positively significant relationship between mental health and dependent- care agency of mothers (r= .46, p< .01).

The results of this study could be used as preliminary data to develop a guideline for promoting mental health and dependent-care agency among mothers of autistic children in order to enhance their mental health and be able to provide care effectively.