ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

เจตกติต่อกวามตายกับภาวะซึมเสร้าของผู้ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ เอชไอวีในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน

นางสาวนารี พิมพ์เข้าธรรม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

## คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ดาราวรรณ ต๊ะปืนตา ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ กรรมการ อาจารย์ คร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ กรรมการ อาจารย์ ดร. พิกุล นันทชัยพันธ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล กรรมการ

## บทคัดย่อ

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเจตกติต่อกวามตายมีกวามสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า การ วิจัยกรั้งนี้มีวัตถุประสงก์เพื่อศึกษากวามสัมพันธ์ระหว่างเจตกติต่อกวามตายกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดู แลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอ วี ในสถานสงเกราะห์ 4 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 55 ราย รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2545 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคกล ซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึ้นเอง แบบสอบถามเจตกติต่อกวามตายพัฒนาขึ้นโดย พิกุล นันทชัยพันธ์และคณะ (2544) และแบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบก (1967) แปลเป็นภาษาไทยและทดลองใช้โดยมุกดา ศรียงค์ (2522) ค่ากวามเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตกติต่อกวามตายเท่ากับ 0.82 และกวามเชื่อมั่นของ แบบประเมินภาวะซึมเศร้าเท่ากับ 0.86 วิเกราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW สถิติที่ ใช้ในการวิเกราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา และสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ สเปียร์แมน

# ผลการศึกษาพบว่า

1. ร้อยละ 52.7 ของผู้ดูแล มีกะแนนเจตกติต่อกวามตายสูงกว่าค่ากึ่งกลางของคะแนน และร้อยละ 47.3 ของผู้ดูแลมีกะแนนเจตกติต่อกวามตายต่ำกว่าค่ากึ่งกลางของกะแนน

- 2. ร้อยละ 65.4 ของผู้ดูแลมีภาวะซึมเศร้าระดับปกติ ในขณะที่ร้อยละ 20.0 มีภาวะซึม เศร้าระดับน้อย ร้อยละ 7.3 มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง และร้อยละ 7.3 มีภาวะซึมเศร้าระดับ มาก
- 3. เจตกติต่อกวามตายไม่มีกวามสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้คูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ เอชไอวี

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าผู้ดูแลส่วนหนึ่งมีภาวะซึมเศร้าในระดับมาก ถึงแม้ว่าจะเป็น จำนวนที่ไม่มาก แต่สมควรได้รับการดูแลต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริหารสถานสงเคราะห์ควรมีการ ช่วยเหลือ สนับสนุน และประกับประคองจิตใจ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลกลุ่มนี้ให้มีสุขภาพ จิตที่ดีต่อไป Thesis Title

Attitudes Toward Death and Depression Among Caregivers of

HIV - Infected Orphans in Welfare Institutions Chiang Mai Province

Author

Miss Naree Pimboutam

M.N.S.

Mental Health and Psychiatric Nursing

### **Examining Committee**

Asst. Prof. Dr. Darawan Thapinta Chairman

Asst. Prof. Srinuan Wiwatkunupakan Member

Lect. Dr. Patraporn Tungpunkom Member

Lect. Dr. Pikul Nantachaipan Member

Asst. Prof. Dr. Tipaporn Wonghongkul Member

#### Abstract

Based on literature review, it was found that attitudes toward death correlated with depression. The purpose of this study was to investigate the relationship between attitudes toward death and depression among caregivers of HIV - infected orphans. The sample consisted of 55 caregivers of HIV - infected orphans in four Welfare Institutions in Chiang Mai Province who were recruited purposively. Data were collected during September to October 2002. The research instrument was a questionnaire which consists of three main parts; personal data, developed by the researcher, Attitudes Toward Death, developed by Pikul Nantachaipan et al. (2001), and Beck Depression Inventory, developed by Beck (1967), and was translated into Thai and tried out by Mukda Sriyong (1979). The reliability of the Attitudes Toward Death Questionnaires was 0.82 and the reliability of the Beck Questionnaires was 0.86. Data were analyzed by descriptive statistics and Spearman's rank correlation coefficient.

The results revealed as follows:

1. Just above half (52.7%) of caregivers had higher scores on attitudes toward death than that of the median whereas, 47.3 percent of caregivers had lower scores than the median score.

- 2. Nearly two third (65.4%) of caregivers reported normal level of depression while 20.0 percent of caregivers reported mild level of depression, and equal proportion (7.3%) of caregivers reported either mild moderate level of depression or moderate-severe level of depression.
- 3. There was no relationship between attitudes toward death and depression among caregivers of HIV infected orphans.

The findings of this study show that some caregivers of HIV - infected orphans still had severe of depression, which need to be cared for continually, even though, it was a small proportion. Therefore, the administrators of welfare institutions should provide mental health support to enhance the mental health of this group.