ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัคสรร การสนับสนุนทางสังคม กับความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารคา เค็กออทิสติก

ผู้เขียน

นางสาววนาลักษณ์ เมืองมลมณีรัตน์

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)

## คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ประชานกรรมการ นางคนึ่งนิจ ใชยลังการณ์ กรรมการ

บทคัดย่อ

เด็กออทิสติกมีความพร่องทางพัฒนาการทำให้ไม่สามารถดูแลตนเองและต้องการ การคูแลที่ซับซ้อน มารคาจึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพา เพื่อที่จะดูแลบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้อง พึ่งพาของมารดานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานหลายปัจจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยกัดสรร การสนับสนุนทางสังคม และ ความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก รวมทั้งศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากมารคาเด็กออทิสติก ซึ่งพาบุตรมารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ และ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 72 ราย ระยะเวลา ในการรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2547 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบประเมิน ผลการรักษาเด็กออทิสติก (Autism Treatment Evaluation Checklist [ATEC]) ของริมแลนด์ และเอเคลสัน (Rimland & Edelson, 2000) ซึ่งผู้วิจัยใช้เทคนิดการแปลย้อนกลับ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Resource Questionnaire [PRQ]) (ส่วนที่ 2) ของแบรนด์ และ ไวเนิร์ท (Brandt & Weinert, 1981) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและ

คัดแปลงโดย จิรภา หงษ์ตระกูล (2532) และส่วนที่ 4 ความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้อง พึ่งพาของอิชยา เชื่อนมั่นและภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (2545) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง พรรณนา ผลการศึกษา พบว่า

- 1. กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการดูแลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 5,88 ปี (S.D. = 3.68) มี ระยะเวลาการเจ็บป่วยของบุตรโดยเฉลี่ยเท่ากับ 5.88 ปี (S.D. = 3.79) และความรุนแรงของโรค อยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกันในแต่ละระดับ (น้อย 33.33 %, ปานกลาง 34.72 % และ มาก 33.33 %)
- 2. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคมโคยรวมอยู่ในระคับสูง  $(\overline{X}=131.77, S.D.=20.41)$
- กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาอยู่ ในระดับสูง (X = 98.37, S.D. = 11.13)
- 4. ปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ สามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารคาเด็กออทิสติกในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ (r = -.26, p < .05)
- 5. การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถใน การคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารคาเด็กออทิสติกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.58, p<.01) และการสนับสนุนทางสังคมทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารคาเด็กออทิสติกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) โดยแต่ละด้านมีระดับความสัมพันธ์ดังนี้ ด้านการได้รับความรักใคร่ผูกพัน ใกล้ชิด สนิทสนม (r=.52) ด้านการรับรู้คุณค่าในตนเอง (r=.56) ด้านการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (r=.58) ด้านการได้มีโอกาสเลี้ยงคูหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น (r=.39) และด้านการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ (r=.45)

ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า หากมารคาเด็กออทิสติกได้รับการสนับสนุน ทางสังคมเพิ่มขึ้น ความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารคามีแนวโน้มที่จะ เพิ่มขึ้นด้วย แต่หากความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น การรับรู้ความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้อง พึ่งพาของมารคามีแนวโน้มที่จะลดลง ดังนั้นพยาบาลควรตระหนักถึงความสำคัญของการให้ การสนับสนุนทางสังคมแก่มารคาเด็กออทิสติก โคยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มมารคาที่บุตรมีความ รุนแรงของโรคอยู่ในระดับมาก โดยให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีการคูแล เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารคาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Thesis Title

The Relationship Between Selected Factors, Social Support, and

Dependent Care Agency Among Mothers of Autistic Children

Author

Miss Wanaluk Muangmolmaneerut

Degree

Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

## Thesis Advisory Committee

Assistant Professor Dr. Patraporn Tungpunkom

Chairperson

Mrs. Kaneungnit

Chailangkarn

Member

## **ABSTRACT**

Autistic children have a developmental disorder which results in inability to care for themselves and require a complexity of caring. Therefore, mothers need to develop dependent-care agency in order to care effectively for their autistic children. However, dependent-care agency among mothers of autistic children depend on basic conditioning factors.

The purpose of this study was to describe selected factors, social support, and dependent-care agency, as well as to examine the relationship between these factors. The purposive sampling was used to recruit 72 mothers of autistic children who had received service at Rajanagarindra Institute of Child Development, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, and Kawila Anukul Chiang Mai School during August, 2004 to September, 2004. The research instrument was a questionnaire which consisted of four parts: 1) Demographic data, 2) Autism Treatment Evaluation Checklist [ATEC] by Rimland and Edelson (2000), which was adopted the technique of back translation, 3) Personal Resource Questionnaire [PRQ]) (part 2) by Brandt & Weinert (1981), which was translated into thai and modified by Jirapa Hongtrakul (1989), and 4) Dependent-Care Agency questionnaire developed by Itchaya Khueanman and Patraporn Tungpunkom (2002). Data were analyzed by descriptive

statistics. The results of the study revealed that:

- 1. Subjects mean time of care was 5.88 years (S.D. = 3.68), mean time of illness was 5.88 years (S.D. = 3.79) and evaluation of severity of the disease among participants showed that the numbers each group were almost the same at (mild 33.33%, moderate 34.72%, and severe 33.33%);
- 2. Total scores of social support among mothers of autistic children were at high level  $(\overline{X} = 131.77, S.D. = 20.41)$ ;
- 3. Total scores of Dependent-Care Agency among mothers of autistic children were at high level ( $\overline{X} = 98.37$ , S.D. = 11,13):
- 4. There was a significant negative correlation between the severity of disease and Dependent-Care Agency at mild level (r = -.26, p < .05); and
- 5. There was a significant positive correlation between total scores of social support and Dependent-care Agency at moderate level (r = .58, p < .01). A significant positive correlation between all parts of social support and Dependent-Care Agency at the .01 level were: intimacy (r = .52), reassurance of worth (r = .56), social integration (r = .58), opportunity for nurturance (r = .39), and assistance (r = .45).

The findings of this study showed that if mothers of autistic children receive increased social support, Dependent-Care Agency tends to be increased. But if the severity of the disease increases, Dependent-Care Agency tends to be decreased. Therefore, nurses should be aware of the importance of social support available for mothers of autistic children, especially those who care for children who have very severe disease. Nurses should also give information about the disease and caring methods in order to enhance Dependent-Care Agency among mothers of autistic children so they may care for them effectively.