

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง		
ผู้เขียน	นางมณิมา ตูลาบุตร		
ปริญญา	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)		
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รองศาสตราจารย์ สุธิศา	ล่ามช้าง	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
	รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรภรณ์	อารีย์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นแนวคิดสำคัญก่อให้เกิดผลดีทั้งเด็กเจ็บป่วย บิดามารดา และพยาบาล การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยของเชปป์ (Schep, 1995) เป็นแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือมารดาของเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน อายุ 1 เดือน - 5 ปี จำนวน 85 ราย และพยาบาลจำนวน 30 ราย โรงพยาบาลแขวงจำปาสัก และโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 เลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลของเชปป์ (Schep, 1995) แปลเป็นภาษาไทย ด้วยวิธีย้อนกลับโดยนิชกานต์ ไชยชนะและคณะ (2546) แบบสอบถามความรุนแรงของโรคตามการรับรู้ของบิดามารดาของไกรวรรณ กาพันธ์และคณะ (2553) แบบสอบถามความรู้ของมารดาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเด็กที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลของนิชกานต์ ไชยชนะ และคณะ

(2546) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมพันธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ สถิติสัมพันธ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

ผลการศึกษามีดังนี้

1. มารดาทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน โดยร้อยละ 61.2 มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กเจ็บป่วยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันรายค้านพบว่า มารดาส่วนใหญ่ร้อยละ 96.5 มีส่วนร่วมด้านกิจกรรมที่ทำประจำอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.8 มีส่วนร่วมด้านกิจกรรมการพยาบาล และร้อยละ 68.2 มีส่วนร่วมด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.6 มีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 4.7 ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2. การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรุนแรงของโรคตามการรับรู้ของมารดา และความรู้ของมารดาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเฉียบพลันของเด็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .417, p < .01$ และ $r = .225, p < .05$ ตามลำดับ) และการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของพยาบาลต่อการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วย

ผลการศึกษารั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป

Thesis Title Maternal Participation in Caring for Hospitalized Children with Acute Illness, Lao People’s Democratic Republic and Related Factors

Author Mrs. Manimone Tourabouth

Degree Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

Thesis Advisory Committee

Associate Professor Suthisa Lamchang Advisor

Associate Professor Dr. Patcharaporn Aree Co-advisor

ABSTRACT

Maternal participation in caring for hospitalized children with acute illness is an important concept that beneficial for children, parents and also nurses. The purpose of this correlational descriptive research was to examine maternal participation in caring for hospitalized children with acute illness, Lao People’s Democratic Republic and related factors. Schepp’s concept of parents participation (1995) was used as a framework of the study. The study sample, selected by purposive sampling, included 85 mothers of children with acute illness aged from one month to 5 years, and 30 nurses in Campssak hospital and Savanakhet hospital during July to September 2011. The study instruments composed of Parents Participation Scales of Schepp (1995), which was translated in to Thai by Chaichana et al (2003); Scale of Severity of the Child’s Illness as Perceived by Parent, which was developed by Kaphan et al (2010); Maternal Knowledge on Child’s Illness Questionnaire, which was developed by the researcher; and Nurse’s Opinion in Maternal Participation Questionnaire, which was modified from Parents Participation Scales of Chaichana et al (2003). Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient, and Spearman rank correlation.

The study results revealed that:

1. All mothers participated in caring for children with acute illness. Sixty one point two percent reported participating in their children the overall of care at a high level. When considering each aspect of care, most of the mothers (96.5%) reported participating in routine care at a high level, fifty eight point eight percent reported participating in technical care and sixty eight point two percent reported participating in information sharing at a high level. Fifty point six percent of mother reported participating in decision - making at low level while four point seven percent do not participate in decision - making.

2. Maternal participation in caring for children with acute illness had a statistically significant positive relationship with severity of the child's illness as perceived by the mother and maternal knowledge about the child's illness ($r = .419, p < .01$ and $r = .225, p < .05$, respectively). Maternal participation in caring for children with acute illness has no relationship with nurse's opinion in maternal participation in caring for children.

This study results provided information for understanding maternal participation in caring for children with acute illness and related factors, and this information can be used as a guide to promote maternal participation in caring for children with acute illness in Lao People's Democratic Republic.